

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2016

Statistischer Tabellenband

Etienne Maffli & Eva Schneider

Datenstand Mai 2018

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Etienne Maffli & Eva Schneider
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2018

Zitierhinweis: Maffli, E. & Schneider, E. (2018). Ambulante Suchthilfe -
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2016. Lausanne: Sucht
Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2016)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2016)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2016)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2016)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2016)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2016), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2016), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2016), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2016)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2016)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2016)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2016)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2016)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2016)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen wurden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik *act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2016 beteiligten sich 67 der 188 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind gebeten worden, Basisdaten zu liefern (Alter, Geschlecht, Hauptproblem bei Eintritt). 20 Einrichtungen haben darauf geantwortet. Die Angaben dieser zusätzlichen Einrichtungen sind getrennt analysiert worden und die Ergebnisse werden im Anhang präsentiert.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.9			77.6			81.1			80.9			23.3			65.1	4 270
Frauen			29.1			22.4			18.9			19.1			76.7			34.9	2 288
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	227	749	976	4 270	2 288	6 558	6 558
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.4	3.0	4.9	1.2	2.1	1.7	1.3	1.6	102
15-19	2.4	2.0	2.2	2.9	8.3	4.1	2.2	15.1	4.6	56.1	57.3	56.3	4.5	1.7	2.4	16.1	9.9	13.9	911
20-24	4.0	2.9	3.7	3.8	10.0	5.2	12.3	20.8	13.9	14.4	13.7	14.3	4.0	3.5	3.6	7.6	5.9	7.0	460
25-29	7.6	6.2	7.2	14.4	15.0	14.6	22.8	17.0	21.7	11.1	8.8	10.7	3.1	7.8	6.7	9.8	8.4	9.3	611
30-34	10.9	8.5	10.2	18.3	21.7	19.0	19.7	5.7	17.1	6.2	6.6	6.3	4.5	8.6	7.6	10.2	9.0	9.8	642
35-39	12.0	10.7	11.6	14.9	11.7	14.2	18.0	15.1	17.4	4.5	2.6	4.1	8.0	11.0	10.3	10.6	9.8	10.3	676
40-44	11.4	11.5	11.4	18.3	11.7	16.8	12.3	3.8	10.7	2.6	2.2	2.5	8.9	12.4	11.6	9.3	10.0	9.5	625
45-49	13.2	15.2	13.8	13.9	10.0	13.1	6.6	13.2	7.8	1.1	2.6	1.4	13.4	17.3	16.4	9.5	13.4	10.9	712
50-54	15.1	15.8	15.3	7.7	10.0	8.2	5.7	7.5	6.0	0.6	0.9	0.7	15.6	15.7	15.7	10.1	12.8	11.0	722
55-59	10.1	11.1	10.4	4.8	1.7	4.1	0.4	1.9	0.7	0.5	0.9	0.6	12.9	8.2	9.3	6.7	7.9	7.1	466
60-64	5.9	7.9	6.5	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.8	5.7	3.9	5.1	4.3	282
65-69	3.3	4.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.0	4.3	2.1	3.7	2.7	174
70-74	2.6	2.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	1.6	1.9	1.7	112
75 und mehr	1.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	1.5	0.8	0.8	0.8	53
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	224	744	968	4 267	2 281	6 548	6 548
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	7	10	10
Alter																			
Mittelwert	45.0	46.9	45.6	38.7	35.0	37.9	34.2	32.8	33.9	22.3	22.1	22.2	48.7	45.2	46.0	38.0	41.8	39.3	
Standardabweichung	13.4	13.1	13.3	9.7	10.7	10.1	8.7	11.6	9.3	8.2	8.8	8.3	30.6	13.3	18.8	16.7	15.3	16.3	
1. Quartil	34.9	37.0	35.5	31.5	26.2	30.3	27.4	23.3	27.0	16.9	16.7	16.9	36.7	35.8	35.9	24.8	29.8	26.4	
Medianwert	45.6	48.0	46.3	38.8	34.1	38.2	33.1	29.6	32.7	18.2	18.0	18.1	49.6	46.0	46.5	36.9	42.8	39.1	
3. Quartil	54.4	56.2	54.8	45.6	42.8	45.4	40.17	43.8	40.5	25.9	24.9	25.8	56.8	53.6	54.5	50.0	52.9	51.0	
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	224	744	968	4 267	2 281	6 548	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	7	10	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	46.2	34.4	42.8	68.0	62.7	66.9	67.1	73.5	68.3	88.9	86.9	88.5	30.2	24.3	25.7	59.1	41.6	53.0	3 211
verheiratet	31.4	29.0	30.8	14.4	19.6	15.5	17.1	8.2	15.5	4.4	3.9	4.3	54.1	53.5	53.6	24.1	32.5	27.0	1 636
getrennt	4.3	3.8	4.2	5.2	5.9	5.3	3.7	2.0	3.4	0.4	1.5	0.6	2.4	2.8	2.7	3.1	3.2	3.2	192
geschieden	15.7	28.6	19.4	10.3	7.8	9.8	10.6	14.3	11.3	2.1	5.3	2.7	8.3	16.5	14.6	10.8	19.0	13.6	825
verwitwet	1.7	4.0	2.4	1.0	2.0	1.2	0.5	0.0	0.4	3.9	1.9	3.5	2.0	2.2	2.1	2.2	3.1	2.5	153
reg. Partnerschaft	0.7	0.1	0.5	1.0	2.0	1.2	0.9	2.0	1.1	0.2	0.5	0.3	2.9	0.7	1.2	0.7	0.5	0.6	38
N**	2 051	840	2 891	194	51	245	216	49	265	902	206	1 108	205	686	891	3 961	2 094	6 055	6 055
fehlende Angaben	161	67	228	14	9	23	12	4	16	60	21	81	22	63	85	309	194	503	503
Staatsangehörigkeit*																			
CH	80.4	86.2	82.1	62.6	85.2	67.5	71.8	83.7	74.0	84.1	87.6	84.7	87.4	86.7	86.9	79.8	86.4	82.2	4 960
EU	15.0	9.5	13.4	28.8	13.0	25.4	17.2	10.2	15.9	10.0	8.6	9.8	10.7	8.8	9.2	14.4	9.2	12.6	758
andere	4.6	4.3	4.5	8.6	1.9	7.1	11.0	6.1	10.1	5.9	3.8	5.5	1.9	4.5	3.9	5.8	4.4	5.3	319
N**	2 002	839	2 841	198	54	252	209	49	258	897	210	1 107	206	693	899	3 914	2 123	6 037	6 037
fehlende Angaben	210	68	278	10	6	16	19	4	23	65	17	82	21	56	77	356	165	521	521

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Urbanitätsgrad*																						
Grossstadtzentren	10.1	9.8	10.0	2.0	0.0	1.5	1.4	3.9	1.9	1.4	0.0	1.1	8.0	8.3	8.3	6.4	6.9	6.5	411			
Umland der Grossstadtzentren	16.6	15.7	16.3	4.5	6.9	5.0	15.0	13.7	14.8	12.3	12.8	12.4	17.4	16.4	16.6	14.5	14.2	14.4	903			
Mittelzentren	13.3	17.6	14.5	14.9	19.0	15.8	20.7	15.7	19.7	22.3	26.9	23.2	14.6	18.8	17.8	16.9	20.7	18.2	1 144			
Kleinzentren	30.5	30.8	30.6	50.7	46.6	49.8	42.7	43.1	42.8	32.5	35.2	33.0	34.7	32.1	32.7	33.6	32.9	33.3	2 096			
rural	29.5	26.1	28.5	27.9	27.6	27.8	20.2	23.5	20.8	31.5	25.1	30.3	25.4	24.4	24.6	28.7	25.3	27.5	1 731			
N**	2 113	877	2 990	201	58	259	213	51	264	928	219	1 147	213	708	921	4 087	2 198	6 285	6 285			
fehlende Angaben	99	30	129	7	2	9	15	2	17	34	8	42	14	41	55	183	90	273	273			
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																						
allein	34.6	33.5	34.3	36.6	18.4	32.6	33.5	32.6	33.3	14.5	13.0	14.2	12.5	10.4	10.8	27.6	25.2	26.8	1 389			
mit Herkunftsfamilie	9.5	4.9	8.1	12.6	14.3	12.9	20.5	13.0	19.1	63.8	55.4	62.2	14.8	7.1	8.7	26.3	14.7	22.6	1 170			
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.6	54.4	48.2	28.0	38.8	30.4	35.0	30.4	34.1	9.5	16.6	10.8	69.3	80.7	78.3	34.7	51.3	40.1	2 078			
mit Freunden/anderen Personen	3.3	2.3	3.0	5.1	10.2	6.3	3.5	4.3	3.7	3.4	2.6	3.2	0.0	1.5	1.2	3.3	3.1	3.2	167			
Haft	0.2	0.0	0.2	1.1	2.0	1.3	2.0	2.2	2.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	16			
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.2	1.9	2.1	6.3	8.2	6.7	3.0	6.5	3.7	2.7	1.6	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	1.6	2.2	113			
Spital/Klinik	1.7	0.8	1.4	4.0	0.0	3.1	1.0	4.3	1.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	1.1	59			
anderes	3.0	2.1	2.7	6.3	8.2	6.7	1.5	6.5	2.4	5.5	10.4	6.4	3.4	0.3	0.9	3.9	3.2	3.7	190			
N**	1 802	770	2 572	175	49	224	200	46	246	861	193	1 054	88	336	424	3 511	1 671	5 182	5 182			
fehlende Angaben	410	137	547	33	11	44	28	7	35	101	34	135	139	413	552	759	617	1 376	1 376			
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																						
stabile Wohnsituation	92.2	94.9	93.0	77.7	80.9	78.4	90.1	88.1	89.7	92.6	90.8	92.2	95.8	97.5	97.1	91.4	94.5	92.4	4 516			
instabile Wohnsituation	4.0	2.6	3.6	9.6	6.4	8.9	2.9	4.8	3.3	3.9	3.5	3.8	2.1	2.5	2.4	4.2	3.0	3.8	187			
Haft	0.2	0.0	0.2	1.8	2.1	1.9	2.9	0.0	2.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	17			
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	3.6	2.5	3.3	10.8	10.6	10.8	4.1	7.1	4.7	3.3	5.8	3.8	2.1	0.0	0.4	3.9	2.5	3.4	167			
N**	1 722	728	2 450	166	47	213	171	42	213	779	173	952	96	360	456	3 282	1 605	4 887	4 887			
fehlende Angaben	490	179	669	42	13	55	57	11	68	183	54	237	131	389	520	988	683	1 671	1 671			

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	39.9	41.5	40.4	56.0	30.8	50.0	45.2	52.4	46.5	70.6	55.8	67.8	21.8	17.7	18.6	47.2	37.8	43.9	1 499
zeitweilige Beziehung(en)	3.0	3.7	3.2	6.0	7.7	6.4	7.5	0.0	6.1	3.4	6.7	4.0	0.0	0.7	0.5	3.2	3.0	3.1	107
feste Beziehung, getrennt lebend	9.2	11.3	9.8	3.6	15.4	6.4	10.8	23.8	13.2	14.1	25.0	16.2	10.3	12.7	12.2	10.2	13.7	11.4	390
feste Beziehung, zusammen leb.	47.8	43.5	46.5	34.5	46.2	37.3	36.6	23.8	34.2	11.9	12.5	12.0	67.9	68.9	68.7	39.4	45.5	41.5	1 416
N**	1 267	542	1 809	84	26	110	93	21	114	446	104	550	78	299	377	2 226	1 186	3 412	3 412
fehlende Angaben	945	365	1 310	124	34	158	135	32	167	516	123	639	149	450	599	2 044	1 102	3 146	3 146
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	43.2	36.6	41.2	62.5	56.5	61.2	65.6	61.1	64.9	91.0	85.2	89.9	32.3	30.3	30.7	57.2	44.4	52.5	1 874
1 Kind	17.0	20.5	18.1	17.5	13.0	16.5	20.4	16.7	19.8	4.3	3.5	4.1	8.3	15.4	13.9	13.3	15.5	14.1	504
2 Kinder	26.2	29.6	27.3	13.8	21.7	15.5	12.9	16.7	13.5	3.9	7.8	4.6	36.5	37.0	36.9	19.5	27.5	22.4	798
3 Kinder oder mehr	13.6	13.3	13.5	6.3	8.7	6.8	1.1	5.6	1.8	0.8	3.5	1.3	22.9	17.4	18.5	10.0	12.6	11.0	391
N**	1 269	565	1 834	80	23	103	93	18	111	488	115	603	96	357	453	2 278	1 289	3 567	3 567
fehlende Angaben	943	342	1 285	128	37	165	135	35	170	474	112	586	131	392	523	1 992	999	2 991	2 991
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	72.5	66.5	70.7	78.9	72.0	77.1	86.6	92.9	87.7	84.7	78.6	83.6	55.1	47.0	48.7	75.3	64.0	71.2	2 250
1 Kind	11.7	17.5	13.5	11.3	12.0	11.5	6.0	0.0	4.9	4.2	8.2	4.9	14.6	18.0	17.3	9.8	15.0	11.7	370
2 Kinder	11.1	12.2	11.5	8.5	8.0	8.3	7.5	7.1	7.4	9.0	12.2	9.6	21.3	24.3	23.6	10.9	15.3	12.5	396
3 Kinder oder mehr	4.6	3.8	4.4	1.4	8.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.9	9.0	10.8	10.4	3.9	5.7	4.6	144
N**	1 124	498	1 622	71	25	96	67	14	81	431	98	529	89	334	423	2 003	1 157	3 160	3 160
fehlende Angaben	1 088	409	1 497	137	35	172	161	39	200	531	129	660	138	415	553	2 267	1 131	3 398	3 398

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																						
keine oder teilobligatorische Ausbildung	4.6	3.2	4.2	3.9	7.3	4.6	3.7	2.4	3.5	14.9	19.1	15.8	2.4	1.6	1.8	7.6	5.6	6.9	327			
obligatorische Schule	8.5	11.4	9.4	18.8	29.3	21.0	13.2	23.8	15.2	51.8	53.7	52.2	8.0	7.5	7.6	21.1	17.5	19.9	935			
Übergangsausbildung	2.1	3.2	2.4	0.6	7.3	2.1	1.6	2.4	1.7	3.6	2.7	3.4	0.0	1.4	1.1	2.3	2.9	2.5	119			
Allgemeinausbildung ohne Maturität	10.6	6.3	9.3	14.3	4.9	12.3	9.0	2.4	7.8	4.2	2.1	3.8	12.8	8.2	9.3	9.0	5.9	7.9	374			
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	50.7	54.4	51.8	50.6	36.6	47.7	56.1	45.2	54.1	20.1	17.6	19.6	39.2	48.4	46.3	41.8	44.7	42.7	2 012			
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.1	5.2	4.4	1.9	2.4	2.1	4.2	7.1	4.8	2.5	2.7	2.5	4.8	7.7	7.1	3.8	6.5	4.7	220			
höhere Berufsbildung	8.9	8.1	8.7	5.8	4.9	5.6	7.9	2.4	6.9	1.6	1.1	1.5	14.4	9.4	10.5	6.9	7.3	7.1	332			
Fachhochschule oder Universität	8.9	7.8	8.6	3.2	7.3	4.1	3.2	14.3	5.2	1.3	1.1	1.3	16.8	14.6	15.1	6.5	9.1	7.4	346			
Doktorat oder Habilitation	1.6	0.5	1.3	0.6	0.0	0.5	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	1.3	1.1	0.6	0.9	42			
N**	1 577	656	2 233	154	41	195	189	42	231	757	188	945	125	426	551	3 130	1 577	4 707	4 707			
fehlende Angaben	635	251	886	54	19	73	39	11	50	205	39	244	102	323	425	1 140	711	1 851	1 851			
Berufliche Stellung*																						
nicht erwerbstätig	16.6	23.2	18.5	26.4	48.4	30.8	16.5	38.2	21.0	15.4	17.3	15.7	25.0	20.0	20.7	16.9	23.8	18.7	470			
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.1	1.2	1.9	3.2	3.2	3.2	5.3	11.8	6.6	32.6	32.1	32.5	0.0	0.0	0.0	9.5	6.8	8.8	222			
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.8	4.6	4.1	5.6	9.7	6.4	3.8	0.0	3.0	3.9	4.9	4.1	0.0	0.0	0.0	3.8	4.3	3.9	99			
angelernete(r) ArbeiterIn	6.1	9.3	7.0	12.8	6.5	11.5	6.0	0.0	4.8	2.9	4.9	3.3	25.0	8.0	10.3	5.7	7.4	6.1	154			
gelernte(r) ArbeiterIn	15.7	7.8	13.5	16.0	12.9	15.4	23.3	2.9	19.2	9.8	6.2	9.2	0.0	4.0	3.4	14.8	7.7	13.0	327			
VorarbeiterIn	2.6	0.2	1.9	2.4	0.0	1.9	4.5	0.0	3.6	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.3	0.2	1.7	44			
einfache(r) Angestellte(r)	21.1	28.9	23.3	12.8	12.9	12.8	15.0	11.8	14.4	6.1	3.7	5.7	0.0	36.0	31.0	16.1	23.2	18.0	452			
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	13.4	12.0	13.0	8.8	6.5	8.3	11.3	20.6	13.2	5.1	2.5	4.7	25.0	24.0	24.1	11.3	11.8	11.4	288			
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.8	2.4	4.8	0.8	0.0	0.6	3.8	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	3.4	3.8	1.5	3.2	81			
selbständig	10.4	6.6	9.3	6.4	0.0	5.1	9.8	0.0	7.8	2.2	2.5	2.2	0.0	8.0	6.9	7.6	5.8	7.2	180			
SchülerIn/StudentIn	1.4	0.7	1.2	0.8	0.0	0.6	0.8	5.9	1.8	19.1	24.7	20.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.9	6.2	157			
andere Stellung	1.1	2.9	1.6	4.0	0.0	3.2	0.0	8.8	1.8	1.7	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	1.7	43			
N**	1 040	409	1 449	125	31	156	133	34	167	408	81	489	4	25	29	1 867	650	2 517	2 517			
fehlende Angaben	1 172	498	1 670	83	29	112	95	19	114	554	146	700	223	724	947	2 403	1 638	4 041	4 041			

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	56.0	46.6	53.2	34.1	18.0	30.6	57.3	42.2	54.3	29.5	27.4	29.1	69.0	65.6	66.3	48.5	46.2	47.7	2 378
Ersparnisse	2.2	1.1	1.9	2.2	2.0	2.2	1.7	2.2	1.8	1.4	1.1	1.3	1.2	0.9	1.0	1.9	1.2	1.7	85
Rente (AHV/IV u.a.)	13.2	19.7	15.1	11.2	10.0	10.9	9.6	20.0	11.7	4.0	5.4	4.3	14.3	11.1	11.8	10.3	15.7	12.0	600
Sozialhilfe/Fürsorge	13.7	13.7	13.7	32.4	52.0	36.7	11.2	13.3	11.7	10.4	14.0	11.1	2.4	2.2	2.2	12.8	11.6	12.4	618
Arbeitslosenversicherung	8.0	4.9	7.1	12.3	4.0	10.5	10.1	4.4	9.0	3.6	2.2	3.4	1.2	0.6	0.7	6.8	3.7	5.8	288
durch PartnerIn	1.5	10.1	4.1	2.2	8.0	3.5	1.7	4.4	2.2	1.5	1.1	1.4	3.6	14.6	12.3	1.6	9.3	4.1	203
durch Eltern/Angehörige	2.6	2.4	2.5	2.8	6.0	3.5	3.9	8.9	4.9	48.4	47.8	48.3	8.3	4.6	5.4	15.9	10.9	14.3	712
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	8
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Taggeldversicherung	1.1	0.7	1.0	1.7	0.0	1.3	1.7	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	34
anderes	1.5	0.9	1.3	1.1	0.0	0.9	0.6	2.2	0.9	0.9	1.1	0.9	0.0	0.3	0.2	1.2	0.9	1.1	56
N**	1 762	753	2 515	179	50	229	178	45	223	799	186	985	84	323	407	3 366	1 616	4 982	4 982
fehlende Angaben	450	154	604	29	10	39	50	8	58	163	41	204	143	426	569	904	672	1 576	1 576
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	51.3	33.4	46.1	29.0	10.0	24.9	57.2	26.5	51.4	17.1	12.6	16.3	56.3	40.8	44.2	41.6	29.9	38.0	1 948
Teilzeitarbeit	5.1	17.9	8.9	6.6	6.0	6.4	3.8	8.2	4.7	3.8	5.1	4.0	8.0	35.9	29.8	4.7	18.8	9.1	466
Gelegenheitsjobs	1.3	1.1	1.2	3.3	0.0	2.6	0.5	2.0	0.8	1.5	1.5	1.5	0.0	1.0	0.8	1.3	0.9	1.2	61
in Ausbildung	3.7	3.0	3.5	2.2	0.0	1.7	3.8	18.4	6.6	55.2	53.0	54.8	11.5	6.5	7.6	18.9	14.2	17.5	897
arbeitslos und aktive Stellensuche	13.4	9.9	12.4	24.0	24.0	24.0	18.8	14.3	17.9	9.9	8.1	9.6	2.3	1.6	1.8	12.5	8.2	11.2	575
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	4.7	6.8	5.3	16.4	30.0	19.3	4.3	0.0	3.5	3.9	5.1	4.1	2.3	0.3	0.8	5.0	5.3	5.1	262
Rentner/Rentnerin	8.0	11.5	9.0	1.6	0.0	1.3	1.9	2.0	1.9	0.2	1.0	0.4	11.5	10.0	10.4	4.9	8.5	6.0	309
Arbeitsunfähigkeit	5.4	6.5	5.7	9.8	12.0	10.3	5.3	18.4	7.8	2.4	2.0	2.3	2.3	1.0	1.3	4.6	5.3	4.9	249
Hausfrau/-mann	0.1	3.3	1.0	0.0	2.0	0.4	0.0	4.1	0.8	0.0	0.5	0.1	1.1	1.9	1.8	0.1	2.4	0.8	40
anderes	7.0	6.5	6.8	7.1	16.0	9.0	4.3	6.1	4.7	6.0	11.1	7.0	4.6	1.0	1.8	6.4	6.3	6.4	326
N**	1 790	736	2 526	183	50	233	208	49	257	877	198	1 075	87	309	396	3 542	1 591	5 133	5 133
fehlende Angaben	422	171	593	25	10	35	20	4	24	85	29	114	140	440	580	728	697	1 425	1 425

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	45.4	52.9	47.4	66.7	71.4	67.6	42.3	50.0	43.5	58.2	74.3	60.7	95.0	91.2	92.3	53.7	67.1	57.5	824
weniger als 1000 Fr.	2.3	2.4	2.3	12.3	0.0	9.9	0.0	10.0	1.6	21.7	11.4	20.1	0.0	0.0	0.0	6.5	2.9	5.5	79
1001 bis 2000 Fr.	3.0	5.2	3.6	1.8	14.3	4.2	7.7	0.0	6.5	5.8	2.9	5.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	49
2001 bis 3000 Fr.	4.1	9.0	5.4	0.0	0.0	0.0	13.5	20.0	14.5	1.6	5.7	2.2	0.0	1.0	0.7	3.5	6.1	4.3	61
3001 bis 4000 Fr.	8.1	11.0	8.9	8.8	7.1	8.5	11.5	20.0	12.9	2.1	2.9	2.2	0.0	2.0	1.4	6.3	7.9	6.8	97
4001 bis 5000 Fr.	11.6	8.1	10.7	1.8	7.1	2.8	7.7	0.0	6.5	6.9	2.9	6.3	0.0	2.9	2.1	9.0	5.4	8.0	114
5001 bis 6000 Fr.	8.8	5.7	8.0	1.8	0.0	1.4	3.8	0.0	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.7	3.2	5.0	71
6001 bis 8000 Fr.	6.8	2.4	5.7	3.5	0.0	2.8	3.8	0.0	3.2	1.1	0.0	0.9	2.5	2.9	2.8	4.8	2.0	4.0	57
8001 bis 10 000 Fr.	7.3	3.3	6.3	3.5	0.0	2.8	9.6	0.0	8.1	2.1	0.0	1.8	2.5	0.0	0.7	5.7	2.0	4.6	66
10001 bis 15 000 Fr.	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	12
über 15 000 Fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	3
N**	603	210	813	57	14	71	52	10	62	189	35	224	40	102	142	1 026	407	1 433	1 433
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 609</i>	<i>697</i>	<i>2 306</i>	<i>151</i>	<i>46</i>	<i>197</i>	<i>176</i>	<i>43</i>	<i>219</i>	<i>773</i>	<i>192</i>	<i>965</i>	<i>187</i>	<i>647</i>	<i>834</i>	<i>3 244</i>	<i>1 881</i>	<i>5 125</i>	<i>5 125</i>
Schulden*																			
keine Schulden	66.4	76.2	69.1	27.1	41.7	30.0	44.7	66.7	47.1	82.9	89.2	84.0	90.0	92.9	92.5	68.6	80.5	72.1	1 497
bis 5000 Fr.	4.0	5.6	4.5	4.2	0.0	3.3	2.6	11.1	3.5	3.7	2.7	3.6	0.0	2.7	2.3	4.1	5.2	4.4	92
5001 bis 10 000 Fr.	10.4	8.4	9.8	20.8	8.3	18.3	13.2	0.0	11.8	4.3	4.1	4.2	5.0	1.8	2.3	8.6	6.1	7.9	163
10 001 bis 25 000 Fr.	7.7	2.4	6.2	16.7	33.3	20.0	11.8	0.0	10.6	4.5	4.1	4.5	0.0	0.0	0.0	7.2	2.9	5.9	122
25 001 bis 50 000 Fr.	4.7	3.1	4.3	6.3	0.0	5.0	14.5	11.1	14.1	2.9	0.0	2.4	5.0	1.8	2.3	5.4	2.3	4.4	92
50 001 bis 100 000 Fr.	1.9	1.4	1.8	6.3	8.3	6.7	5.3	11.1	5.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.1	1.6	34
über 100 000 Fr.	1.5	0.3	1.2	8.3	0.0	6.7	1.3	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.5	0.6	1.3	26
Höhe nicht bekannt	3.4	2.4	3.1	10.4	8.3	10.0	6.6	0.0	5.9	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.4	49
N**	741	286	1 027	48	12	60	76	9	85	375	74	449	20	113	133	1 454	621	2 075	2 075
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 471</i>	<i>621</i>	<i>2 092</i>	<i>160</i>	<i>48</i>	<i>208</i>	<i>152</i>	<i>44</i>	<i>196</i>	<i>587</i>	<i>153</i>	<i>740</i>	<i>207</i>	<i>636</i>	<i>843</i>	<i>2 816</i>	<i>1 667</i>	<i>4 483</i>	<i>4 483</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	92.5	98.8	94.4	40.0	66.7	47.1	67.5	80.0	68.9	94.9	100.0	95.6	89.0	97.1	91.3	897
Strafhaft	2.6	0.4	1.9	28.0	11.1	23.5	5.0	20.0	6.7	1.7	0.0	1.5	3.6	1.4	3.0	29
Untersuchungshaft	2.7	0.8	2.1	16.0	22.2	17.6	17.5	0.0	15.6	1.7	0.0	1.5	4.3	1.4	3.5	34
Straf- und Untersuchungshaft	2.2	0.0	1.5	16.0	0.0	11.8	10.0	0.0	8.9	1.7	0.0	1.5	3.1	0.0	2.2	22
N**	548	243	791	25	9	34	40	5	45	59	9	68	702	280	982	982
<i>fehlende Angaben</i>	1 664	664	2 328	183	51	234	188	48	236	903	218	1 121	3 341	1 259	4 600	4 600
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	35.0	0.0	35.0	50.0	100.0	57.1	55.6	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	40.5	50.0	41.0	16
1 bis 2 Monate	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
>2 bis 6 Monate	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
>6 bis 12 Monate	10.0	0.0	10.0	33.3	0.0	28.6	11.1	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
mehr als 1 Jahr	15.0	0.0	15.0	16.7	0.0	14.3	11.1	100.0	20.0	100.0	0.0	100.0	18.9	50.0	20.5	8
N**	20	0	20	6	1	7	9	1	10	1	0	1	37	2	39	39
<i>fehlende Angaben</i>	21	3	24	9	2	11	4	0	4	2	0	2	40	6	46	46

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																				
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	19.5	7.5	16.0	7.9	5.7	7.4	20.0	7.8	17.7	49.0	46.8	48.6	3.5	2.6	2.8	23.8	9.0	18.7	1 123	
Arztpraxis	9.0	13.2	10.2	8.4	15.1	9.9	4.7	11.8	6.0	2.1	3.0	2.3	1.5	4.6	3.8	6.5	9.2	7.5	449	
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	5.1	6.8	5.6	10.5	11.3	10.7	7.0	3.9	6.4	2.2	2.0	2.2	3.0	2.4	2.6	4.5	4.4	4.5	270	
andere medizinische oder soziale Dienste	17.0	17.1	17.0	15.3	17.0	15.6	8.4	11.8	9.0	6.5	10.0	7.1	5.5	3.5	4.0	12.8	11.7	12.4	747	
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.7	0.0	0.5	0.5	1.9	0.8	0.0	3.9	0.8	3.4	2.5	3.3	2.5	1.5	1.7	1.8	1.2	1.6	96	
ArbeitgeberIn	4.0	2.7	3.6	1.1	5.7	2.1	1.4	3.9	1.9	1.5	2.0	1.6	2.5	1.1	1.4	3.0	2.1	2.7	160	
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	43.3	49.8	45.2	53.2	43.4	51.0	54.9	51.0	54.1	32.9	30.8	32.5	80.6	83.4	82.8	45.4	59.9	50.4	3 031	
anderes	1.4	2.9	1.9	3.2	0.0	2.5	3.7	5.9	4.1	2.3	3.0	2.4	1.0	0.9	0.9	2.2	2.5	2.3	140	
N**	2 023	840	2 863	190	53	243	215	51	266	905	201	1 106	201	658	859	3 940	2 076	6 016	6 016	
fehlende Angaben	189	67	256	18	7	25	13	2	15	57	26	83	26	91	117	330	212	542	542	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	86.9	95.6	89.4	95.1	97.5	95.6	91.5	97.1	92.6	72.8	81.7	74.3	85.2	94.1	87.4	2 601
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	3.8	0.9	0.5	0.8	23
Massnahme liegt vor	12.9	4.4	10.5	4.9	2.5	4.4	8.5	2.9	7.4	23.5	14.0	21.9	14.0	5.3	11.8	351
N**	1 300	503	1 803	142	40	182	141	34	175	460	93	553	2 224	751	2 975	2 975
fehlende Angaben	912	404	1 316	66	20	86	87	19	106	502	134	636	1 819	788	2 607	2 607
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	2
ambulante Behandlung	26.7	42.9	28.3	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	54.5	66.7	55.7	36.4	47.6	37.4	85
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.9	1.9	0.0	1.8	4
in Erwartung eines Urteils	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	20.0	0.0	20.0	7.3	0.0	6.6	3.4	0.0	3.1	7
anderes	72.5	57.1	71.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	34.5	33.3	34.4	58.3	52.4	57.7	131
N**	131	14	145	2	0	2	5	0	5	55	6	61	206	21	227	227
fehlende Angaben	38	8	46	5	1	6	7	1	8	70	11	81	123	23	146	146

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	50.1	44.3	48.4	16.1	20.0	17.0	46.2	44.7	45.9	73.8	77.1	74.4	71.7	77.4	76.3	56.0	54.6	55.6	2 906
ja	49.9	55.7	51.6	83.9	80.0	83.0	53.8	55.3	54.1	26.2	22.9	25.6	28.3	22.6	23.7	44.0	45.4	44.4	2 319
N**	1 937	795	2 732	192	55	247	199	47	246	860	192	1 052	53	234	287	3 631	1 594	5 225	5 225
<i>fehlende Angaben</i>	275	112	387	16	5	21	29	6	35	102	35	137	174	515	689	639	694	1 333	1 333
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.8	0.7	0.8	7.1	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	2.0	1.6	1.2	0.6	1.0	14
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.3	5.3	4.6	55.7	60.9	57.0	11.8	40.0	16.4	2.0	4.2	2.4	0.0	4.1	3.1	8.2	7.9	8.1	116.0
weitere medikamentöse Behandlung	8.7	9.0	8.8	14.3	8.7	12.9	9.8	10.0	9.8	2.0	0.0	1.6	0.0	2.0	1.6	8.4	7.3	8.0	115.0
ambulante Beratung/Therapie	73.0	78.3	74.7	64.3	60.9	63.4	84.3	80.0	83.6	92.1	91.7	92.0	93.3	87.8	89.1	76.5	79.0	77.3	1 109
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.6	1.7	1.6	1.4	0.0	1.1	3.9	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.3	19
stationäre Therapie	49.1	49.7	49.3	40.0	26.1	36.6	43.1	40.0	42.6	16.8	16.7	16.8	20.0	8.2	10.9	42.2	39.9	41.4	594
Entzug	38.1	42.7	39.5	37.1	26.1	34.4	39.2	50.0	41.0	7.9	4.2	7.2	0.0	10.2	7.8	32.7	32.2	32.5	466
Selbsthilfegruppe	5.7	4.3	5.3	4.3	0.0	3.2	5.9	0.0	4.9	1.0	8.3	2.4	0.0	4.1	3.1	4.9	4.7	4.8	69
andere	2.1	2.0	2.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	1.6	0.0	8.2	6.3	1.9	3.5	2.4	35
N**	633	300	933	70	23	93	51	10	61	101	24	125	15	49	64	943	491	1 434	1 434
<i>fehlende Angaben</i>	342	146	488	91	21	112	56	16	72	125	21	146	0	7	7	664	242	906	906

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	98.3	97.3	98.0	38.0	52.4	42.3	94.2	87.5	92.9	100.0	100.0	100.0	96.8	96.8	96.8	2 474
ja	1.7	2.7	2.0	62.0	47.6	57.7	5.8	12.5	7.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	81
N**	1 049	473	1 522	50	21	71	69	16	85	410	103	513	1 766	789	2 555	2 555
fehlende Angaben	1 163	434	1 597	158	39	197	159	37	196	552	124	676	2 277	750	3 027	3 027
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.5	2
Methadon	64.7	84.6	73.3	66.7	90.0	72.5	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	88.0	73.4	58
andere Opiate	11.8	7.7	10.0	16.7	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	8.0	13.9	11
andere Substanzen	23.5	7.7	16.7	10.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	4.0	10.1	8
N**	17	13	30	30	10	40	4	2	6	0	0	0	54	25	79	79
fehlende Angaben	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	96.9	96.5	96.8	35.6	36.4	35.7	91.1	74.3	88.0	99.2	99.0	99.1	92.6	92.6	92.6	2 997
ja	3.1	3.5	3.2	64.4	63.6	64.3	8.9	25.7	12.0	0.8	1.0	0.9	7.4	7.4	7.4	241
N**	1 328	565	1 893	163	44	207	157	35	192	490	97	587	2 351	887	3 238	3 238
fehlende Angaben	884	342	1 226	45	16	61	71	18	89	472	130	602	1 692	652	2 344	2 344
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	24.9	31.0	27.3	26.9	24.5	26.3	24.2	20.3	21.9	19.5	-	19.5	25.7	24.4	25.4	
Standardabweichung	3.0	8.5	6.4	7.9	6.3	7.6	6.0	4.7	5.5	2.1	-	2.1	6.8	7.3	7.0	
1. Quartil	25.0	25.0	25.0	22.0	20.0	21.0	20.0	18.0	18.0	18.0	-	18.0	21.0	18.0	20.0	
Medianwert	25.0	30.0	27.0	25.0	22.5	25.0	23.5	18.0	19.5	19.5	-	19.5	25.0	22.0	25.0	
3. Quartil	27.0	38.0	28.0	30.0	29.0	30.0	25.0	22.0	25.0	21.0	-	21.0	28.0	30.0	28.0	
N**	9	6	15	39	12	51	6	8	14	2	0	2	63	27	90	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2016)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
Alkohol	54.7	58.9	55.9	3 119	Alkohol	54.7	58.9	55.9	3 119
Heroin	4.3	2.9	3.9	217					
Methadon	0.4	0.5	0.4	23					
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	1	Opioide	5.1	3.9	4.8	268
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
andere Opioide	0.4	0.6	0.5	26					
Kokain-Pulver	5.4	3.2	4.8	267	Kokain	5.6	3.4	5.0	281
Crack-Kokain	0.2	0.2	0.2	12					
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	2					
Amphetamine	0.6	1.2	0.8	45	Stimulantien	1.0	1.6	1.2	66
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	1					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.3	0.3	17					
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	1					
andere Stimulanzien	0.0	0.1	0.0	2					
Barbiturate	0.0	0.1	0.0	1	Hypnotika/Sedativa	0.6	2.1	1.0	57
Benzodiazepine	0.5	1.6	0.8	47					
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.4	0.1	8					
LSD	0.0	0.1	0.1	3	Halluzinogene	0.0	0.1	0.1	3
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0					
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0					
Cannabis	23.8	14.7	21.3	1 189	Cannabis	23.8	14.7	21.3	1 189
Tabak	2.6	4.8	3.2	180	Tabak	2.6	4.8	3.2	180
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	1	andere Substanz	0.4	0.2	0.4	21
andere Substanz(en)	0.4	0.2	0.4	20					
Glücksspielsucht	2.3	0.6	1.9	104	suchtähnliche Verhaltensweisen	6.0	10.1	7.1	398
Computer-bzw. Internetsucht	2.3	1.2	2.0	113					
Essstörungen	0.4	6.5	2.1	115					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.9	1.8	1.2	66					
N**	4 043	1 539	5 582	5 582		4 043	1 539	5 582	5 582
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2016)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	8.7	8.8	8.7
nein	91.3	91.2	91.3
N*	1 579	524	2 103
<i>fehlende Angaben</i>	2 464	1 015	3 479
Häufigste Substanzkombinationen***			
Kok/Alk	17.2	7.9	14.6
Can/Alk	10.1	10.5	10.2
Tab/Alk	10.1	10.5	10.2
Tab/Can/Alk	7.1	10.5	8.0
Kok/Op	3.0	2.6	2.9
Can/Kok/Alk	4.0	0.0	2.9
Can/Kok/Op	2.0	5.3	2.9
Stim/Kok/Alk	1.0	5.3	2.2
Med/Alk	0.0	7.9	2.2
Med/Op	2.0	2.6	2.2
Tab/Can/Coc/Alk	3.0	0.0	2.2
Op/Alk	1.0	2.6	1.5
Med/Kok/Alk	2.0	0.0	1.5
Hal/Stim	1.0	2.6	1.5
Can/Op/Alk	1.0	2.6	1.5
Can/Kok	2.0	0.0	1.5
Can/Kok/Op/Alk	0.0	5.3	1.5
Can/Stim/Kok/Alk	2.0	0.0	1.5
Can/Med/Kok	0.0	5.3	1.5
Can/Med/Stim/Kok/Alk	2.0	0.0	1.5
Tab/Kok/Alk	2.0	0.0	1.5
Tab/Med/Alk	1.0	2.6	1.5
Tab/Med/Op/Alk	2.0	0.0	1.5
Tab/Can/Kok	2.0	0.0	1.5
Tab/Can/Kok/Op	2.0	0.0	1.5
Tab/Can/Med/Stim/Kok	2.0	0.0	1.5
andere Kombinationen	18.2	15.8	17.5
N**	99	37	136
<i>fehlende Angaben</i>	38	9	47

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	38.7	46.4	16.2	12.9	62.5	0.0	33.8	87.0	66.7
4-6 Tage pro Woche	12.7	10.5	14.5	9.7	0.0	0.0	8.0	2.2	8.3
2-3 Tage pro Woche	14.2	11.1	24.0	12.9	0.0	0.0	15.9	2.2	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.2	8.5	19.6	22.6	6.3	0.0	19.9	0.0	16.7
nie	26.2	23.5	25.7	41.9	31.3	0.0	22.4	8.7	8.3
N**	1 689	153	179	31	16	0	825	92	12
<i>fehlende Angaben</i>	523	55	49	10	9	1	137	14	6

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	43.9	51.4	10.3	21.1	69.6	0.0	36.0	89.9	0.0
4-6 Tage pro Woche	13.5	5.4	10.3	0.0	4.3	0.0	7.9	1.4	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.4	5.4	23.1	21.1	4.3	0.0	15.3	1.4	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	10.8	20.5	31.6	8.7	100.0	16.4	4.3	0.0
nie	20.4	27.0	35.9	26.3	13.0	0.0	24.3	2.9	0.0
N**	716	37	39	19	23	1	189	69	0
<i>fehlende Angaben</i>	191	23	14	6	9	1	38	5	3

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2016), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	40.2	47.4	15.1	16.0	66.7	0.0	34.2	88.2	66.7
4-6 Tage pro Woche	12.9	9.5	13.8	6.0	2.6	0.0	8.0	1.9	8.3
2-3 Tage pro Woche	14.3	10.0	23.9	16.0	2.6	0.0	15.8	1.9	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.1	8.9	19.7	26.0	7.7	100.0	19.2	1.9	16.7
nie	24.4	24.2	27.5	36.0	20.5	0.0	22.8	6.2	8.3
N**	2 405	190	218	50	39	1	1 014	161	12
<i>fehlende Angaben</i>	714	78	63	16	18	2	175	19	9

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2016), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	9.4	57.1	46.2	31.0
4-6 Tage pro Woche	7.8	17.9	23.1	6.9
2-3 Tage pro Woche	10.9	7.1	23.1	20.7
1 Tag pro Woche oder weniger	25.0	7.1	0.0	20.7
nie	46.9	10.7	7.7	20.7
N**	64	28	13	29
fehlende Angaben	30	67	2	9

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2016), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	14.3	50.0	63.4	11.8
4-6 Tage pro Woche	14.3	0.0	12.2	23.5
2-3 Tage pro Woche	28.6	16.7	12.2	17.6
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	16.7	9.8	47.1
nie	42.9	16.7	2.4	0.0
N**	7	6	82	17
fehlende Angaben	3	12	18	11

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2016), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	9.9	55.9	61.1	23.9
4-6 Tage pro Woche	8.5	14.7	13.7	13.0
2-3 Tage pro Woche	12.7	8.8	13.7	19.6
1 Tag pro Woche oder weniger	22.5	8.8	8.4	30.4
nie	46.5	11.8	3.2	13.0
N**	71	34	95	46
fehlende Angaben	33	79	20	20

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.1	21.3	22.1	20.5	24.0	-	15.1	18.3	27.3
Standardabweichung	4.0	7.0	6.6	5.9	13.1	-	2.3	7.1	13.3
1. Quartil	14.0	18.0	18.0	16.5	18.0	-	14.0	15.0	18.0
Medianwert	16.0	19.5	20.0	18.5	20.0	-	15.0	16.0	24.0
3. Quartil	17.0	23.0	24.5	24.0	23.0	-	16.0	20.0	30.5
N*	1 147	108	152	28	9	0	640	55	12
fehlende Angaben	1 065	100	76	13	16	1	322	51	6
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	22.0	22.6	24.1	19.4	18.8	-	16.0	20.4	44.0
Standardabweichung	8.9	7.2	8.0	4.6	4.1	-	3.8	8.6	44.0
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	16.0	15.5	-	15.0	16.0	44.0
Medianwert	20.0	20.0	22.0	19.0	18.0	-	16.0	18.0	44.0
3. Quartil	25.0	25.0	27.0	20.0	22.0	-	17.0	20.0	44.0
N*	878	61	69	15	4	0	350	48	1
fehlende Angaben	1 334	147	159	26	21	1	612	58	17
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	31.1	24.0	25.7	23.2	31.6	-	17.4	25.1	31.5
Standardabweichung	12.4	7.8	7.5	7.2	13.7	-	4.8	12.8	12.8
1. Quartil	21.0	19.0	20.0	18.0	20.0	-	15.0	16.0	27.0
Medianwert	30.0	22.0	25.0	20.0	28.0	-	16.0	20.0	29.0
3. Quartil	40.0	27.0	28.5	28.0	34.0	-	18.0	30.0	34.0
N*	1 128	106	144	25	14	0	629	68	11
fehlende Angaben	1 084	102	84	16	11	1	333	38	7
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	25.5	8.9	8.4	5.0	7.2	-	5.4	18.9	7.8
Standardabweichung	13.1	7.1	6.6	5.2	8.6	-	6.2	16.2	6.5
1. Quartil	15.7	2.9	3.8	1.0	0.2	-	1.6	2.8	2.4
Medianwert	24.5	7.7	6.6	1.7	4.6	-	2.8	17.9	6.8
3. Quartil	35.1	12.6	10.8	8.4	16.8	-	6.5	26.9	10.7
N*	558	21	67	15	3	0	469	32	6
fehlende Angaben	409	10	25	7	4	0	166	33	4

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	18.3	20.7	20.3	18.6	31.2	20.0	15.2	17.1	-
Standardabweichung	7.2	5.8	7.3	4.2	16.8	-	2.2	5.0	-
1. Quartil	15.0	17.0	16.0	15.0	21.0	20.0	14.0	14.0	-
Medianwert	16.0	19.5	17.0	17.0	24.5	20.0	15.0	16.0	-
3. Quartil	20.0	23.0	22.0	21.0	38.5	20.0	16.0	19.0	-
N*	441	30	33	19	12	1	157	49	0
fehlende Angaben	466	30	20	6	20	1	70	25	3
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	25.9	18.9	23.4	18.9	28.8	-	16.2	20.2	-
Standardabweichung	11.4	6.3	11.5	3.8	19.3	-	3.3	5.6	-
1. Quartil	18.0	17.0	16.0	16.0	22.0	-	15.0	16.0	-
Medianwert	22.0	19.0	19.0	17.0	28.0	-	16.0	19.0	-
3. Quartil	30.0	23.0	29.0	23.0	42.0	-	17.0	23.5	-
N*	366	19	14	11	6	0	84	40	0
fehlende Angaben	541	41	39	14	26	2	143	34	3
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.6	22.6	25.2	21.2	39.3	20.0	17.0	22.5	-
Standardabweichung	12.6	7.0	10.7	4.8	15.9	-	3.9	8.4	-
1. Quartil	25.0	17.5	17.0	17.0	28.5	20.0	15.0	17.0	-
Medianwert	33.0	21.5	20.0	22.0	38.0	20.0	16.0	20.0	-
3. Quartil	44.0	24.0	31.0	24.0	47.0	20.0	18.0	29.0	-
N*	515	28	33	17	16	1	148	46	0
fehlende Angaben	392	32	20	8	16	1	79	28	3
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	27.2	2.9	8.0	7.3	2.1	6.2	6.0	20.2	-
Standardabweichung	13.7	3.8	6.6	7.0	0.5	-	7.8	15.7	-
1. Quartil	16.6	0.5	2.3	1.5	1.8	6.2	1.3	6.1	-
Medianwert	27.4	1.2	6.5	3.8	2.1	6.2	2.8	19.0	-
3. Quartil	39.4	4.2	12.2	12.7	2.5	6.2	6.7	31.2	-
N*	191	7	14	12	2	1	116	34	0
fehlende Angaben	160	4	7	1	8	1	32	14	2

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2016), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.7	21.2	21.8	19.8	28.1	20.0	15.1	17.7	27.3
Standardabweichung	5.2	6.8	6.7	5.3	15.4	-	2.3	6.2	13.3
1. Quartil	15.0	17.0	18.0	16.0	18.0	20.0	14.0	14.0	18.0
Medianwert	16.0	19.5	20.0	18.0	23.0	20.0	15.0	16.0	24.0
3. Quartil	18.0	23.0	24.0	22.0	30.0	20.0	16.0	19.0	30.5
N*	1 588	138	185	47	21	1	797	104	12
fehlende Angaben	1 531	130	96	19	36	2	392	76	9
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	23.1	21.7	24.0	19.2	24.8	-	16.1	20.3	44.0
Standardabweichung	9.8	7.2	8.6	4.2	15.5	-	3.7	7.4	
1. Quartil	18.0	18.0	18.0	16.0	16.0	-	15.0	16.0	44.0
Medianwert	20.0	20.0	22.0	18.5	23.0	-	16.0	18.0	44.0
3. Quartil	26.0	24.0	27.0	22.0	30.0	-	17.0	21.5	44.0
N*	1 244	80	83	26	10	0	434	88	1
fehlende Angaben	1 875	188	198	40	47	3	755	92	20
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	32.2	23.7	25.6	22.4	35.7	20.0	17.3	24.0	31.5
Standardabweichung	12.6	7.7	8.2	6.4	15.2	-	4.7	11.3	12.8
1. Quartil	22.0	19.0	20.0	17.0	25.0	20.0	15.0	16.0	27.0
Medianwert	30.0	22.0	25.0	20.5	32.5	20.0	16.0	20.0	29.0
3. Quartil	40.0	27.0	29.0	25.0	44.0	20.0	18.0	30.0	34.0
N*	1 643	134	177	42	30	1	777	114	11
fehlende Angaben	1 476	134	104	24	27	2	412	66	10
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	25.9	7.4	8.4	6.0	5.2	6.2	5.6	19.6	7.8
Standardabweichung	13.3	6.9	6.5	6.1	6.7	-	6.6	15.8	6.5
1. Quartil	16.1	2.0	3.5	1.0	1.8	6.2	1.6	3.4	2.4
Medianwert	24.9	4.1	6.6	3.6	2.5	6.2	2.8	17.9	6.8
3. Quartil	35.6	12.0	10.9	10.0	4.6	6.2	6.5	30.3	10.7
N*	749	28	81	27	5	1	585	66	6
fehlende Angaben	569	14	32	8	12	1	198	47	6

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	21.9	13.8	16.0	21.6
Standardabweichung	6.2	4.4	2.3	14.6
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	15.5
Medianwert	20.0	13.0	15.5	18.5
3. Quartil	26.0	15.0	17.0	21.0
N*	31	41	6	20
fehlende Angaben	63	54	9	18
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	25.7	15.7	18.7	19.1
Standardabweichung	9.6	8.2	4.0	5.4
1. Quartil	18.0	13.0	16.0	15.5
Medianwert	21.5	15.0	18.0	18.0
3. Quartil	30.0	17.0	20.0	21.5
N*	22	41	7	12
fehlende Angaben	72	54	8	26
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	28.5	16.9	18.2	25.4
Standardabweichung	9.7	6.5	4.2	14.2
1. Quartil	21.0	14.0	16.0	18.0
Medianwert	26.0	16.0	18.0	22.0
3. Quartil	33.0	18.0	20.0	26.0
N*	45	54	9	21
fehlende Angaben	49	41	6	17
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	8.7	7.2	16.3	7.6
Standardabweichung	7.3	9.1	18.1	6.6
1. Quartil	2.2	2.1	2.5	2.6
Medianwert	7.2	4.0	9.7	5.1
3. Quartil	14.9	6.3	36.7	11.1
N*	18	36	3	15
fehlende Angaben	38	35	9	11

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	37.5	15.8	17.3	22.5
Standardabweichung	7.8	4.1	6.2	8.2
1. Quartil	32.0	13.5	14.0	16.0
Medianwert	37.5	14.5	16.0	19.5
3. Quartil	43.0	17.0	20.5	25.0
N*	2	12	56	10
fehlende Angaben	8	6	44	18
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	35.5	15.8	18.0	22.5
Standardabweichung	10.6	2.9	6.2	9.5
1. Quartil	28.0	14.0	14.0	16.0
Medianwert	35.5	15.0	16.0	17.5
3. Quartil	43.0	17.0	21.0	28.5
N*	2	10	46	8
fehlende Angaben	8	8	54	20
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	37.3	16.9	19.8	25.6
Standardabweichung	4.9	3.7	6.8	12.4
1. Quartil	34.0	15.0	15.0	18.0
Medianwert	35.0	16.0	19.0	20.0
3. Quartil	43.0	19.0	22.0	32.0
N*	3	13	58	11
fehlende Angaben	7	5	42	17
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	5.5	3.0	5.6	10.0
Standardabweichung	2.2	1.6	7.2	11.2
1. Quartil	3.9	2.0	1.6	5.3
Medianwert	5.5	2.6	3.4	6.8
3. Quartil	7.0	4.0	4.9	8.6
N*	2	11	24	6
fehlende Angaben	4	4	21	11

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2016), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	22.8	14.2	17.1	21.9
Standardabweichung	7.2	4.4	5.9	12.7
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	16.0
Medianwert	20.0	14.0	16.0	18.5
3. Quartil	26.0	15.0	20.0	25.0
N*	33	53	62	30
fehlende Angaben	71	60	53	36
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	26.5	15.7	18.1	20.5
Standardabweichung	9.8	7.4	5.9	7.3
1. Quartil	18.5	13.0	14.0	16.0
Medianwert	24.5	15.0	17.0	18.0
3. Quartil	31.5	17.0	20.0	23.5
N*	24	51	53	20
fehlende Angaben	80	62	62	46
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	29.1	16.9	19.6	25.5
Standardabweichung	9.7	6.1	6.5	13.4
1. Quartil	21.0	14.0	15.0	18.0
Medianwert	26.5	16.0	19.0	21.5
3. Quartil	34.5	18.0	22.0	26.5
N*	48	67	67	32
fehlende Angaben	56	46	48	34
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	8.4	6.2	6.8	8.3
Standardabweichung	7.0	8.2	9.1	7.9
1. Quartil	2.4	2.0	1.7	4.3
Medianwert	6.8	3.0	3.5	5.7
3. Quartil	12.7	6.0	9.7	10.8
N*	20	47	27	21
fehlende Angaben	42	39	30	22

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2016)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	28.8	20.0	27.1	5.3	11.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	8.3	0.0	3.4
rauchen/inhalieren	47.1	40.0	45.7	16.7	17.6	16.9	6.7	15.4	10.7	98.2	99.4	98.4	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	46.7	23.1	35.7	0.9	0.6	0.8	91.7	88.2	89.7
sniffen	21.2	36.0	24.0	77.3	67.6	75.3	46.7	61.5	53.6	0.1	0.0	0.1	0.0	5.9	3.4
anderes	1.0	4.0	1.6	0.8	2.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	5.9	3.4
N**	104	25	129	132	34	166	15	13	28	813	181	994	12	17	29
fehlende Angaben	69	19	88	85	16	101	11	6	17	149	46	195	10	8	18

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injektion im Leben*																
ja	4.0	2.8	3.6	55.9	45.9	53.9	12.2	30.6	15.5	0.8	0.6	0.8	6.1	4.7	5.7	230
nie	94.8	96.6	95.3	40.6	48.6	42.2	86.6	69.4	83.5	98.6	99.4	98.8	92.7	94.7	93.3	3 767
möchte nicht antworten	1.2	0.6	1.0	3.5	5.4	3.9	1.2	0.0	1.0	0.6	0.0	0.4	1.2	0.6	1.0	42
N**	1 562	668	2 230	143	37	180	164	36	200	726	165	891	2 902	1 137	4 039	4 039
fehlende Angaben	650	239	889	65	23	88	64	17	81	236	62	298	1 141	402	1 543	1 543
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	4.2	1.2	3.5	49.3	50.0	49.4	28.1	41.7	31.8	4.5	0.0	3.9	12.7	10.4	12.2	75
nein	95.8	98.8	96.5	50.7	50.0	50.6	71.9	58.3	68.2	95.5	100.0	96.1	87.3	89.6	87.8	539
N**	261	81	342	69	14	83	32	12	44	66	10	76	480	134	614	614
fehlende Angaben	1 951	826	2 777	139	46	185	196	41	237	896	217	1 113	3 563	1 405	4 968	4 968
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	4.1	1.2	3.4	44.8	63.6	47.8	19.4	18.2	19.0	4.5	0.0	3.9	10.5	7.5	9.9	60
nein	95.9	98.8	96.6	55.2	36.4	52.2	80.6	81.8	81.0	95.5	100.0	96.1	89.5	92.5	90.1	547
N**	268	86	354	58	11	69	31	11	42	67	9	76	474	133	607	607
fehlende Angaben	1 944	821	2 765	150	49	199	197	42	239	895	218	1 113	3 569	1 406	4 975	4 975
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	25.0	33.3	28.6	28.0	40.0	30.0	25.0	50.0	37.5	-	-	-	25.7	42.9	30.6	15
nein	75.0	66.7	71.4	68.0	60.0	66.7	50.0	50.0	50.0	-	-	-	68.6	50.0	63.3	31
möchte nicht antworten	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	25.0	0.0	12.5	-	-	-	5.7	7.1	6.1	3
N**	4	3	7	25	5	30	4	4	8	0	0	0	35	14	49	49
fehlende Angaben	50	15	65	47	9	56	14	7	21	3	1	4	120	35	155	155
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nein	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	62
N**	23	11	34	15	4	19	2	4	6	1	0	1	42	20	62	62
fehlende Angaben	31	7	38	57	10	67	16	7	23	2	1	3	113	29	142	142
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fehlende Angaben	54	18	72	72	14	86	18	11	29	3	1	4	155	49	204	204

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	3.9	0.0	18.2	10.0	50.0	0.0	50.0	3.6	6.7	4.4	5
15-16	6.7	40.0	11.4	10.3	8.3	9.8	22.2	36.4	30.0	0.0	0.0	0.0	9.6	23.3	13.3	15
17-18	46.7	40.0	45.7	15.4	50.0	23.5	33.3	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	28.9	30.0	29.2	33
19-20	23.3	0.0	20.0	23.1	16.7	21.6	22.2	18.2	20.0	0.0	0.0	0.0	21.7	13.3	19.5	22
21-25	16.7	20.0	17.1	25.6	16.7	23.5	11.1	9.1	10.0	0.0	0.0	0.0	20.5	16.7	19.5	22
26-30	6.7	0.0	5.7	12.8	8.3	11.8	11.1	9.1	10.0	0.0	0.0	0.0	10.8	6.7	9.7	11
30-39	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	5.9	0.0	9.1	5.0	50.0	0.0	50.0	4.8	3.3	4.4	5
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	30	5	35	39	12	51	9	11	20	2	0	2	83	30	113	113
<i>fehlende Angaben</i>	32	14	46	41	5	46	11	0	11	4	1	5	94	23	117	117

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	17.1	22.7	5.3	34.8	0.0	10.5	29.4	27.8
Heroin	0.8	2.5	5.5	2.6	8.7	0.0	0.4	2.9	0.0
Methadon	0.3	6.0	0.9	0.0	4.3	0.0	0.1	1.0	0.0
Buprenorphin	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
andere Opioide	0.3	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.3	19.6	2.7	15.8	17.4	0.0	5.1	4.9	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	1.5	5.9	5.3	4.3	0.0	3.0	0.0	11.1
Metamphetamine	0.1	0.5	1.4	5.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.0	1.5	4.1	13.2	8.7	0.0	3.5	0.0	16.7
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.2	11.1	3.6	7.9	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
GHB/GBL	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.1	1.0	5.6
LSD	0.5	1.0	2.7	2.6	0.0	0.0	1.9	0.0	5.6
Ketamin	0.1	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	6.4	19.1	24.5	18.4	21.7	0.0	-	15.7	11.1
Tabak	9.9	17.1	16.4	13.2	26.1	0.0	11.7	-	33.3
andere Substanz(en)	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	0.0
Glücksspielsucht	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0
Essstörungen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	83.5	57.3	55.5	55.3	34.8	100.0	78.4	54.9	61.1
N**	1 982	199	220	38	23	1	913	102	18
<i>fehlende Angaben</i>	230	9	8	3	2	0	49	4	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	10.7	11.3	8.7	24.1	0.0	5.8	12.7	0.0
Heroin	0.7	8.9	13.2	4.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.5	14.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.3	23.2	0.0	4.3	3.4	50.0	4.3	2.8	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	11.3	4.3	0.0	0.0	3.4	2.8	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.4	3.6	7.5	0.0	0.0	50.0	2.9	1.4	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.0
LSD	0.0	3.6	1.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
Ketamin	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	4.8	12.5	20.8	8.7	3.4	50.0	-	8.5	33.3
Tabak	8.9	19.6	7.5	8.7	13.8	0.0	11.6	-	0.0
andere Substanz(en)	0.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Essstörungen	0.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	84.3	46.4	60.4	82.6	65.5	50.0	84.1	78.9	66.7
N**	811	56	53	23	29	2	207	71	3
fehlende Angaben	96	4	0	2	3	0	20	3	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	15.7	20.5	6.6	28.8	0.0	9.6	22.5	23.8
Heroin	0.8	3.9	7.0	3.3	5.8	0.0	0.4	1.7	0.0
Methadon	0.3	7.8	1.5	0.0	1.9	0.0	0.1	0.6	0.0
Buprenorphin	0.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
andere Opioide	0.3	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.0	20.4	2.2	11.5	9.6	33.3	5.0	4.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.7	3.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Amphetamine	0.9	1.2	7.0	4.9	1.9	0.0	3.0	1.2	9.5
Metamphetamine	0.1	0.4	1.5	3.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.8	2.0	4.8	8.2	3.8	33.3	3.4	0.6	14.3
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.4	10.6	2.9	4.9	0.0	0.0	0.6	2.9	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.2	1.2	4.8
LSD	0.4	1.6	2.6	1.6	0.0	0.0	1.8	0.0	4.8
Ketamin	0.1	0.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	5.9	17.6	23.8	14.8	11.5	33.3	-	12.7	14.3
Tabak	9.6	17.6	14.7	11.5	19.2	0.0	11.7	-	28.6
andere Substanz(en)	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
Glücksspielsucht	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
Essstörungen	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	83.7	54.9	56.4	65.6	51.9	66.7	79.5	64.7	61.9
N**	2 793	255	273	61	52	3	1 120	173	21
<i>fehlende Angaben</i>	326	13	8	5	5	0	69	7	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	6.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.4	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	1.2	0.0	0.0
Tabak	2.4	0.0	0.0	0.0
andere Substanz(en)	2.4	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	1.2	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	1.2	-	0.0	9.7
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	55.8	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	89.3	41.9	100.0	90.3
N**	84	86	13	31
<i>fehlende Angaben</i>	10	9	2	7

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	0.0	0.0	4.7	5.6
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	1.2	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	1.2	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	1.2	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	1.2	0.0
Tabak	0.0	0.0	2.4	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	66.7	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	100.0	33.3	91.8	94.4
N**	8	18	85	18
<i>fehlende Angaben</i>	2	0	15	10

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2016), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	5.4	0.0	4.1	2.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.2	0.0	1.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	1.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	1.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	1.0	1.0	0.0
Tabak	2.2	0.0	2.0	0.0
andere Substanz(en)	2.2	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	1.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	1.1	-	0.0	6.1
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	57.7	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	90.2	40.4	92.9	91.8
N**	92	104	98	49
<i>fehlende Angaben</i>	12	9	17	17

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol*	Opioide			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	31.0	40.0	32.4	20.9	25.0	21.3	8.5	9.1	8.6	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	37.5	16.6	17.9	16.8	40
4-6 Tage pro Woche	13.8	0.0	11.8	18.6	25.0	19.1	11.0	18.2	11.8	0.0	40.0	16.7	25.0	0.0	12.5	12.6	12.8	12.6	30
2-3 Tage pro Woche	24.1	40.0	26.5	27.9	25.0	27.7	29.3	9.1	26.9	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	24.6	17.9	23.5	56
1 Tag pro Woche oder weniger	20.7	20.0	20.6	20.9	0.0	19.1	36.6	27.3	35.5	42.9	40.0	41.7	25.0	0.0	12.5	28.1	25.6	27.7	66
kein Konsum	10.3	0.0	8.8	11.6	25.0	12.8	14.6	36.4	17.2	57.1	20.0	41.7	0.0	25.0	12.5	18.1	25.6	19.3	46
N**	29	5	34	43	4	47	82	11	93	7	5	12	4	4	8	199	39	238	238
fehlende Angaben	179	55	234	185	49	234	880	216	1 096	18	27	45	238	153	391	4 071	2 249	6 320	6 320
Opioide*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	8.3	0.0	6.3	28.6	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	15.0	6
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	16.7	0.0	12.5	28.6	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	10.0	4
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	0.0	6.3	14.3	33.3	23.1	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	13.8	27.3	17.5	7
kein Konsum	66.7	100.0	75.0	28.6	66.7	46.2	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	72.7	57.5	23
N**	12	4	16	7	6	13	4	0	4	2	1	3	0	0	0	29	11	40	40
fehlende Angaben	2 200	903	3 103	221	47	268	958	227	1 185	23	31	54	242	157	399	4 241	2 277	6 518	6 518
Kokain*	Alkohol			Opioide			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	6.0	5.6	5.9	8.0	14.3	9.4	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	6.2	5.1	6.0	11
4-6 Tage pro Woche	4.5	0.0	3.5	8.0	0.0	6.3	5.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	7
2-3 Tage pro Woche	17.9	16.7	17.6	16.0	42.9	21.9	2.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	15.4	13.0	24
1 Tag pro Woche oder weniger	28.4	11.1	24.7	16.0	42.9	21.9	30.8	22.2	29.2	25.0	0.0	20.0	0.0	100.0	50.0	24.8	20.5	23.9	44
kein Konsum	43.3	66.7	48.2	52.0	0.0	40.6	61.5	77.8	64.6	50.0	100.0	60.0	100.0	0.0	50.0	51.7	59.0	53.3	98
N**	67	18	85	25	7	32	39	9	48	4	1	5	1	1	2	145	39	184	184
fehlende Angaben	2 145	889	3 034	183	53	236	923	218	1 141	21	31	52	241	156	397	4 125	2 249	6 374	6 374
Cannabis*	Alkohol			Opioide			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	33.0	16.1	29.0	22.2	80.0	31.3	32.6	33.3	32.7	25.0	100.0	40.0	0.0	0.0	0.0	29.4	29.6	29.5	74
4-6 Tage pro Woche	3.0	6.5	3.8	18.5	0.0	15.6	7.0	11.1	7.7	25.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.4	7.2	18
2-3 Tage pro Woche	15.0	9.7	13.7	29.6	0.0	25.0	14.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	7.4	15.1	38
1 Tag pro Woche oder weniger	19.0	16.1	18.3	11.1	0.0	9.4	30.2	22.2	28.8	50.0	0.0	40.0	0.0	100.0	50.0	19.8	16.7	19.1	48
kein Konsum	30.0	51.6	35.1	18.5	20.0	18.8	16.3	33.3	19.2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	26.4	38.9	29.1	73
N**	100	31	131	27	5	32	43	9	52	4	1	5	1	1	2	197	54	251	251
fehlende Angaben	2 112	876	2 988	181	55	236	185	44	229	21	31	52	241	156	397	4 073	2 234	6 307	6 307

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	6.7	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	4.2	5.0	4.4	3			
4-6 Tage pro Woche	13.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.1	15.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.4	5.0	8.8	6			
2-3 Tage pro Woche	6.7	20.0	10.0	33.3	0.0	33.3	33.3	20.0	28.6	0.0	14.3	3.7	0.0	0.0	0.0	10.4	15.0	11.8	8			
1 Tag pro Woche oder weniger	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	7.1	25.0	42.9	29.6	0.0	0.0	0.0	18.8	15.0	17.6	12			
kein Konsum	53.3	80.0	60.0	66.7	0.0	66.7	44.4	60.0	50.0	60.0	42.9	55.6	0.0	0.0	0.0	56.3	60.0	57.4	39			
N**	15	5	20	3	0	3	9	5	14	20	7	27	0	1	1	48	20	68	68			
fehlende Angaben	2 197	902	3 099	205	60	265	219	48	267	942	220	1 162	242	156	398	4 222	2 268	6 490	6 490			
Hypnotika/Sedativa*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	2			
1 Tag pro Woche oder weniger	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	2			
kein Konsum	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	1			
N**	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5			
fehlende Angaben	2 209	907	3 116	208	60	268	226	53	279	962	227	1 189	242	157	399	4 265	2 288	6 553	6 553			
Halluzinogene*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	12.5	0.0	12.5	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	8.6	3			
1 Tag pro Woche oder weniger	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	33.3	16.7	0.0	14.3	15.4	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	17.2	16.7	17.1	6			
kein Konsum	62.5	0.0	62.5	0.0	50.0	33.3	83.3	100.0	85.7	76.9	100.0	81.3	0.0	0.0	0.0	72.4	83.3	74.3	26			
N**	8	0	8	1	2	3	6	1	7	13	3	16	0	0	0	29	6	35	35			
fehlende Angaben	2 204	907	3 111	207	58	265	222	52	274	949	224	1 173	242	157	399	4 241	2 282	6 523	6 523			
andere Substanzen*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1			
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
kein Konsum	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1			
N**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2			
fehlende Angaben	2 211	907	3 118	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	242	157	399	4 268	2 288	6 556	6 556			

*Als weiteres Problem. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	12.0	9.9	11.4	8.2	23.5	11.5	5.8	8.3	6.2	14.3	10.9	13.6	13.6	13.8	13.6	364
1-mal pro Monat oder weniger	3.9	4.9	4.2	18.0	29.4	20.5	10.1	33.3	13.6	24.5	32.6	26.0	10.4	11.5	10.7	285
2-4-mal pro Monat	7.7	7.2	7.5	16.4	11.8	15.4	30.4	25.0	29.6	45.3	42.4	44.7	18.0	14.0	16.9	451
2-3-mal pro Woche	16.6	14.8	16.0	27.9	17.6	25.6	29.0	16.7	27.2	11.8	8.7	11.2	16.0	14.7	15.7	418
4-mal oder mehr pro Woche	59.9	63.3	60.9	29.5	17.6	26.9	24.6	16.7	23.5	4.3	5.4	4.5	42.0	46.1	43.1	1 151
N**	1 226	515	1 741	61	17	78	69	12	81	400	92	492	1 920	749	2 669	2 669
fehlende Angaben	986	392	1 378	147	43	190	159	41	200	562	135	697	2 123	790	2 913	2 913
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.1	4.8	6.4	49.0	66.7	52.4	30.0	44.4	31.9	55.8	59.7	56.6	21.3	20.7	21.1	465
3 oder 4	18.4	18.9	18.5	21.6	16.7	20.6	30.0	33.3	30.4	29.5	27.3	29.0	22.3	20.3	21.8	479
5 oder 6	24.9	23.1	24.3	15.7	8.3	14.3	15.0	11.1	14.5	8.3	11.7	9.0	20.0	19.2	19.8	436
7 bis 9	19.6	26.8	21.8	5.9	0.0	4.8	13.3	11.1	13.0	3.2	0.0	2.6	14.5	20.0	16.1	354
10 oder mehr	30.0	26.4	28.9	7.8	8.3	7.9	11.7	0.0	10.1	3.2	1.3	2.8	21.9	19.7	21.3	468
N**	1 044	455	1 499	51	12	63	60	9	69	312	77	389	1 573	629	2 202	2 202
fehlende Angaben	1 168	452	1 620	157	48	205	168	44	212	650	150	800	2 470	910	3 380	3 380
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	15.5	14.3	15.1	43.5	56.3	46.8	25.4	40.0	27.5	47.0	66.7	50.8	26.7	31.1	27.9	665
weniger als 1-mal pro Monat	12.3	11.8	12.2	21.7	25.0	22.6	27.1	10.0	24.6	35.3	22.2	32.8	18.4	14.1	17.1	408
1-mal pro Monat	11.9	11.6	11.8	6.5	0.0	4.8	23.7	30.0	24.6	11.1	6.2	10.1	11.6	9.3	11.0	261
1-mal pro Woche	23.5	22.7	23.3	13.0	0.0	9.7	15.3	10.0	14.5	6.0	4.9	5.8	18.0	17.4	17.8	424
fast jeden Tag	36.8	39.6	37.7	15.2	18.8	16.1	8.5	10.0	8.7	0.6	0.0	0.5	25.3	28.2	26.1	622
N**	1 105	475	1 580	46	16	62	59	10	69	334	81	415	1 691	689	2 380	2 380
fehlende Angaben	1 107	432	1 539	162	44	206	169	43	212	628	146	774	2 352	850	3 202	3 202

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	38.8	41.9	39.7	11.1	23.5	14.1	19.1	23.1	19.8	21.5	12.5	19.7	32.5	38.0	34.1	798
1 Tag pro Woche oder weniger	1.4	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	5.5	4.8	5.4	2.5	1.4	2.2	51
2-3 Tage pro Woche	1.0	1.5	1.1	0.0	5.9	1.4	0.0	0.0	0.0	5.0	6.7	5.4	1.9	2.3	2.0	47
4-6 Tage pro Woche	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	1.9	1.9	1.9	1.1	0.7	1.0	23
einmal täglich	3.1	3.0	3.0	7.4	5.9	7.0	2.9	15.4	4.9	2.9	6.7	3.6	3.0	3.8	3.2	75
mehrmals täglich	55.0	52.3	54.2	81.5	64.7	77.5	73.5	61.5	71.6	63.2	67.3	64.1	59.0	53.8	57.5	1 343
N**	916	396	1 312	54	17	71	68	13	81	419	104	523	1 647	690	2 337	2 337
fehlende Angaben	1 296	511	1 807	154	43	197	160	40	200	543	123	666	2 396	849	3 245	3 245
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	19.7	22.0	20.3	15.6	27.3	17.9	28.8	22.2	27.9	57.8	67.5	59.9	32.1	33.0	32.3	455
11 bis 20	47.4	51.5	48.6	46.7	54.5	48.2	50.0	44.4	49.2	34.6	31.3	33.9	43.3	46.2	44.1	621
21 bis 30	22.6	22.0	22.5	28.9	9.1	25.0	11.5	33.3	14.8	5.6	1.2	4.6	17.3	16.1	17.0	239
31 und mehr	10.2	4.5	8.6	8.9	9.1	8.9	9.6	0.0	8.2	2.0	0.0	1.5	7.2	4.7	6.5	92
N**	508	200	708	45	11	56	52	9	61	306	83	389	1 022	385	1 407	1 407
fehlende Angaben	53	30	83	3	2	5	3	1	4	23	8	31	89	43	132	132

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	29.5	82.4	81.0	37.5	80.0	0.0	51.9	53.1	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	25.8	0.0	6.9	25.0	0.0	0.0	9.3	12.5	0.0
kontrollierter Konsum	28.7	5.9	1.7	12.5	20.0	0.0	17.8	25.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	50.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.7	7.8	6.9	25.0	0.0	0.0	15.5	6.3	50.0
anderes	0.1	3.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
N**	725	51	58	8	5	0	129	32	2
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 487</i>	<i>157</i>	<i>170</i>	<i>33</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>833</i>	<i>74</i>	<i>16</i>

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	31.7	82.4	83.3	100.0	42.9	0.0	66.7	42.9	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	19.2	5.9	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	35.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	9.5	28.6	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.2	11.8	8.3	0.0	28.6	0.0	19.0	28.6	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	265	17	12	1	7	0	21	14	0
<i>fehlende Angaben</i>	<i>642</i>	<i>43</i>	<i>41</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>206</i>	<i>60</i>	<i>3</i>

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2016), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	30.1	82.4	81.4	44.4	58.3	0.0	54.0	50.0	0.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	24.0	1.5	7.1	22.2	0.0	0.0	8.0	8.7	0.0
kontrollierter Konsum	30.5	4.4	1.4	11.1	25.0	0.0	16.7	26.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	50.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.5	8.8	7.1	22.2	16.7	0.0	16.0	13.0	50.0
anderes	0.1	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
N**	990	68	70	9	12	0	150	46	2
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 129</i>	<i>200</i>	<i>211</i>	<i>57</i>	<i>45</i>	<i>3</i>	<i>1 039</i>	<i>134</i>	<i>19</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2016), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	28.8	31.3	15.7	42.9	75.0	0.0	20.9	37.1	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	28.2	45.8	39.2	28.6	75.0	0.0	15.5	40.0	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	10.6	22.9	3.9	0.0	25.0	0.0	11.8	22.9	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	10.8	22.9	7.8	0.0	25.0	0.0	17.3	22.9	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.6	2.1	0.0	0.0	25.0	0.0	0.9	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	4.7	4.2	2.0	0.0	25.0	0.0	2.7	0.0	0.0
Halluzinationen	0.8	6.3	3.9	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	8.4	14.6	11.8	14.3	25.0	0.0	9.1	11.4	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	20.2	27.1	17.6	14.3	75.0	0.0	14.5	31.4	50.0
ernsthafte Suizidgedanken	7.5	8.3	11.8	0.0	25.0	0.0	11.8	14.3	50.0
Suizidversuche	3.1	4.2	3.9	0.0	25.0	0.0	0.9	5.7	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
keine	42.4	33.3	51.0	42.9	0.0	0.0	50.0	40.0	0.0
N**	510	48	51	7	4	0	110	35	2
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 702</i>	<i>160</i>	<i>177</i>	<i>34</i>	<i>21</i>	<i>1</i>	<i>852</i>	<i>71</i>	<i>16</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2016), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	52.7	60.0	50.0	0.0	80.0	0.0	33.3	53.8	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	42.4	50.0	75.0	0.0	60.0	0.0	27.8	61.5	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	14.3	0.0	25.0	0.0	40.0	0.0	11.1	15.4	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	10.8	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	11.1	15.4	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	7.9	0.0	12.5	0.0	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0
Halluzinationen	1.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	6.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	38.9	20.0	50.0	0.0	100.0	0.0	22.2	69.2	0.0
ernsthafte Suizidgedanken	9.4	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	30.8	0.0
Suizidversuche	3.4	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	11.1	23.1	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
keine	16.7	30.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	23.1	0.0
N**	203	10	8	0	5	0	18	13	1
<i>fehlende Angaben</i>	<i>704</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>209</i>	<i>61</i>	<i>2</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2016), Männer und Frauen
Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	35.6	36.2	20.3	42.9	77.8	0.0	22.7	41.7	0.0
schwere Angst- und Spannungszustände	32.3	46.6	44.1	28.6	66.7	0.0	17.2	45.8	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	11.6	19.0	6.8	0.0	33.3	0.0	11.7	20.8	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	10.8	19.0	6.8	0.0	33.3	0.0	16.4	20.8	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.4	1.7	0.0	0.0	11.1	0.0	0.8	2.1	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	5.6	3.4	3.4	0.0	22.2	0.0	3.9	0.0	0.0
Halluzinationen	0.8	5.2	5.1	0.0	0.0	0.0	3.9	4.2	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	8.0	13.8	10.2	14.3	11.1	0.0	7.8	14.6	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	25.5	25.9	22.0	14.3	88.9	0.0	15.6	41.7	33.3
ernsthafte Suizidgedanken	8.0	6.9	10.2	0.0	55.6	0.0	10.2	18.8	33.3
Suizidversuche	3.2	3.4	3.4	0.0	33.3	0.0	2.3	10.4	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
keine	35.1	32.8	47.5	42.9	0.0	0.0	50.0	35.4	0.0
N**	713	58	59	7	9	0	128	48	3
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 406</i>	<i>210</i>	<i>222</i>	<i>59</i>	<i>48</i>	<i>3</i>	<i>1 061</i>	<i>132</i>	<i>18</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2016)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	41.5	37.8	38.6	363
Tochter/Sohn	13.4	10.8	11.4	107
Schwester/Bruder	5.1	4.6	4.7	44
Ehe-/LebenspartnerIn	29.0	39.3	36.9	347
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	2.3	2.4	2.3	22
KollegIn/FreundIn	2.8	2.2	2.3	22
ArbeitgeberIn/LehrerIn	2.3	1.0	1.3	12
VormundIn/BeistandIn	0.5	0.0	0.1	1
anderes	3.2	2.1	2.3	22
N**	217	723	940	940
<i>fehlende Angaben</i>	10	26	36	36

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2016)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	51.8	265
Heroin	4.5	23
Methadon	0.2	1
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.0	0
andere Opioide	0.6	3
Kokain-Pulver	7.4	38
Crack-Kokain	0.0	0
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	0.8	4
Metamphetamine	0.4	2
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.2	1
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.2	1
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1
LSD	0.0	0
Ketamin	0.2	1
andere Halluzinogene	0.2	1
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	23.6	121
Tabak	1.2	6
andere Substanz(en)	0.6	3
Glücksspielsucht	2.0	10
Computer-bzw. Internetsucht	2.9	15
Essstörungen	0.8	4
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.8	9
N**	512	512
<i>fehlende Angaben</i>	<i>464</i>	<i>464</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			71.6			76.7			83.8			83.3			22.2			65.2	3 935
Frauen			28.4			23.3			16.2			16.7			77.8			34.8	2 100
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2 116	839	2 955	197	60	257	191	37	228	837	168	1 005	215	753	968	3 935	2 100	6 035	6 035
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	1.9	1.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	50
15-19	1.8	1.5	1.8	0.0	1.7	0.4	5.8	13.5	7.0	58.9	56.5	58.5	4.2	2.3	2.7	15.7	7.8	13.0	781
20-24	3.6	2.6	3.3	5.1	13.3	7.0	11.0	10.8	11.0	15.6	19.6	16.2	5.2	4.3	4.5	7.5	6.0	7.0	421
25-29	5.7	4.1	5.2	9.1	16.7	10.9	20.9	21.6	21.1	9.2	8.3	9.1	5.7	7.5	7.1	8.0	7.4	7.8	467
30-34	10.4	8.1	9.7	14.7	21.7	16.3	18.3	10.8	17.1	5.0	5.4	5.1	4.7	8.3	7.5	9.5	8.8	9.3	559
35-39	11.3	10.7	11.1	17.3	8.3	15.2	18.3	18.9	18.4	4.1	4.8	4.2	6.6	9.0	8.5	10.0	9.4	9.8	589
40-44	11.1	10.7	11.0	20.8	10.0	18.3	12.0	10.8	11.8	3.1	0.6	2.7	8.0	11.8	11.0	9.6	9.8	9.7	582
45-49	13.0	15.3	13.6	15.7	16.7	16.0	6.3	10.8	7.0	1.1	0.6	1.0	11.8	15.3	14.5	9.7	13.1	10.9	655
50-54	14.4	15.3	14.6	9.6	10.0	9.7	5.8	0.0	4.8	0.6	1.2	0.7	15.6	15.4	15.4	10.1	12.9	11.1	667
55-59	12.2	12.4	12.3	3.0	1.7	2.7	0.5	2.7	0.9	0.5	0.0	0.4	14.6	9.9	11.0	8.1	9.7	8.6	520
60-64	8.0	10.7	8.8	4.6	0.0	3.5	1.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	8.5	5.8	6.4	5.5	6.9	6.0	360
65-69	4.6	4.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	2.9	3.8	3.2	193
70 -74	2.6	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.5	3.5	1.6	2.5	1.9	115
75 und mehr	1.1	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.0	2.7	1.0	1.2	1.0	63
N**	2 115	839	2 954	197	60	257	191	37	228	836	168	1 004	212	746	958	3 930	2 092	6 022	6 022
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	10	5	8	13	13
Alter																			
Mittelwert	46.7	48.2	47.1	40.9	36.7	39.9	34.0	32.7	33.8	22.2	21.5	22.1	48.1	46.2	46.6	39.5	43.6	40.9	
Standardabweichung	13.4	12.8	13.2	9.7	10.6	10.1	9.3	10.0	9.4	8.3	7.4	8.1	16.2	14.2	14.7	15.9	15.3	15.8	
1. Quartil	36.4	39.0	36.9	33.9	27.3	32.4	27.0	25.0	26.8	17.1	16.8	17.1	37.1	36.2	36.2	25.6	31.7	27.7	
Medianwert	47.3	49.1	48.0	40.8	34.8	40.1	33.2	31.5	33.1	18.4	18.2	18.4	50.3	46.9	47.6	39.2	45.1	41.0	
3. Quartil	56.4	57.7	56.7	46.9	47.2	47.0	40.1	39.8	40.1	24.2	23.9	24.2	57.5	55.0	55.8	51.9	54.7	52.9	
N**	2 115	839	2 954	197	60	257	191	37	228	836	168	1 004	212	746	958	3 930	2 092	6 022	
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	10	5	8	13	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	42.6	34.2	40.3	61.3	78.3	65.0	64.5	64.7	64.5	94.0	91.7	93.6	23.1	24.0	23.8	56.7	41.7	51.9	1 854
verheiratet	31.8	32.1	31.8	18.8	13.0	17.5	20.4	5.9	18.2	4.7	4.6	4.7	52.6	53.0	52.9	25.3	33.4	27.9	997
getrennt	4.2	3.8	4.1	3.8	0.0	2.9	2.2	0.0	1.8	0.0	0.9	0.2	7.7	7.0	7.2	3.1	4.0	3.4	122
geschieden	20.0	24.8	21.3	16.3	8.7	14.6	12.9	29.4	15.5	1.3	2.8	1.6	14.1	14.4	14.3	13.9	17.8	15.1	541
verwitwet	1.2	5.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	1.8	0.8	3.0	1.5	54
reg. Partnerschaft	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	7
N**	1 392	524	1 916	80	23	103	93	17	110	536	108	644	78	313	391	2 426	1 149	3 575	3 575
fehlende Angaben	724	315	1 039	117	37	154	98	20	118	301	60	361	137	440	577	1 509	951	2 460	2 460
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	12.0	13.2	12.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	12.8	16.5	15.7	7.8	10.9	8.8	367
Umland der Grossstadtzentren	15.8	15.5	15.7	4.3	3.7	4.1	17.6	19.0	17.8	10.1	9.2	10.0	4.3	3.8	3.9	13.0	9.8	11.9	497
Mittelzentren	14.4	16.6	15.0	7.4	22.2	10.7	12.0	14.3	12.4	20.2	23.1	20.7	12.8	17.6	16.6	15.8	18.3	16.6	691
Kleinzentren	29.3	29.7	29.4	55.3	51.9	54.5	47.2	33.3	45.0	36.2	36.9	36.3	37.2	34.1	34.7	34.0	33.9	33.9	1 412
rural	28.5	24.9	27.5	33.0	22.2	30.6	22.2	33.3	24.0	32.5	30.8	32.2	33.0	28.1	29.1	29.5	27.1	28.7	1 194
N**	1 637	619	2 256	94	27	121	108	21	129	603	130	733	94	370	464	2 809	1 352	4 161	4 161
fehlende Angaben	479	220	699	103	33	136	83	16	99	234	38	272	121	383	504	1 126	748	1 874	1 874

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.6	36.4	38.6	42.2	35.0	40.5	31.8	48.0	34.4	14.1	15.0	14.2	13.5	11.7	12.0	30.5	27.9	29.6	1 193
mit Herkunftsfamilie	6.7	3.3	5.7	11.7	20.0	13.7	18.9	8.0	17.2	64.8	52.0	62.7	13.5	9.0	9.9	24.6	12.4	20.7	832
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	47.3	54.0	49.3	32.8	35.0	33.3	37.9	24.0	35.7	9.1	13.4	9.8	67.6	77.7	75.7	36.1	51.9	41.2	1 660
mit Freunden/anderen Personen	2.2	1.8	2.1	3.1	2.5	3.0	3.0	8.0	3.8	3.3	3.1	3.3	0.0	1.0	0.8	2.6	2.2	2.5	100
Haft	0.2	0.2	0.2	2.3	0.0	1.8	1.5	4.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.0	0.5	1.5	3.9	5.0	4.2	3.0	8.0	3.8	3.7	2.4	3.5	0.0	0.3	0.3	2.5	1.2	2.1	84
Spital/Klinik	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	13
anderes	2.0	3.2	2.3	3.9	2.5	3.6	3.0	0.0	2.5	4.3	13.4	5.8	5.4	0.3	1.3	3.1	3.8	3.3	134
N**	1 426	602	2 028	128	40	168	132	25	157	667	127	794	74	300	374	2 725	1 302	4 027	4 027
fehlende Angaben	690	237	927	69	20	89	59	12	71	170	41	211	141	453	594	1 210	798	2 008	2 008
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	95.1	94.9	95.1	87.2	90.0	87.9	91.1	93.3	91.5	91.4	88.9	91.0	95.5	96.5	96.3	93.6	94.8	94.0	4 151
instabile Wohnsituation	2.9	3.4	3.1	6.8	10.0	7.5	4.1	0.0	3.4	3.4	3.0	3.3	4.5	3.2	3.4	3.3	3.0	3.2	143
Haft	0.2	0.1	0.2	1.5	0.0	1.2	1.4	3.3	1.7	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	12
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	1.8	1.5	1.7	4.5	0.0	3.5	3.4	3.3	3.4	5.0	8.1	5.5	0.0	0.3	0.2	2.7	2.0	2.5	110
N**	1 599	667	2 266	133	40	173	146	30	176	706	135	841	89	347	436	2 987	1 429	4 416	4 416
fehlende Angaben	517	172	689	64	20	84	45	7	52	131	33	164	126	406	532	948	671	1 619	1 619
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	38.4	41.0	39.2	54.4	30.0	48.9	44.7	33.3	43.2	65.8	47.1	62.7	19.4	23.3	22.5	44.8	36.0	41.9	1 159
zeitweilige Beziehung(en)	3.2	3.9	3.4	5.9	0.0	4.5	7.9	0.0	6.8	4.0	10.0	5.0	1.6	1.2	1.3	3.5	3.0	3.3	92
feste Beziehung, getrennt lebend	8.4	9.1	8.6	0.0	25.0	5.7	10.5	33.3	13.6	18.1	27.1	19.6	8.1	10.9	10.3	10.1	12.0	10.8	298
feste Beziehung, zus. lebend	49.9	46.0	48.7	39.7	45.0	40.9	36.8	33.3	36.4	12.1	15.7	12.7	71.0	64.7	65.9	41.6	48.9	44.0	1 219
N**	1 077	441	1 518	68	20	88	76	12	88	348	70	418	62	258	320	1 844	924	2 768	2 768
fehlende Angaben	1 039	398	1 437	129	40	169	115	25	140	489	98	587	153	495	648	2 091	1 176	3 267	3 267

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlichlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	58.0	43.5	53.9	43.2	30.4	40.2	66.0	63.2	65.5	28.8	22.8	27.7	72.2	63.9	65.6	51.2	47.5	50.0	1 749
Ersparnisse	1.5	1.3	1.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5	1.3	1.7	1.6	1.1	1.2	1.2	41
Rente (AHV/IV u.a.)	18.2	22.5	19.4	12.2	17.4	13.4	9.6	10.5	9.7	4.1	4.4	4.2	13.9	12.0	12.4	13.4	17.6	14.8	517
Sozialhilfe/Fürsorge	12.4	13.2	12.6	28.4	39.1	30.9	7.4	10.5	8.0	9.2	15.8	10.3	0.0	1.3	1.1	11.1	9.5	10.5	369
Arbeitslosenversicherung	5.0	5.0	5.0	6.8	8.7	7.2	8.5	0.0	7.1	1.7	1.8	1.7	0.0	1.0	0.8	4.0	3.0	3.7	129
durch PartnerIn	1.7	9.5	3.9	2.7	4.3	3.1	2.1	0.0	1.8	1.3	0.9	1.2	5.1	14.4	12.4	1.7	9.2	4.2	146
durch Eltern/Angehörige	2.1	2.5	2.2	1.4	0.0	1.0	6.4	15.8	8.0	53.5	53.5	53.5	7.6	5.7	6.1	16.2	10.7	14.4	504
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Taggeldversicherung	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	9
anderes	0.8	1.9	1.1	2.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	32
N**	1 327	524	1 851	74	23	97	94	19	113	535	114	649	79	299	378	2 359	1 140	3 499	3 499
fehlende Angaben	789	315	1 104	123	37	160	97	18	115	302	54	356	136	454	590	1 576	960	2 536	2 536
Hauptsächlichlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.4	31.7	49.7	41.5	21.7	36.4	63.8	46.7	61.1	20.0	10.2	18.4	70.4	40.6	46.6	47.0	32.9	42.5	1 304
Teilzeitarbeit	4.5	19.9	8.7	3.1	13.0	5.7	3.8	6.7	4.2	1.8	8.2	2.9	4.2	35.3	29.1	3.9	22.6	9.9	304
Gelegenheitsjobs	1.6	1.7	1.6	3.1	4.3	3.4	1.3	6.7	2.1	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	1.4	42.0
in Ausbildung	2.4	3.3	2.7	1.5	0.0	1.1	7.5	13.3	8.4	58.8	60.2	59.0	8.5	8.1	8.2	18.3	13.1	16.6	510
arbeitslos und aktive Stellensuche	8.1	7.8	8.0	10.8	17.4	12.5	11.3	0.0	9.5	5.7	7.1	6.0	1.4	1.8	1.7	7.2	5.1	6.5	199
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	4.5	6.1	5.0	13.8	17.4	14.8	7.5	6.7	7.4	1.8	2.0	1.9	0.0	0.7	0.6	4.0	3.9	3.9	121
Rentner/Rentnerin	10.1	12.8	10.8	1.5	0.0	1.1	2.5	0.0	2.1	0.2	0.0	0.2	7.0	9.9	9.3	6.5	9.3	7.4	227
Arbeitsunfähigkeit	5.6	6.1	5.7	16.9	8.7	14.8	2.5	13.3	4.2	4.3	2.0	3.9	1.4	0.7	0.8	5.2	4.7	5.0	154
Hausfrau/-mann	0.3	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	2.8	2.1	2.3	0.2	2.1	0.8	26.0
anderes	6.5	7.3	6.7	7.7	17.4	10.2	0.0	6.7	1.1	5.9	9.2	6.5	4.2	0.7	1.4	6.2	5.3	5.9	181
N**	1 149	423	1 572	65	23	88	80	15	95	490	98	588	71	283	354	2 083	985	3 068	3 068
fehlende Angaben	967	416	1 383	132	37	169	111	22	133	347	70	417	144	470	614	1 852	1 115	2 967	2 967

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	22.0	41.0	26.9	39.5	64.3	45.6	24.6	30.0	25.4	16.5	22.6	17.4	0.0	17.6	16.7	21.8	36.3	25.5	352
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	1.2	1.3	1.2	0.0	7.1	1.8	4.9	10.0	5.6	32.4	25.8	31.5	0.0	0.0	0.0	7.8	4.0	6.9	95
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	3.1	3.3	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	3.2	2.3	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	38
angelernete(r) ArbeiterIn	8.2	6.6	7.8	9.3	0.0	7.0	8.2	0.0	7.0	3.8	0.0	3.3	50.0	0.0	2.8	7.3	4.6	6.7	92
gelernte(r) ArbeiterIn	13.4	5.3	11.3	25.6	14.3	22.8	21.3	0.0	18.3	9.9	3.2	8.9	0.0	0.0	0.0	13.2	4.6	11.1	153
VorarbeiterIn	2.6	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	1.6	3.2	1.9	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	2.0	28
einfache(r) Angestellte(r)	20.2	20.7	20.3	11.6	7.1	10.5	19.7	10.0	18.3	5.5	0.0	4.7	50.0	35.3	36.1	16.2	18.4	16.8	232
mittlere Angestellte® / Kader	13.7	12.3	13.3	2.3	7.1	3.5	9.8	40.0	14.1	5.5	6.5	5.6	0.0	23.5	22.2	11.8	14.7	12.5	173
leitende/r Angestellte(r)/Kader	4.1	0.4	3.2	2.3	0.0	1.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.8	3.0	0.9	2.5	34
selbständig	8.8	7.5	8.5	4.7	0.0	3.5	3.3	0.0	2.8	2.2	3.2	2.3	0.0	5.9	5.6	6.5	6.6	6.5	90
SchülerIn/StudentIn	1.1	0.9	1.0	2.3	0.0	1.8	1.6	0.0	1.4	19.2	29.0	20.7	0.0	14.7	13.9	5.6	5.5	5.6	77
andere Stellung	1.5	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	10.0	2.8	1.1	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.4	19
N**	659	227	886	43	14	57	61	10	71	182	31	213	2	34	36	1 036	347	1 383	1 383
fehlende Angaben	1 457	612	2 069	154	46	200	130	27	157	655	137	792	213	719	932	2 899	1 753	4 652	4 652

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	53.1	50.2	52.3	27.9	30.0	28.4	36.8	36.1	36.7	66.0	64.9	65.8	62.8	65.4	64.8	55.0	57.3	55.8	3 359
planm. Beendigung mit Übertritt	6.2	8.0	6.7	10.7	10.0	10.5	4.7	2.8	4.4	3.6	4.2	3.7	4.7	2.1	2.7	5.5	5.6	5.5	331
Wohnortwechsel	2.1	2.6	2.2	8.1	10.0	8.6	5.3	5.6	5.3	1.8	2.4	1.9	0.5	0.7	0.6	2.3	2.0	2.2	133
Hospitalisierung	0.6	1.3	0.8	0.5	1.7	0.8	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.6	0.7	0.6	36
Inhaftierung	0.1	0.1	0.1	1.5	0.0	1.2	1.1	2.8	1.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	13
Kontaktverlust	24.5	23.2	24.1	32.0	31.7	31.9	35.8	41.7	36.7	20.8	19.6	20.6	24.2	21.8	22.4	24.7	22.4	23.9	1 437
expliziter Abbruch	9.7	10.9	10.1	12.7	11.7	12.5	12.6	5.6	11.5	5.9	6.0	5.9	4.7	7.9	7.1	8.6	9.1	8.8	528
Tod	1.8	1.7	1.7	5.1	3.3	4.7	0.5	5.6	1.3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	1.3	0.9	1.2	70
anderer Grund	1.9	2.0	1.9	1.5	1.7	1.6	2.6	0.0	2.2	1.1	3.0	1.4	2.8	2.0	2.2	1.8	2.0	1.8	110
N**	2 108	837	2 945	197	60	257	190	36	226	836	168	1 004	215	751	966	3 922	2 095	6 017	6 017
fehlende Angaben	8	2	10	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	2	13	5	18	18

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stationäre Therapie	33.3	25.0	30.4	25.0	0.0	19.0	57.1	0.0	57.1	25.0	50.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.1	23.7	27.9	61
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	2.3	0.0	1.5	0.0	20.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.4	3
ambulante Behandlung	50.6	50.0	50.4	62.5	80.0	66.7	28.6	0.0	28.6	50.0	33.3	46.2	50.0	55.6	53.3	51.7	52.6	52.1	114
Aussenwohngruppe	2.3	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	1.8	4
andere Stelle/Institution	11.5	22.9	15.6	12.5	0.0	9.5	14.3	0.0	14.3	20.0	16.7	19.2	50.0	44.4	46.7	14.7	21.1	16.9	37
N**	87	48	135	16	5	21	7	0	7	20	6	26	6	9	15	143	76	219	219
fehlende Angaben	44	19	63	5	1	6	2	1	3	10	1	11	4	7	11	71	41	112	112

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

Todesursache****	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	3.8	12.5	5.9	16.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.0	6.8	3
Unfall	3.8	12.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.5	2
Krankheit	73.1	50.0	67.6	50.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	67.6	40.0	61.4	27
Überdosis bzw. Vergiftung	19.2	12.5	17.6	33.3	0.0	28.6	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	20.0	22.7	10
andere Todesursache	0.0	12.5	2.9	0.0	100.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.5	2
N**	26	8	34	6	1	7	1	1	2	0	0	0	1	0	1	34	10	44	44
fehlende Angaben	11	6	17	4	1	5	0	1	1	1	0	1	0	0	0	17	9	26	26

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2016)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	6.4	5.6	6.2	3.6	3.3	3.5	3.7	0.0	3.1	2.6	4.2	2.9	12.1	9.3	9.9	5.3	6.5	5.8	345
> 1 Woche bis 1 Monat	3.9	3.5	3.8	2.0	0.0	1.6	4.7	0.0	4.0	10.8	11.9	10.9	7.4	4.1	4.9	5.5	4.4	5.1	307
> 1 Monat bis 2 Monate	4.4	4.4	4.4	3.0	3.3	3.1	5.3	0.0	4.4	10.9	8.9	10.5	3.3	4.5	4.2	6.0	4.7	5.6	333
> 2 bis 3 Monate	4.2	3.8	4.1	3.6	5.0	3.9	4.2	5.4	4.4	5.7	10.1	6.5	4.2	4.7	4.6	4.6	5.0	4.7	282
> 3 bis 6 Monate	11.6	11.2	11.5	9.1	6.7	8.6	14.7	27.0	16.7	18.3	14.9	17.7	19.1	15.7	16.4	13.9	13.6	13.8	826
> 6 Monate bis 1 Jahr	24.9	27.4	25.6	20.8	18.3	20.2	31.1	32.4	31.3	33.3	29.8	32.7	31.2	33.2	32.8	27.9	30.0	28.6	1 712
> 1 Jahr bis 2 Jahre	20.9	21.8	21.1	18.8	20.0	19.1	20.5	27.0	21.6	13.1	14.3	13.3	15.3	17.7	17.2	18.6	19.5	18.9	1 132
> 2 bis 3 Jahre	9.1	6.2	8.3	9.6	11.7	10.1	6.3	5.4	6.2	3.1	4.2	3.3	4.2	3.9	3.9	7.1	5.3	6.4	386
> 3 bis 5 Jahre	8.4	9.6	8.7	11.2	15.0	12.1	6.8	0.0	5.7	1.7	1.2	1.6	2.8	3.6	3.4	6.3	6.6	6.4	384
> 5 bis 10 Jahre	5.2	5.4	5.3	13.2	15.0	13.6	2.6	2.7	2.6	0.4	0.6	0.4	0.5	3.2	2.6	3.9	3.9	3.9	234
mehr als 10 Jahre	1.0	1.1	1.0	5.1	1.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	44
N**	2 077	836	2 913	197	60	257	190	37	227	837	168	1 005	215	752	967	3 893	2 092	5 985	5 985
fehlende Angaben	39	3	42	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	42	8	50	50
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	80.9	80.0	80.7	144.2	135.1	142.0	60.1	53.2	59.0	34.9	35.8	35.1	38.3	53.3	49.9	68.4	65.0	67.2	
Standardabweichung	108.7	103.5	107.2	181.6	140.9	172.8	70.0	53.7	67.6	47.0	42.1	46.2	44.8	75.6	70.2	100.1	88.4	96.2	
1. Quartil	18.0	19.4	18.9	29.4	33.6	30.1	16.9	20.0	18.0	8.1	8.5	8.1	11.0	13.9	13.0	14.9	15.9	15.1	
Medianwert	45.0	46.0	45.1	65.6	84.8	67.3	35.4	36.7	35.6	25.6	24.2	25.3	28.3	31.6	30.7	36.3	36.0	36.3	
3. Quartil	98.7	91.6	96.6	193.0	183.9	190.4	78.1	64.6	77.7	43.8	44.7	44.1	46.0	57.4	56.1	76.9	73.1	75.1	
N**	2 077	836	2 913	197	60	257	190	37	227	837	168	1 005	215	752	967	3 893	2 092	5 985	
fehlende Angaben	39	3	42	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	42	8	50	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	99.1	99.3	99.1	75.3	72.0	74.5	93.7	89.5	93.0	99.8	100.0	99.9	98.2	98.5	98.3	3 213
ja	0.9	0.7	0.9	24.7	28.0	25.5	6.3	10.5	7.0	0.2	0.0	0.1	1.8	1.5	1.7	55
N**	1 397	560	1 957	81	25	106	95	19	114	552	115	667	2 379	889	3 268	3 268
fehlende Angaben	719	279	998	116	35	151	96	18	114	285	53	338	1 341	458	1 799	1 799
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	25.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.0	1
Methadon	92.3	75.0	88.2	88.2	100.0	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	92.1	92.3	92.2	47
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	1
andere Substanzen	7.7	0.0	5.9	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.9	2
N**	13	4	17	17	7	24	5	2	7	1	0	1	38	13	51	51
fehlende Angaben	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4	4
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.4	99.6	99.5	78.1	77.3	77.9	96.3	92.9	95.7	99.8	100.0	99.8	98.7	99.0	98.8	2 905
ja	0.6	0.4	0.5	21.9	22.7	22.1	3.8	7.1	4.3	0.2	0.0	0.2	1.3	1.0	1.2	36
N**	1 249	505	1 754	73	22	95	80	14	94	496	101	597	2 135	806	2 941	2 941
fehlende Angaben	867	334	1 201	124	38	162	111	23	134	341	67	408	1 585	541	2 126	2 126
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	14.3	0.0	11.1	6.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	10.7	0.0	8.3	3
Substitution	85.7	100.0	88.9	93.8	100.0	95.2	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	89.3	100.0	91.7	33
N**	7	2	9	16	5	21	3	1	4	1	0	1	28	8	36	36
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	93.3	83.2	90.8	90.6	80.0	88.6	92.5	91.7	92.4	94.4	97.3	94.8	93.3	85.6	91.5	1 570
ja	6.7	16.8	9.2	9.4	20.0	11.4	7.5	8.3	7.6	5.6	2.7	5.2	6.7	14.4	8.5	145
N**	879	291	1 170	64	15	79	67	12	79	215	37	252	1 319	396	1 715	1 715
fehlende Angaben	1 237	548	1 785	133	45	178	124	25	149	622	131	753	2 401	951	3 352	3 352
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	1.3	0.0	0.8	1
institutionseigene Nachsorgestelle	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.8	1
fremde Aussenwohngruppe	3.9	4.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.9	3.1	4
fremde Nachsorgestelle	19.6	13.3	16.7	20.0	0.0	14.3	25.0	0.0	20.0	20.0	0.0	18.2	19.7	11.8	16.5	21
Alkoholberatungsstelle	27.5	15.6	21.9	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	23.7	15.7	20.5	26
Drogenberatungsstelle	2.0	4.4	3.1	40.0	0.0	28.6	75.0	0.0	60.0	20.0	100.0	27.3	10.5	5.9	8.7	11
andere Beratungsstelle	7.8	17.8	12.5	20.0	0.0	14.3	25.0	0.0	20.0	10.0	0.0	9.1	9.2	15.7	11.8	15
Selbsthilfegruppe	11.8	8.9	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	11.8	7.8	10.2	13
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.8	1
andere	31.4	42.2	36.5	20.0	100.0	42.9	0.0	100.0	20.0	20.0	0.0	18.2	26.3	45.1	33.9	43
N**	51	45	96	5	2	7	4	1	5	10	1	11	76	51	127	127
fehlende Angaben	8	4	12	1	1	2	1	0	1	2	0	2	12	6	18	18

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Suchtprobleme bei Austritt*																
Alkohol	74.0	74.7	74.2	22.2	17.1	21.0	20.0	4.3	17.7	9.4	12.4	9.9	46.2	50.1	47.3	1 750
Heroin	0.6	0.5	0.6	62.2	48.8	59.1	3.0	13.0	4.4	0.3	0.0	0.3	3.8	2.6	3.5	129
Methadon	0.1	0.0	0.0	9.6	7.3	9.1	0.7	4.3	1.3	0.2	0.0	0.1	0.6	0.4	0.6	21
Buprenorphin	0.1	0.0	0.0	3.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.1	0.5	0.2	3.0	7.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	13
Kokain-Pulver	2.1	1.4	1.9	16.3	7.3	14.2	68.1	65.2	67.7	2.1	3.1	2.3	6.2	3.1	5.3	197
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
Amphetamine	0.8	0.3	0.6	1.5	0.0	1.1	2.2	0.0	1.9	1.2	0.8	1.1	1.2	0.7	1.1	40
Metamphetamine	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.7	4.3	1.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	6
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.2	0.2	2.2	0.0	1.7	2.2	0.0	1.9	1.4	1.6	1.4	0.9	0.6	0.8	30
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	3
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Barbiturate	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2
Benzodiazepine	0.5	1.4	0.8	10.4	0.0	8.0	2.2	4.3	2.5	0.5	0.0	0.4	1.3	2.3	1.6	59
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
LSD	0.2	0.0	0.1	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	12
Ketamin	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	4.7	3.3	4.3	14.8	14.6	14.8	12.6	13.0	12.7	65.9	62.0	65.3	21.3	11.4	18.6	687
Tabak	10.2	9.7	10.1	8.9	7.3	8.5	8.1	4.3	7.6	12.8	19.4	13.9	11.7	12.6	12.0	443
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	8
Glücksspielsucht	0.2	0.0	0.1	0.0	2.4	0.6	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	2.0	1.1	1.8	65
Computer-bzw. Internetsucht	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	1.8	0.4	1.4	52
Essstörungen	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.2	1.8	65
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	44
keine	23.5	22.7	23.3	16.3	12.2	15.3	23.0	17.4	22.2	28.8	31.0	29.1	24.8	23.6	24.4	904
N**	1 459	629	2 088	135	41	176	135	23	158	657	129	786	2 678	1 022	3 700	3 700
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	60.2	48.4	57.2	50.0	50.0	50.0	50.0	42.9	49.1	75.2	56.3	73.0	61.4	48.5	58.5	612
einmal	7.8	11.0	8.6	5.6	0.0	4.5	12.5	0.0	10.9	7.2	0.0	6.4	7.9	10.2	8.4	88
zweimal	8.3	8.2	8.3	11.1	25.0	13.6	6.3	0.0	5.5	4.0	12.5	5.0	7.9	8.9	8.1	85
drei- oder viermal	7.0	13.7	8.7	8.3	0.0	6.8	16.7	0.0	14.5	2.4	12.5	3.5	6.9	12.3	8.1	85
fünfmal oder mehr	16.7	18.7	17.2	25.0	25.0	25.0	14.6	57.1	20.0	11.2	18.8	12.1	15.9	20.0	16.8	176
N**	540	182	722	36	8	44	48	7	55	125	16	141	811	235	1 046	1 046
fehlende Angaben	1 576	657	2 233	161	52	213	143	30	173	712	152	864	2 909	1 112	4 021	4 021
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	99.0	98.9	99.0	13.3	0.0	11.1	26.3	0.0	22.7	19.2	16.7	18.8	78.3	86.0	80.4	308
Opiode	1.5	2.3	1.7	86.7	100.0	88.9	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	6.5	4.7	6.0	23
Kokain oder Derivate	5.5	3.4	4.9	13.3	33.3	16.7	78.9	100.0	81.8	7.7	16.7	9.4	11.2	7.5	10.2	39
andere Stimulanzien	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	3.8	0.0	3.1	2.5	0.9	2.1	8
Hypnotika/Sedativa	1.0	3.4	1.7	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	2.6	10
Halluzinogene	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	2
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1
Cannabis	10.0	2.3	7.7	20.0	0.0	16.7	15.8	0.0	13.6	96.2	83.3	93.8	19.6	6.5	15.9	61
Tabak	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	3
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	1.3	5
Essstörungen	0.0	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.8	3
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	200	87	287	15	3	18	19	3	22	26	6	32	276	107	383	383
fehlende Angaben	15	7	22	3	1	4	5	1	6	5	1	6	37	14	51	51

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	37.8	41.7	38.8	17.2	10.0	15.4	20.0	16.7	19.5	15.7	9.5	14.8	32.2	38.1	33.6	317
1 Tag pro Woche oder weniger	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.5	1.0	0.0	0.7	7
2 bis 3 Tage pro Woche	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	0.8	4.8	1.4	0.7	1.3	0.8	8
4 bis 6 Tage pro Woche	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.7	0.4	0.6	6
einmal täglich	4.9	2.5	4.3	6.9	10.0	7.7	11.4	16.7	12.2	9.1	0.0	7.7	6.0	4.0	5.5	52
mehrmals täglich	55.8	54.0	55.3	75.9	80.0	76.9	65.7	66.7	65.9	69.4	85.7	71.8	59.5	56.2	58.7	554
N**	468	163	631	29	10	39	35	6	41	121	21	142	718	226	944	944
fehlende Angaben	1 648	676	2 324	168	50	218	156	31	187	716	147	863	3 002	1 121	4 123	4 123
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	17.5	16.5	17.2	5.0	0.0	3.4	28.0	40.0	30.0	33.0	26.7	32.0	22.0	17.6	21.0	114
11-20 Zigaretten pro Tag	45.2	50.6	46.5	50.0	55.6	51.7	56.0	40.0	53.3	54.5	53.3	54.4	47.0	49.6	47.6	258
21-30 Zigaretten pro Tag	21.8	22.8	22.1	45.0	44.4	44.8	12.0	20.0	13.3	9.1	13.3	9.7	20.1	24.4	21.0	114
31 und mehr Zigaretten pro Tag	15.5	10.1	14.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	3.4	6.7	3.9	10.9	8.4	10.3	56
N**	252	79	331	20	9	29	25	5	30	88	15	103	423	119	542	542
fehlende Angaben	39	16	55	4	0	4	3	0	3	14	4	18	64	21	85	85

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	27.1	42.4	31.0	82.9	83.3	82.9	64.7	100.0	68.4	46.6	52.4	47.3	35.2	45.0	37.4	434
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.1	14.1	16.4	2.9	0.0	2.4	2.0	0.0	1.8	6.2	0.0	5.4	13.3	11.1	12.8	148
kontrollierter Konsum	39.1	32.2	37.3	11.4	0.0	9.8	17.6	0.0	15.8	29.5	28.6	29.3	35.3	31.7	34.5	400
keine Beschränkung beabsichtigt	4.7	1.5	3.8	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.3	7.5	14.3	8.4	5.1	2.3	4.5	52
bis jetzt nicht festgelegt	11.6	8.8	10.9	2.9	16.7	4.9	9.8	0.0	8.8	10.3	4.8	9.6	10.5	8.4	10.0	116
andere	0.3	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	9
N**	601	205	806	35	6	41	51	6	57	146	21	167	897	262	1 159	1 159
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 515</i>	<i>634</i>	<i>2 149</i>	<i>162</i>	<i>54</i>	<i>216</i>	<i>140</i>	<i>31</i>	<i>171</i>	<i>691</i>	<i>147</i>	<i>838</i>	<i>2 823</i>	<i>1 085</i>	<i>3 908</i>	<i>3 908</i>
Prognose*																
sehr gute Prognose	17.1	15.5	16.7	14.3	16.7	14.9	14.3	14.3	14.3	26.2	31.8	26.9	18.8	17.1	18.4	218
gute Prognose	48.3	48.8	48.4	48.6	25.0	42.6	51.0	71.4	53.6	51.0	45.5	50.3	49.4	48.0	49.1	581
eher ungünstige Prognose	22.8	27.1	23.8	25.7	50.0	31.9	26.5	14.3	25.0	21.4	22.7	21.6	22.5	27.5	23.6	280
ungünstige Prognose	11.8	8.7	11.0	11.4	8.3	10.6	8.2	0.0	7.1	1.4	0.0	1.2	9.3	7.4	8.9	105
N**	619	207	826	35	12	47	49	7	56	145	22	167	915	269	1 184	1 184
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 497</i>	<i>632</i>	<i>2 129</i>	<i>162</i>	<i>48</i>	<i>210</i>	<i>142</i>	<i>30</i>	<i>172</i>	<i>692</i>	<i>146</i>	<i>838</i>	<i>2 805</i>	<i>1 078</i>	<i>3 883</i>	<i>3 883</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2016)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Eintritte***			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																
Männer	64.9			77.6			79.0			81.5			71.0			1489
Frauen	35.1			22.4			21.0			18.5			29.0			608
N**	707	383	1 090	83	24	107	139	37	176	308	70	378	1 489	608	2 097	2 097
<i>fehlende Angaben</i>			2			1			0			0			9	9
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.1	0.3	0.2	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.6	0.2	0.5	10
15-19	1.0	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	11.4	3.4	34.2	47.8	36.7	8.8	9.7	9.0	188
20-24	2.6	2.6	2.7	7.2	0.0	5.6	14.4	11.4	13.8	22.5	15.9	21.3	10.2	6.0	9.1	189
25-29	7.6	7.3	7.5	9.6	8.3	9.3	15.1	25.7	17.2	16.0	7.2	14.4	11.4	8.8	10.6	221
30-34	12.3	7.3	10.5	19.3	8.3	16.7	22.3	20.0	21.8	9.1	11.6	9.6	14.0	9.8	12.8	267
35-39	13.4	11.8	12.9	18.1	25.0	19.4	21.6	8.6	19.0	9.4	7.2	9.0	13.7	11.3	13.0	271
40-44	11.4	13.6	12.2	19.3	12.5	18.5	12.2	8.6	11.5	3.3	2.9	3.2	10.0	11.8	10.5	219
45-49	14.7	15.0	14.8	12.0	16.7	13.0	7.2	14.3	8.6	2.0	4.3	2.4	10.0	12.7	10.7	224
50-54	13.9	16.3	14.7	9.6	16.7	11.1	2.9	0.0	2.3	1.6	1.4	1.6	8.7	12.2	9.7	202
55-59	9.7	11.5	10.3	2.4	12.5	4.6	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	5.6	8.2	6.3	132
60-64	6.3	6.0	6.2	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.3	4.3	3.5	74
65-69	3.4	3.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	2.1	43
70-74	2.6	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	1.3	28
75 und mehr	1.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0.3	1.4	0.5	0.7	0.8	0.8	17
N**	700	381	1 083	83	24	108	139	35	174	307	69	376	1 476	600	2 085	2 085
<i>fehlende Angaben</i>	7	2	9	0	0	0	0	2	2	1	1	2	13	8	21	21
Alter																
Mittelwert	45.5	46.2	45.7	38.7	43.0	39.7	35.6	32.3	35.0	25.7	25.8	25.7	38.3	41.4	39.2	
Standardabweichung	12.9	12.5	12.8	9.5	9.4	9.6	12.9	9.9	12.4	10.2	14.7	11.1	14.3	14.7	14.5	
1. Quartil	35.4	37.9	36.3	32.6	35.6	33.5	28.2	25.6	27.9	18.3	17.1	18.0	27.2	30.3	27.9	
Medianwert	45.5	47.2	46.0	39.0	42.3	39.8	33.6	30.5	32.9	23.5	20.5	22.5	36.7	41.8	38.0	
3. Quartil	54.3	54.3	54.3	45.5	50.4	46.8	40.03	39.6	40.0	31.4	31.2	31.3	48.0	51.6	49.3	
N**	700	381	1 083	83	24	108	139	35	174	307	69	376	1 476	600	2 085	
<i>fehlende Angaben</i>	7	2	9	0	0	0	0	2	2	1	1	2	13	8	21	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2016)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	48.5	65.0	53.2	1 092
Opioide	5.7	4.1	5.3	108
Kokain	9.5	6.3	8.6	176
Stimulantien	2.0	1.9	2.0	40
Hypnotika/Sedativa	0.5	1.4	0.7	15
Halluzinogene	0.0	0.2	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	21.1	11.9	18.4	378
Tabak	0.6	0.5	0.6	12
andere Substanz	1.3	2.4	1.6	33
Mischkonsum**	6.3	3.6	5.5	113
suchtähnliche Verhaltensweisen	4.5	2.9	4.0	83
N***	1 459	589	2 051	2 051
<i>fehlende Angaben</i>	<i>30</i>	<i>19</i>	<i>55</i>	<i>55</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein