

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2006

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@sfa-isp.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Schweizerische Fachstelle
für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)

Vertrieb: Buchhandlung, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
E-Mail librairie@sfa-isp.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: SFA

Copyright: © SFA-ISPA Lausanne 2008

Zitierhinweis: Astudillo, M. & Maffli, E. (2008). Ambulante Suchthilfe -
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2006. Lausanne:
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

EINTRITT

- T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2006)
- T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2006)
- T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2006)
- T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer
- T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer

T15.2a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Frauen
T15.2b	Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Frauen
T15.3a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer und Frauen
T15.3b	Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer und Frauen
T16.1a	Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Männer
T16.1b	Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Frauen
T16.1c	Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Männer und Frauen
T16.2a	Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006), Männer
T16.2b	Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006), Frauen
T16.2c	Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006), Männer und Frauen
T17	Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2006)
T18	Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
T19.1a	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer
T19.1b	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Frauen
T19.1c	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer und Frauen
T19.2a	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Männer
T19.2b	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Frauen
T19.2c	Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Männer und Frauen
T20	Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
T21	Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
T22a	Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer
T22b	Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Frauen

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer und Frauen

AUSTRITT

- T23 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T24 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T25 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T26 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T27 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T28a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T28b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T28c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T29 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)
- T30 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2006)
- T31 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T32 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T33 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T34 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)
- T35 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2006)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und ersetzen damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden. Nur einzelne Stellen verwendeten 2006 noch die alten Instrumente zur Datenerhebung. Das Monitoring wird in diesem Sektor von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) realisiert.

act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die beim Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die beim Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2006 beteiligten sich 68 der 223 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden *act-info*-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche ebenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			71.6			77.4			75.8			81.4			26.7			64.7	4'009
Frauen			28.4			22.6			24.2			18.6			73.1			35.2	2'183
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.2			0.0	2
N**	2'301	913	3'214	485	142	627	232	74	306	490	112	602	288	787	1'077	4'009	2'183	6'194	6'194
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.5	4.4	4.0	0.9	1.7	0.9	1.0	1.0	58
15-19	1.8	1.5	1.8	3.1	12.9	5.3	7.0	23.3	10.9	53.2	56.4	53.8	16.8	4.5	7.7	10.1	7.8	9.3	564
20-24	4.4	2.4	3.9	14.7	22.1	16.4	22.2	30.1	24.1	20.1	20.0	20.1	9.1	5.5	6.5	9.3	7.7	8.7	532
25-29	6.2	4.6	5.8	18.7	11.4	17.0	20.9	19.2	20.5	9.7	5.5	8.9	5.1	5.5	5.4	9.1	6.6	8.2	501
30-34	10.0	9.0	9.7	22.4	15.0	20.7	18.3	4.1	14.9	5.5	5.5	5.5	4.0	10.4	8.7	11.3	9.4	10.7	651
35-39	12.7	9.5	11.8	23.3	22.1	23.0	17.0	17.8	17.2	4.3	1.8	3.9	8.4	12.5	11.4	13.2	11.4	12.6	766
40-44	16.9	16.8	16.9	10.7	12.9	11.2	10.0	4.1	8.6	1.6	4.5	2.2	10.9	13.4	12.8	13.3	13.6	13.4	818
45-49	14.8	18.7	15.9	5.2	2.9	4.7	3.5	1.4	3.0	0.8	0.0	0.7	14.2	17.1	16.3	10.9	14.8	12.2	746
50-54	13.4	15.4	13.9	1.5	0.7	1.3	1.3	0.0	1.0	0.6	0.9	0.7	8.0	10.8	10.0	8.9	10.8	9.6	583
55-59	9.6	9.5	9.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.1	7.1	5.9	7.3	6.4	392
60-64	5.9	6.9	6.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.3	5.0	3.9	5.0	4.3	261
65-69	2.4	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.3	3.5	1.7	3.0	2.1	131
70-74	1.3	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	2.2	1.0	1.0	1.0	61
75 und mehr	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.9	1.5	0.5	0.6	0.5	33
N**	2'281	905	3'186	477	140	617	230	73	303	487	110	597	274	761	1'036	3'956	2'140	6'097	6'097
fehlende Angaben	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	97
Alter																			
Mittelwert	44.3	48.3	45.5	33.0	30.9	32.5	30.7	26.5	29.7	21.6	20.9	21.4	39.7	43.3	42.4	38.6	42.2	39.9	
Standardabweichung	12.1	66.2	36.8	7.8	8.8	8.1	8.0	8.2	8.3	7.2	7.4	7.2	18.1	13.7	15.0	14.0	44.8	28.9	
1. Quartil	36.2	38.9	36.7	27.0	22.4	26.0	24.2	20.7	23.2	16.8	16.4	16.8	22.3	34.0	32.2	27.7	31.0	28.6	
Medianwert	44.2	46.2	45.0	33.2	31.3	32.9	29.8	24.6	28.3	18.1	17.7	18.0	41.4	43.7	43.2	38.5	42.2	39.8	
3. Quartil	52.6	53.9	53.0	38.0	38.2	38.0	36.13	32.8	36.0	24.0	23.0	23.9	51.8	52.0	51.9	48.2	51.1	49.5	
N**	2'281	905	3'186	477	140	617	230	73	303	487	110	597	274	761	1'036	3'956	2'140	6'097	
fehlende Angaben	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	37.7	28.8	35.1	74.0	70.5	73.2	73.1	77.8	74.2	92.6	93.1	92.7	45.5	23.2	28.9	52.4	36.2	46.6	2'669
verheiratet	34.6	31.0	33.6	14.1	9.1	13.0	16.3	9.7	14.7	5.1	4.0	4.9	43.2	58.1	54.2	27.7	37.2	31.1	1'779
getrennt	5.8	6.0	5.9	2.4	3.0	2.5	3.5	2.8	3.3	0.9	1.0	0.9	4.9	4.4	4.6	4.5	4.8	4.6	265
geschieden	19.5	28.8	22.2	8.0	13.6	9.3	6.2	9.7	7.0	1.2	2.0	1.3	6.1	11.7	10.2	13.7	18.2	15.3	876
verwitwet	2.2	5.3	3.1	0.4	1.5	0.7	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	1.5	1.4	3.0	2.0	114
reg. Partnerschaft	0.1	0.1	0.1	1.1	2.3	1.3	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	22
N**	2'108	845	2'953	462	132	594	227	72	299	433	101	534	264	754	1'020	3'685	2'038	5'725	5'725
fehlende Angaben	193	68	261	23	10	33	5	2	7	57	11	68	24	33	57	324	145	469	469
Staatsangehörigkeit*																			
CH	79.2	88.9	82.0	65.9	85.8	70.5	73.5	74.2	73.7	89.1	84.5	88.2	78.7	81.8	80.8	77.9	84.8	80.3	4'597
EU	12.7	8.3	11.4	19.5	9.7	17.2	16.0	18.2	16.5	4.6	6.8	5.0	10.3	9.8	9.9	12.6	9.3	11.4	655
andere	8.0	2.8	6.5	14.6	4.5	12.3	10.5	7.6	9.8	6.3	8.7	6.8	11.0	8.4	9.2	9.5	5.9	8.2	470
N**	2'079	856	2'935	452	134	586	219	66	285	457	103	560	263	753	1'018	3'666	2'054	5'722	5'722
fehlende Angaben	222	57	279	33	8	41	13	8	21	33	9	42	25	34	59	343	129	472	472

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	10.4	12.6	11.0	0.3	0.8	0.4	1.1	1.6	1.2	0.2	0.0	0.2	9.2	12.1	11.4	6.8	9.9	7.9	424
Umland der Grossstadtzentren	10.4	14.9	11.7	1.0	2.4	1.4	2.2	1.6	2.0	2.8	2.1	2.7	12.9	11.8	12.1	7.8	11.1	8.9	479
Mittelzentren	17.2	19.0	17.7	27.8	32.0	28.8	29.6	29.0	29.4	23.9	39.4	26.7	12.0	18.8	17.0	20.0	21.7	20.6	1'103
Kleinzentren	33.1	27.6	31.6	43.6	43.2	43.5	33.9	37.1	34.7	32.2	28.7	31.5	34.9	29.3	30.8	35.0	30.1	33.2	1'778
rural	28.9	25.9	28.0	27.3	21.6	25.9	33.3	30.6	32.7	40.9	29.8	38.9	30.9	28.0	28.8	30.4	27.2	29.3	1'568
N**	2'007	807	2'814	392	125	517	186	62	248	423	94	517	249	693	942	3'443	1'909	5'352	5'352
fehlende Angaben	294	106	400	93	17	110	46	12	58	67	18	85	39	94	135	566	274	842	842
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	39.9	34.2	38.3	36.0	29.6	34.6	31.9	26.7	30.7	15.9	15.9	15.9	14.0	9.8	10.9	33.6	23.4	30.0	1'388
mit Eltern/Elternteil	7.7	3.7	6.6	15.2	15.7	15.3	22.4	23.3	22.6	58.6	51.1	57.2	23.1	6.1	10.1	17.8	9.9	15.0	694
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.9	13.7	5.3	1.5	9.6	3.3	0.5	3.3	1.1	0.5	6.8	1.7	2.7	11.8	9.6	1.6	11.7	5.2	239
mit PartnerIn (ohne Kinder)	22.5	26.6	23.7	13.7	18.3	14.7	15.2	18.3	15.9	7.6	8.0	7.6	19.4	25.5	23.9	18.3	23.8	20.2	936
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.6	13.9	18.0	11.0	7.8	10.3	11.9	5.0	10.4	3.9	3.4	3.8	36.0	44.5	42.5	17.1	23.6	19.4	899
mit anderen Verw./Angeh.	1.2	1.1	1.1	2.5	6.1	3.3	7.6	6.7	7.4	4.7	1.1	4.0	0.0	0.5	0.4	2.3	1.4	2.0	91
mit FreundInnen (WG)	1.9	2.0	1.9	5.9	3.5	5.4	5.7	6.7	5.9	1.8	2.3	1.9	2.2	1.0	1.3	2.7	2.0	2.5	115
anderes	5.3	4.9	5.2	14.2	9.6	13.2	4.8	10.0	5.9	7.0	11.4	7.8	2.7	0.8	1.3	6.5	4.1	5.7	262
N**	1'642	657	2'299	408	115	523	210	60	270	384	88	472	186	593	781	2'992	1'630	4'624	4'624
fehlende Angaben	659	256	915	77	27	104	22	14	36	106	24	130	102	194	296	1'017	553	1'570	1'570
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	94.4	93.7	94.2	83.3	80.5	82.6	90.0	78.1	87.2	93.6	87.1	92.4	94.8	97.6	96.9	92.6	93.2	92.8	4'388
instabile Wohnsituation	3.5	3.9	3.6	9.6	12.7	10.3	7.2	12.5	8.4	3.5	7.1	4.1	4.7	2.1	2.7	4.6	4.6	4.6	218
Institution	2.0	2.4	2.1	7.1	6.8	7.1	2.9	9.4	4.4	2.9	5.9	3.5	0.5	0.3	0.4	2.8	2.2	2.6	123
N**	1'722	664	2'386	406	118	524	209	64	273	374	85	459	191	614	807	3'062	1'665	4'729	4'729
fehlende Angaben	579	249	828	79	24	103	23	10	33	116	27	143	97	173	270	947	518	1465	1'465

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	31.1	33.6	31.9	42.0	25.2	38.0	37.8	43.6	39.1	62.8	48.5	59.9	19.6	12.4	13.9	35.9	26.4	32.4	1'248
zeitweilige Beziehung(en)	4.7	6.0	5.1	9.6	11.2	10.0	9.4	12.7	10.2	7.5	7.6	7.5	4.3	1.9	2.4	6.0	5.2	5.7	221
festе Beziehung, getrennt lebend	13.1	13.6	13.2	19.2	27.1	21.1	19.4	14.5	18.3	11.7	22.7	13.9	8.7	10.9	10.4	14.0	14.3	14.1	545
festе Beziehung, zusammen leb.	51.1	46.7	49.8	29.1	36.4	30.9	33.3	29.1	32.3	18.0	21.2	18.7	67.4	74.8	73.3	44.1	54.0	47.8	1'843
N**	1'385	580	1'965	333	107	440	180	55	235	266	66	332	138	531	670	2'425	1'431	3'857	3'857
fehlende Angaben	916	333	1'249	152	35	187	52	19	71	224	46	270	150	256	407	1'584	752	2'337	2'337
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	43.2	34.6	40.7	71.9	60.3	69.2	71.9	73.3	72.2	90.1	82.7	88.7	43.7	26.9	30.6	55.1	39.1	49.3	2'249
1 Kind	19.3	22.7	20.3	15.1	25.0	17.4	16.6	16.7	16.6	6.3	12.3	7.5	13.8	17.0	16.5	16.7	19.5	17.8	811
2 Kinder	25.1	28.4	26.1	10.0	9.5	9.9	8.5	10.0	8.9	3.0	1.2	2.7	23.6	36.4	33.4	18.9	27.3	22.0	1'002
3 Kinder oder mehr	12.4	14.2	12.9	3.1	5.2	3.6	3.0	0.0	2.3	0.6	3.7	1.2	19.0	19.7	19.5	9.3	14.0	11.0	501
N**	1'659	682	2'341	391	116	507	199	60	259	334	81	415	174	594	770	2'915	1'646	4'563	4'563
fehlende Angaben	642	231	873	94	26	120	33	14	47	156	31	187	114	193	307	1'094	537	1'631	1'631
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	73.6	65.1	71.1	82.6	69.8	79.4	79.6	81.6	80.1	71.7	63.5	70.2	51.6	44.6	46.2	73.3	58.7	68.0	2'742
1 Kind	11.3	18.8	13.6	9.2	19.8	11.8	11.4	10.2	11.1	7.2	14.3	8.4	18.3	20.2	19.7	11.3	18.6	14.0	563
2 Kinder	10.5	11.9	10.9	5.5	6.6	5.8	6.0	6.1	6.0	14.0	14.3	14.0	21.6	26.2	25.1	10.6	16.7	12.8	518
3 Kinder oder mehr	4.6	4.1	4.4	2.8	3.8	3.0	3.0	2.0	2.8	7.2	7.9	7.3	8.5	9.0	8.9	4.8	6.0	5.3	212
N**	1'482	637	2'119	327	106	433	167	49	216	293	63	356	153	531	684	2'554	1'481	4'035	4'035
fehlende Angaben	819	276	1'095	158	36	194	65	25	90	197	49	246	135	256	393	1'455	702	2'159	2'159

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	3.8	3.8	3.8	6.4	5.8	6.3	6.3	7.9	6.7	9.6	15.7	10.7	5.2	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	235
obligatorische Schule	15.5	20.5	16.9	33.9	38.3	34.9	22.2	38.1	25.9	50.4	51.8	50.7	24.7	15.5	18.2	24.5	23.4	24.2	1'015
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	4.0	5.6	4.4	6.4	10.0	7.2	4.8	12.7	6.7	4.9	10.8	6.0	5.2	4.1	4.4	4.9	6.4	5.4	227
Berufslehre, Berufsschule	59.0	53.2	57.4	48.4	41.7	46.9	57.0	36.5	52.2	30.1	12.0	26.8	42.0	55.8	51.9	51.5	48.8	50.6	2'123
Maturität, Diplommittelschule	2.9	5.0	3.5	2.2	4.2	2.7	1.4	4.8	2.2	2.7	8.4	3.8	4.0	5.6	5.1	2.8	5.3	3.6	152
Lehrerseminar	1.1	1.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.1	4.9	3.9	0.7	2.8	1.4	59
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.8	5.6	6.4	1.2	0.0	0.9	3.4	0.0	2.6	1.9	0.0	1.6	5.7	3.2	3.9	4.8	3.7	4.4	186
höhere Fachschule	1.3	1.4	1.4	0.7	0.0	0.6	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	1.7	1.2	1.0	1.1	47
Fachhochschule	1.0	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	33
Universität, Hochschule	4.6	1.9	3.8	0.7	0.0	0.6	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.2	7.5	3.0	4.2	3.3	2.1	2.9	121
N**	1'493	575	2'068	407	120	527	207	63	270	365	83	448	174	466	642	2'786	1'410	4'198	4'198
fehlende Angaben	808	338	1'146	78	22	100	25	11	36	125	29	154	114	321	435	1'223	773	1'996	1'996
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	35.3	46.2	38.5	63.8	63.6	63.8	28.8	30.6	29.3	15.9	35.0	18.1	22.9	29.2	27.8	36.9	41.0	38.3	967
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.6	2.5	1.8	1.1	5.2	2.0	3.6	13.9	6.1	24.5	30.0	25.1	2.4	1.4	1.6	3.7	3.9	3.8	95
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	6.0	5.0	5.7	4.8	5.2	4.9	6.3	11.1	7.5	3.3	0.0	2.9	2.4	3.1	3.0	5.4	4.3	5.0	127
angelernete(r) ArbeiterIn	7.3	5.5	6.8	5.9	5.2	5.7	8.1	0.0	6.1	4.6	0.0	4.1	3.6	4.9	4.6	7.0	4.8	6.3	158
gelernte(r) ArbeiterIn	10.9	6.5	9.6	12.5	7.8	11.5	21.6	5.6	17.7	9.9	0.0	8.8	8.4	9.4	9.2	11.8	7.5	10.3	261
VorarbeiterIn	2.5	0.5	1.9	1.1	0.0	0.9	1.8	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	1.4	36
einfache(r) Angestellte(r)	10.6	19.6	13.2	7.0	9.1	7.5	13.5	16.7	14.3	9.9	10.0	9.9	13.3	23.3	21.0	10.6	19.7	13.7	347
mittl. Angestellte(r)/ Kader	9.0	6.3	8.2	1.1	1.3	1.1	4.5	5.6	4.8	2.6	0.0	2.3	13.3	8.3	9.4	6.7	6.2	6.5	165
leit. Angestellte(r)/Kader	3.7	2.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	9.6	2.4	4.0	2.7	1.7	2.4	60
selbständig	10.9	3.5	8.7	1.5	0.0	1.1	5.4	2.8	4.8	3.3	0.0	2.9	20.5	11.5	13.5	8.4	5.5	7.4	187
SchülerIn/StudentIn	0.7	0.8	0.7	0.4	2.6	0.9	3.6	13.9	6.1	24.5	20.0	24.0	2.4	3.1	3.0	3.5	3.1	3.4	85
andere Stellung	1.6	1.5	1.5	0.7	0.0	0.6	1.8	0.0	1.4	0.7	5.0	1.2	1.2	3.5	3.0	1.3	2.1	1.5	39
N**	966	398	1'364	271	77	348	111	36	147	151	20	171	83	288	371	1'658	869	2'527	2'527
fehlende Angaben	1'335	515	1'850	214	65	279	121	38	159	339	92	431	205	499	706	2'351	1'314	3'667	3'667

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	53.6	36.5	48.9	31.8	24.8	30.0	62.8	37.9	56.7	40.2	16.7	36.2	58.0	54.6	55.5	50.5	41.8	47.5	2'253
Ersparnisse	1.3	0.9	1.2	1.4	2.5	1.7	1.1	0.0	0.8	2.0	0.0	1.7	0.5	0.3	0.4	1.3	0.7	1.1	51
Rente (AHV/IV u.a.)	15.6	20.3	16.9	16.0	10.7	14.7	5.0	6.9	5.5	3.7	6.9	4.3	13.5	9.8	10.7	13.5	14.3	13.8	655
Sozialhilfe/Fürsorge	16.0	16.7	16.2	31.8	38.0	33.3	16.1	29.3	19.3	5.1	16.7	7.1	6.0	3.7	4.2	15.4	13.5	14.7	699
Arbeitslosenversicherung	8.5	5.0	7.5	9.9	7.4	9.3	5.0	10.3	6.3	4.0	2.8	3.8	2.0	1.5	1.6	7.4	4.0	6.2	296
durch PartnerIn	1.2	16.4	5.4	0.8	3.3	1.4	1.1	1.7	1.3	0.6	1.4	0.7	2.0	24.1	18.6	1.2	16.7	6.7	317
durch Eltern/Angehörige	2.4	2.2	2.4	4.4	9.9	5.8	5.6	12.1	7.1	42.7	52.8	44.4	16.0	5.3	8.0	8.8	7.4	8.3	394
dealen/mischeln	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.4	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	6
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
anderes	1.3	1.9	1.5	3.0	1.7	2.7	1.7	0.0	1.3	1.4	2.8	1.7	2.0	0.7	1.0	1.6	1.3	1.5	71
N**	1'805	695	2'500	362	121	483	180	58	238	351	72	423	200	601	802	3'079	1'668	4'748	4'748
fehlende Angaben	496	218	714	123	21	144	52	16	68	139	40	179	88	186	275	930	515	1'446	1'446
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	49.1	25.6	42.5	28.3	17.7	25.9	57.9	28.8	50.9	31.2	14.0	27.9	52.8	31.5	37.1	45.0	26.9	38.8	1'825
Teilzeitarbeit	4.9	16.8	8.2	2.2	7.3	3.4	1.9	3.0	2.2	3.2	5.8	3.7	5.6	32.4	25.3	4.2	20.1	9.7	455
Gelegenheitsarbeit	1.4	1.6	1.5	2.7	2.4	2.6	2.9	1.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2	2.3	1.9	1.8	1.9	88
in Ausbildung	1.7	2.1	1.8	1.2	7.3	2.6	4.3	18.2	7.6	40.3	45.3	41.3	13.3	5.8	7.7	7.6	7.4	7.5	354
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	18.0	34.3	22.6	28.3	25.0	27.6	11.5	22.7	14.2	4.8	15.1	6.8	13.8	22.2	20.0	17.1	27.5	20.7	973
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	18.0	12.4	16.4	26.9	23.4	26.1	12.9	16.7	13.8	11.3	3.5	9.8	6.2	4.2	4.8	16.9	9.9	14.5	682
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.2	0.7	0.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	13
anderes	6.7	6.4	6.7	9.9	16.1	11.4	7.7	9.1	8.0	6.7	14.0	8.1	5.6	1.8	2.8	7.2	6.0	6.8	318
N**	1'706	668	2'374	413	124	537	209	66	275	372	86	458	195	553	750	3'083	1'623	4'708	4'708
fehlende Angaben	595	245	840	72	18	90	23	8	31	118	26	144	93	234	327	926	560	1486	1486

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	26.1	36.4	28.9	29.6	37.8	31.4	21.0	18.8	20.5	41.6	76.5	45.8	4.5	28.0	22.7	27.7	36.4	30.1	410
weniger als 1000 Fr.	4.6	5.3	4.8	7.4	8.9	7.7	9.7	6.3	9.0	32.8	11.8	30.3	13.6	9.3	10.3	9.3	7.9	8.9	121
1001 bis 2000 Fr.	10.2	14.1	11.3	19.1	8.9	16.9	6.5	25.0	10.3	4.8	0.0	4.2	13.6	16.0	15.5	10.5	13.7	11.4	155
2001 bis 3000 Fr.	12.2	21.8	14.8	20.4	26.7	21.7	8.1	18.8	10.3	3.2	5.9	3.5	13.6	21.3	19.6	11.9	20.6	14.3	195
3001 bis 4000 Fr.	13.3	11.7	12.8	17.3	15.6	16.9	19.4	18.8	19.2	8.0	5.9	7.7	13.6	13.3	13.4	14.4	12.1	13.8	187
4001 bis 5000 Fr.	17.0	4.9	13.7	4.9	2.2	4.3	24.2	12.5	21.8	7.2	0.0	6.3	13.6	6.7	8.2	14.2	4.7	11.5	157
5001 bis 6000 Fr.	8.3	3.4	7.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	1.6	0.0	1.4	0.0	4.0	3.1	5.9	2.6	5.0	68
6001 bis 8000 Fr.	6.7	1.9	5.4	1.2	0.0	1.0	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	13.6	1.3	4.1	4.6	1.6	3.8	51
8001 bis 10 000 Fr.	1.1	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.8	0.0	0.7	4.5	0.0	1.0	0.9	0.3	0.7	10
10001 bis 15 000 Fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	2.1	0.6	0.0	0.4	6
über 15 000 Fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	566	206	772	162	45	207	62	16	78	125	17	142	22	75	97	981	379	1'360	1'360
<i>fehlende Angaben</i>	1'735	707	2'442	323	97	420	170	58	228	365	95	460	266	712	980	3'028	1'804	4'834	4'834
Schulden*																			
keine Schulden	63.5	77.1	67.6	32.2	42.6	34.4	33.7	52.0	37.2	85.0	83.7	84.8	88.5	93.2	92.1	60.4	77.9	66.0	1'347
bis 5000 Fr.	6.6	8.2	7.1	17.3	13.0	16.4	13.5	16.0	14.0	4.7	6.1	5.0	1.6	2.1	2.0	8.1	7.0	7.7	158
5001 bis 10 000 Fr.	6.8	4.4	6.1	16.8	14.8	16.4	14.4	16.0	14.7	5.6	4.1	5.3	0.0	2.1	1.6	8.3	5.0	7.3	148
10 001 bis 25 000 Fr.	9.2	5.1	8.0	10.9	25.9	14.1	21.2	4.0	17.8	2.6	2.0	2.5	3.3	1.6	2.0	9.1	6.1	8.1	166
25 001 bis 50 000 Fr.	5.9	2.7	5.0	8.9	1.9	7.4	9.6	0.0	7.8	1.3	4.1	1.8	3.3	0.5	1.2	6.3	1.8	4.9	99
50 001 bis 100 000 Fr.	2.9	1.0	2.3	9.4	1.9	7.8	5.8	8.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.8	3.8	1.2	2.9	60
über 100 000 Fr.	5.0	1.4	4.0	4.5	0.0	3.5	1.9	4.0	2.3	0.9	0.0	0.7	1.6	0.0	0.4	4.0	1.1	3.0	62
N**	694	293	987	202	54	256	104	25	129	233	49	282	61	192	253	1'380	660	2'040	2'040
<i>fehlende Angaben</i>	1'607	620	2'227	283	88	371	128	49	177	257	63	320	227	595	824	2'629	1'523	4'154	4'154

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	84.1	96.5	87.8	43.5	78.3	49.8	60.0	78.3	64.3	91.2	94.7	91.6	77.5	94.2	82.0	1'526
Strafhaft	10.3	1.6	7.7	20.8	2.2	17.4	9.3	13.0	10.2	4.1	0.0	3.6	11.1	2.0	8.6	161
Untersuchungshaft	3.1	1.3	2.6	14.5	15.2	14.6	25.3	8.7	21.4	4.8	0.0	4.2	6.3	2.8	5.4	100
Straf- und Untersuchungshaft	2.5	0.5	1.9	21.3	4.3	18.2	5.3	0.0	4.1	0.0	5.3	0.6	5.1	1.0	4.0	75
N**	881	372	1'253	207	46	253	75	23	98	147	19	166	1'365	497	1'862	1'862
fehlende Angaben	1'420	541	1'961	278	96	374	157	51	208	343	93	436	2'356	899	3'255	3'255
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	24.2	40.0	25.7	18.4	60.0	21.0	42.1	66.7	45.5	60.0	0.0	54.5	25.4	47.4	27.2	62
1 bis 2 Monate	17.2	20.0	17.4	10.5	0.0	9.9	15.8	0.0	13.6	10.0	100.0	18.2	13.9	15.8	14.0	32
>2 bis 6 Monate	22.2	10.0	21.1	26.3	0.0	24.7	10.5	33.3	13.6	10.0	0.0	9.1	22.5	10.5	21.5	49
>6 bis 12 Monate	9.1	10.0	9.2	10.5	20.0	11.1	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	10.5	10.5	10.5	24
mehr als 1 Jahr	27.3	20.0	26.6	34.2	20.0	33.3	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	27.8	15.8	26.8	61
N**	99	10	109	76	5	81	19	3	22	10	1	11	209	19	228	228
fehlende Angaben	41	3	44	41	5	46	11	2	13	3	0	3	98	10	108	108

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	26.5	35.7	29.1	53.7	45.7	51.8	38.3	32.9	36.9	21.4	24.5	22.0	52.5	67.2	63.5	32.1	48.6	38.1	1'952
PartnerIn	6.7	4.7	6.1	4.0	2.4	3.6	8.6	2.9	7.2	3.4	1.1	3.0	3.8	3.2	3.3	6.0	3.5	5.1	262
Familie	3.5	4.7	3.8	2.6	7.1	3.6	9.1	8.6	9.0	10.0	9.6	9.9	10.6	5.3	6.7	5.2	5.6	5.3	272
FreundInnen/Bekannte	2.0	3.3	2.4	1.2	1.6	1.3	2.9	4.3	3.2	1.5	3.2	1.8	3.8	5.1	4.7	2.3	4.1	2.9	150
spez. ambulante Institution	1.7	2.2	1.8	4.3	4.7	4.4	1.9	4.3	2.5	1.2	0.0	1.0	0.8	1.2	1.1	2.0	1.8	1.9	99
spez. stationäre Institution	6.4	6.4	6.4	3.6	4.7	3.8	4.3	1.4	3.6	0.7	1.1	0.8	0.8	0.9	0.9	4.5	3.4	4.1	211
Arztpraxis	8.4	10.6	9.0	7.6	9.4	8.0	4.3	5.7	4.7	3.4	5.3	3.8	4.2	5.2	4.9	6.9	8.2	7.4	378
Spital/Klinik	11.3	14.5	12.3	2.1	0.8	1.8	2.9	11.4	5.0	2.4	4.3	2.8	1.7	1.9	1.9	7.4	7.4	7.4	381
Sozialdienste	7.3	6.3	7.0	6.2	13.4	7.8	2.9	10.0	4.7	3.9	5.3	4.2	5.5	3.8	4.2	6.3	5.8	6.1	315
Justiz/adm. Massnahme	17.7	5.8	14.3	9.7	5.5	8.8	19.1	10.0	16.8	44.0	28.7	41.2	7.6	1.3	2.9	18.7	5.0	13.7	705
ArbeitgeberIn	5.0	2.6	4.3	0.2	2.4	0.7	0.5	2.9	1.1	1.5	2.1	1.6	2.5	0.9	1.3	3.6	2.1	3.1	157
LehrerIn	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	1.5	3.2	1.8	1.7	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	29
anderes	3.1	3.3	3.2	4.8	2.4	4.2	5.3	2.9	4.7	5.1	11.7	6.3	4.2	3.6	3.8	4.4	4.0	4.3	218
N**	1'816	729	2'545	421	127	548	209	70	279	411	94	505	236	693	931	3'279	1'848	5'129	5'129
fehlende Angaben	485	184	669	64	15	79	23	4	27	79	18	97	52	94	146	730	335	1'065	1'065
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	26.5	25.8	26.3	23.2	30.9	24.8	38.9	36.4	38.3	20.6	18.2	20.3	11.7	11.0	11.1	25.6	20.8	24.1	674
PartnerIn	9.1	7.3	8.6	7.7	14.7	9.1	6.5	6.1	6.4	3.9	0.0	3.5	10.4	6.0	6.9	8.2	7.2	7.9	221
Familie	4.2	7.3	5.0	8.5	8.8	8.6	10.2	15.2	11.3	7.2	9.1	7.4	9.1	10.0	9.8	5.8	8.6	6.7	189
FreundInnen/Bekannte	2.0	3.7	2.5	3.3	1.5	2.9	2.8	12.1	5.0	0.6	4.5	1.0	2.6	5.3	4.8	2.2	4.4	2.9	82
spez. ambulante Institution	1.1	1.6	1.2	3.7	4.4	3.8	1.9	3.0	2.1	0.6	0.0	0.5	1.3	3.0	2.6	1.4	2.3	1.7	48
spez. stationäre Institution	2.8	3.0	2.9	2.6	2.9	2.7	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.5	2.3	1.9	2.1	60
Arztpraxis	5.2	8.0	5.9	10.7	13.2	11.2	6.5	3.0	5.7	2.2	0.0	2.0	2.6	1.0	1.3	5.7	5.4	5.6	158
Spital/Klinik	3.0	4.2	3.3	2.2	4.4	2.7	0.9	3.0	1.4	0.6	4.5	1.0	2.6	1.3	1.6	2.4	3.0	2.6	72
Sozialdienste	3.3	4.0	3.5	5.5	7.4	5.9	1.9	6.1	2.8	3.9	4.5	4.0	2.6	2.3	2.4	3.5	4.0	3.6	102
Justiz/adm. Massnahme	3.7	1.4	3.1	4.8	5.9	5.0	6.5	0.0	5.0	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	2.8	78
ArbeitgeberIn	3.2	2.1	2.9	1.1	1.5	1.2	1.9	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	1.3	0.3	0.5	2.5	1.3	2.1	59
LehrerIn	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	9
anderes	1.9	1.9	1.9	3.3	2.9	3.2	3.7	6.1	4.3	2.2	4.5	2.5	0.0	2.3	1.9	2.3	2.4	2.3	65
keine	42.8	39.8	42.0	38.4	29.4	36.6	36.1	30.3	34.8	60.0	54.5	59.4	54.5	61.5	60.1	44.0	46.9	44.9	1'259
N**	1'181	427	1'608	271	68	339	108	33	141	180	22	202	77	301	378	1'899	902	2'801	2'801
fehlende Angaben	1'120	486	1'606	214	74	288	124	41	165	310	90	400	211	486	699	2'110	1'281	3'393	3'393

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hilferwartungen für...*																			
Suchtprobleme	79.7	88.2	82.1	86.0	87.8	86.4	79.0	91.9	82.1	62.0	66.7	62.6	51.6	53.6	53.0	76.1	74.4	75.5	2'542
somatische Probleme	4.1	4.4	4.2	2.9	6.1	3.5	1.7	8.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	3.2	3.5	3.3	110
psychische Probleme	18.5	23.6	19.9	20.4	26.8	21.7	20.2	24.3	21.2	9.1	25.9	11.1	19.4	24.0	23.2	18.2	25.2	20.7	696
Beziehungsprobleme	15.7	23.4	17.9	13.7	14.6	13.9	12.6	16.2	13.5	9.1	7.4	8.9	27.4	45.4	41.5	15.7	30.2	20.7	698
Familienprobleme	10.2	17.7	12.3	12.7	23.2	14.9	12.6	29.7	16.7	14.4	25.9	15.7	40.3	41.1	41.0	12.9	27.4	17.9	603
finanzielle Probleme	9.0	7.4	8.6	26.8	18.3	25.0	16.0	16.2	16.0	4.8	3.7	4.7	1.6	6.5	5.4	11.6	8.1	10.4	351
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	16.1	12.4	15.1	17.5	9.8	15.9	10.9	18.9	12.8	11.1	14.8	11.5	3.2	6.7	5.9	14.3	10.3	12.9	436
Wohnprobleme	4.6	3.6	4.3	8.6	7.3	8.3	10.1	13.5	10.9	2.9	0.0	2.6	2.4	3.8	3.5	5.1	4.2	4.8	160
Gewaltprobleme	1.0	2.1	1.3	1.3	3.7	1.8	1.7	0.0	1.3	1.4	0.0	1.3	1.6	4.8	4.1	1.2	2.9	1.8	61
rechtliche Probleme	13.1	6.3	11.1	10.2	3.7	8.8	21.0	10.8	18.6	15.9	3.7	14.5	4.0	3.6	3.7	12.5	4.9	9.9	333
andere(s)	2.3	1.7	2.1	2.5	2.4	2.5	3.4	2.7	3.2	1.4	3.7	1.7	10.5	4.1	5.7	3.7	3.2	3.5	119
keine Erwartung	8.9	4.2	7.6	2.5	1.2	2.3	5.0	2.7	4.5	20.2	14.8	19.6	0.0	0.5	0.4	8.4	2.8	6.4	217
N**	1'340	526	1'866	314	82	396	119	37	156	208	27	235	124	416	542	2'211	1'155	3'368	3'368
fehlende Angaben	961	387	1'348	171	60	231	113	37	150	282	85	367	164	371	535	1'798	1'028	2'826	2'826
Rechtsgrundlage der Behandlung																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	0.9	0.0	0.7	5.5	9.5	5.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.7	20
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	2.8	1.8	2.5	3.0	1.5	2.7	2.8	3.1	2.9	2.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.1	2.1	59
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.6	0.2	0.5	0.7	1.5	0.9	0.9	0.0	0.7	9.3	9.5	9.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	31
anderes	12.5	7.6	11.2	7.5	4.6	6.9	23.1	15.6	21.4	25.8	14.3	24.6	1.3	0.0	0.3	13.1	5.0	10.4	293
keine (freiwillige Behandlung)	83.6	90.3	85.5	87.3	92.3	88.3	71.3	81.3	73.6	56.6	66.7	57.6	98.8	100.0	99.7	81.7	93.3	85.6	2'410
N**	1'174	445	1'619	267	65	332	108	32	140	182	21	203	80	319	399	1'888	929	2'817	2'817
fehlende Angaben	1'127	468	1'595	218	77	295	124	42	166	308	91	399	208	468	678	2'121	1'254	3'377	3'377

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	42.7	39.9	41.8	16.8	15.6	16.5	50.5	50.8	50.6	76.7	79.6	77.2	70.8	70.4	70.5	47.2	52.3	49.0	2'384
ja	57.3	60.1	58.2	83.2	84.4	83.5	49.5	49.2	49.4	23.3	20.4	22.8	29.2	29.6	29.5	52.8	47.7	51.0	2'480
N**	1'748	740	2'488	404	122	526	206	65	271	416	93	509	202	585	787	3'139	1'725	4'864	4'864
fehlende Angaben	553	173	726	81	20	101	26	9	35	74	19	93	86	202	290	870	458	1'330	1'330
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.9	0.7	0.8	6.7	5.4	6.4	1.2	3.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	1.8	37
Substitution (Methadon, Subutex®)	6.7	4.0	5.8	67.5	67.4	67.5	25.3	43.3	30.1	6.6	23.1	9.0	8.6	2.5	3.8	20.0	14.1	18.0	380
weitere medikamentöse Suchtbeh.	11.7	9.9	11.1	10.8	8.7	10.3	2.4	6.7	3.5	2.6	7.7	3.4	2.9	2.5	2.5	10.3	8.0	9.5	201
ambulante Beratung	65.3	57.8	62.9	60.1	57.6	59.4	71.1	56.7	67.3	78.9	76.9	78.7	68.6	88.5	84.1	65.7	63.5	64.9	1'369
stationäre Therapie	49.0	56.8	51.4	41.8	39.1	41.1	42.2	40.0	41.6	22.4	30.8	23.6	25.7	9.8	13.4	44.6	43.7	44.3	933
Entzug	39.2	42.0	40.1	53.4	46.7	51.7	30.1	46.7	34.5	11.8	30.8	14.6	17.1	5.7	8.3	38.7	35.2	37.5	791
Selbsthilfegruppe	7.3	8.6	7.8	3.0	5.4	3.6	2.4	6.7	3.5	1.3	0.0	1.1	0.0	4.9	3.8	5.5	6.8	6.0	126
andere	3.0	3.0	3.0	3.4	3.3	3.3	4.8	3.3	4.4	5.3	7.7	5.6	14.3	8.2	9.6	3.8	4.6	4.0	85
N**	898	405	1'303	268	92	360	83	30	113	76	13	89	35	122	157	1'407	701	2'108	2'108
fehlende Angaben	104	40	144	68	11	79	19	2	21	21	6	27	24	51	75	251	121	372	372

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung*																
nein	97.1	97.4	97.2	57.2	49.5	55.4	89.4	81.5	87.5	98.9	98.6	98.9	91.2	91.1	91.2	3'114
ja	2.9	2.6	2.8	42.8	50.5	44.6	10.6	18.5	12.5	1.1	1.4	1.1	8.8	8.9	8.8	300
N**	1'511	585	2'096	341	103	444	170	54	224	368	72	440	2'514	900	3'414	3'414
fehlende Angaben	790	328	1'118	144	39	183	62	20	82	122	40	162	1'207	496	1'703	1'703
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	2.5	0.0	1.9	4.8	5.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.9	3.8	11
Methadon	72.5	84.6	75.5	88.4	90.2	88.8	82.4	90.0	85.2	75.0	100.0	80.0	85.0	88.3	85.9	250
andere Opiate	5.0	0.0	3.8	5.5	3.9	5.1	11.8	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	5.6	5.2	5.5	16
andere Substanzen	20.0	15.4	18.9	1.4	0.0	1.0	5.9	0.0	3.7	25.0	0.0	20.0	5.6	2.6	4.8	14
N**	40	13	53	146	51	197	17	10	27	4	1	5	214	77	291	291
fehlende Angaben	4	2	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	3	9	9
Andere parallele Behandlung*																
nein	86.8	83.4	85.9	76.7	69.6	75.4	83.3	75.6	81.6	93.1	93.9	93.2	85.5	82.3	84.7	2'293
ja	13.2	16.6	14.1	23.3	30.4	24.6	16.7	24.4	18.4	6.9	6.1	6.8	14.5	17.7	15.3	414
N**	1'222	464	1'686	331	79	410	144	41	185	231	33	264	2'024	683	2'707	2'707
fehlende Angaben	1'079	449	1'528	154	63	217	88	33	121	259	79	338	1'697	713	2'410	2'410
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	63.5	65.8	64.3	74.0	79.2	75.2	69.6	50.0	63.6	81.3	100.0	83.3	68.6	68.3	68.5	281
stationäre Therapie	12.6	10.5	11.9	11.7	20.8	13.9	21.7	20.0	21.2	6.3	0.0	5.6	12.8	12.5	12.7	52
Selbsthilfegruppe	6.9	6.6	6.8	2.6	0.0	2.0	4.3	10.0	6.1	0.0	0.0	0.0	4.8	5.0	4.9	20
anderes	22.0	23.7	22.6	15.6	0.0	11.9	13.0	20.0	15.2	12.5	0.0	11.1	18.6	18.3	18.5	76
N**	159	76	235	77	24	101	23	10	33	16	2	18	290	120	410	410
fehlende Angaben	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	4

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	74.9	72.7	74.3	86.3	85.7	86.2	89.2	87.5	88.8	97.1	83.3	95.9	80.3	77.0	79.5	1'845
Entzug in der gleichen Institution	1.2	1.4	1.2	0.4	1.6	0.6	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.9	22
Entzug in einer anderen Institution	23.9	25.9	24.5	13.4	12.7	13.2	10.8	9.4	10.5	2.9	16.7	4.1	18.9	21.6	19.6	455
N**	1'119	428	1'547	262	63	325	111	32	143	175	18	193	1'735	587	2'322	2'322
<i>fehlende Angaben</i>	1'182	485	1'667	223	79	302	121	42	163	315	94	409	1'986	809	2'795	2'795

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2006)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
nie	57.3	52.9	56.2	18.6	23.8	19.9	52.5	38.9	49.4	72.6	85.7	73.5	53.6	50.2	52.7	599
einmal	9.7	6.9	9.0	10.9	9.5	10.5	13.1	11.1	12.7	13.7	0.0	12.7	10.5	8.1	9.9	112
zwei oder dreimal	12.4	12.2	12.3	21.7	23.8	22.2	6.6	22.2	10.1	5.3	0.0	4.9	12.0	13.7	12.4	141
mehr als dreimal	20.6	28.0	22.5	48.8	42.9	47.4	27.9	27.8	27.8	8.4	14.3	8.8	24.0	28.1	25.0	284
N**	525	189	714	129	42	171	61	18	79	95	7	102	851	285	1'136	1'136
<i>fehlende Angaben</i>	1'776	724	2'500	356	100	456	171	56	227	395	105	500	2'870	1'111	3'981	3'981

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2006)

alle Selbstbetroffenen										
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total		
	%	%	%	N		%	%	%	N	
Alkohol	62.2	66.2	63.3	3'214	Alkohol	62.2	66.2	63.3	3'214	
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.5	0.7	0.6	29	Cocktail	0.5	0.7	0.6	29	
Heroin	11.4	7.9	10.5	531	Opiate	12.6	9.6	11.8	598	
Methadon	1.1	1.2	1.1	55						
andere Opiate	0.1	0.6	0.2	12						
Kokain	6.2	5.4	6.0	303	Kokain und Derivate	6.3	5.4	6.0	306	
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.1	3						
Amphetamine	0.2	0.1	0.2	11	Stimulantien	0.5	0.2	0.4	20	
MDMA und verwandte Stoffe	0.2	0.1	0.2	9						
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0						
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0	Medikamente	0.6	1.0	0.7	38	
Benzodiazepine	0.5	0.9	0.6	33						
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.1	0.1	5						
LSD	0.0	0.0	0.0	0	Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1	
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1						
Cannabis	13.2	8.1	11.9	602	Cannabis	13.2	8.1	11.9	602	
Tabak	1.3	3.0	1.8	89	Tabak	1.3	3.0	1.8	89	
flüchtige Stoffe	0.1	0.1	0.1	3	andere Substanzen	0.3	0.8	0.4	21	
andere Substanz	0.2	0.7	0.4	18						
pathologisches Spielen	1.7	0.8	1.5	75	suchtähnliche Verhaltensweisen	2.5	5.1	3.2	161	
Essstörungen	0.1	2.7	0.8	39						
anderes suchtähnliches Problem	0.7	1.6	0.9	47						
N**	3'699	1'380	5'079	5'079		3'699	1'380	5'079	5'079	
<i>fehlende Angaben</i>	22	16	38	38		22	16	38	38	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	28.2	20.0	27.1	37.2	33.3	5.3	100.0	21.4	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	13.3	12.2	16.8	25.0	0.0	0.0	14.7	0.0	50.0
2-3 Tage pro Woche	13.3	40.0	11.3	22.5	41.7	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	11.5	6.7	8.3	7.3	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0
einmal täglich	7.0	6.7	15.8	5.8	0.0	21.1	0.0	9.8	2.6	25.0
mehrmals täglich	32.2	13.3	25.3	10.5	0.0	73.7	0.0	21.4	97.4	25.0
N**	1'315	15	336	191	12	19	1	388	38	4
fehlende Angaben	986	5	129	41	5	5	0	102	10	6
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	9.0	13.3	22.3	16.9	9.1	10.0	0.0	6.7	2.7	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.3	6.7	16.0	23.6	27.3	0.0	0.0	16.2	0.0	20.0
2-3 Tage pro Woche	15.6	46.7	12.5	27.7	36.4	10.0	100.0	23.8	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	14.8	6.7	9.0	8.1	27.3	0.0	0.0	10.8	2.7	0.0
einmal täglich	8.8	0.0	16.0	6.8	0.0	20.0	0.0	8.6	2.7	20.0
mehrmals täglich	44.5	26.7	24.2	16.9	0.0	60.0	0.0	34.0	91.9	60.0
N**	1'199	15	256	148	11	10	1	315	37	5
fehlende Angaben	1'102	5	209	84	6	14	0	175	11	5

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer

Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	50.0	0.0	28.6
1 Tag pro Woche oder weniger	19.0	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.3	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	2.4	0.0	28.6
einmal täglich	0.0	0.0	42.9
mehrmals täglich	14.3	0.0	0.0
N**	42	0	7
fehlende Angaben	22	2	18
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	34.4	0.0	14.3
1 Tag pro Woche oder weniger	28.1	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	15.6	0.0	14.3
4-6 Tage pro Woche	3.1	0.0	28.6
einmal täglich	3.1	0.0	14.3
mehrmals täglich	15.6	0.0	28.6
N**	32	0	7
fehlende Angaben	32	2	18

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	23.2	42.9	24.2	28.1	0.0	30.0	0.0	14.3	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	11.5	14.3	13.1	24.6	0.0	0.0	0.0	20.2	5.7	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.2	14.3	5.1	28.1	50.0	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
4-6 Tage pro Woche	13.4	14.3	6.1	10.5	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	0.0
einmal täglich	8.0	0.0	22.2	1.8	50.0	10.0	0.0	21.4	2.9	0.0
mehrmals täglich	29.8	14.3	29.3	7.0	0.0	60.0	0.0	25.0	88.6	50.0
N**	514	7	99	57	2	10	0	84	35	2
fehlende Angaben	399	2	34	17	1	4	0	28	6	9
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	6.6	28.6	14.8	7.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.3	0.0	9.9	32.6	0.0	20.0	0.0	23.9	3.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	17.4	42.9	12.3	23.3	100.0	0.0	0.0	19.7	0.0	20.0
4-6 Tage pro Woche	16.5	14.3	7.4	18.6	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
einmal täglich	8.3	0.0	19.8	2.3	0.0	20.0	0.0	9.9	3.0	0.0
mehrmals täglich	41.9	14.3	35.8	16.3	0.0	60.0	0.0	39.4	93.9	80.0
N**	484	7	81	43	1	5	0	71	33	5
fehlende Angaben	429	2	52	31	2	9	0	41	8	6

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Frauen

Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	28.6	0.0	20.0
1 Tag pro Woche oder weniger	28.6	9.1	20.0
2-3 Tage pro Woche	14.3	18.2	50.0
4-6 Tage pro Woche	14.3	22.7	0.0
einmal täglich	0.0	13.6	0.0
mehrmals täglich	14.3	36.4	10.0
N**	7	22	10
fehlende Angaben	4	15	12
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	60.0	0.0	20.0
1 Tag pro Woche oder weniger	20.0	10.5	30.0
2-3 Tage pro Woche	20.0	21.1	30.0
4-6 Tage pro Woche	0.0	26.3	10.0
einmal täglich	0.0	10.5	0.0
mehrmals täglich	0.0	31.6	10.0
N**	5	19	10
fehlende Angaben	6	18	12

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	26.8	27.3	26.4	35.1	28.6	13.8	100.0	20.1	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.9	13.6	12.4	18.5	21.4	0.0	0.0	15.7	2.7	33.3
2-3 Tage pro Woche	13.6	31.8	9.9	23.8	42.9	0.0	0.0	21.4	0.0	16.7
4-6 Tage pro Woche	12.0	9.1	7.8	8.1	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.0
einmal täglich	7.3	4.5	17.2	4.8	7.1	17.2	0.0	11.9	2.7	16.7
mehrmals täglich	31.5	13.6	26.2	9.7	0.0	69.0	0.0	22.0	93.2	33.3
N**	1'829	22	435	248	14	29	1	472	73	6
fehlende Angaben	1'385	7	163	58	6	9	0	130	16	15
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	8.3	18.2	20.5	14.7	8.3	6.7	0.0	6.0	1.4	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	4.5	14.5	25.7	25.0	6.7	0.0	17.6	1.4	10.0
2-3 Tage pro Woche	16.1	45.5	12.5	26.7	41.7	6.7	100.0	23.1	0.0	10.0
4-6 Tage pro Woche	15.3	9.1	8.6	10.5	25.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.0
einmal täglich	8.7	0.0	16.9	5.8	0.0	20.0	0.0	8.8	2.9	10.0
mehrmals täglich	43.8	22.7	27.0	16.8	0.0	60.0	0.0	35.0	92.9	70.0
N**	1'683	22	337	191	12	15	1	386	70	10
fehlende Angaben	1'531	7	261	115	8	23	0	216	19	11

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2006), Männer und Frauen

Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	46.9	0.0	23.5
1 Tag pro Woche oder weniger	20.4	9.1	11.8
2-3 Tage pro Woche	14.3	18.2	29.4
4-6 Tage pro Woche	4.1	22.7	11.8
einmal täglich	0.0	13.6	17.6
mehrmals täglich	14.3	36.4	5.9
N**	49	22	17
fehlende Angaben	26	17	30
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	37.8	0.0	17.6
1 Tag pro Woche oder weniger	27.0	10.5	17.6
2-3 Tage pro Woche	16.2	21.1	23.5
4-6 Tage pro Woche	2.7	26.3	17.6
einmal täglich	2.7	10.5	5.9
mehrmals täglich	13.5	31.6	17.6
N**	37	19	17
fehlende Angaben	38	20	30

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.2	21.8	20.6	22.2	19.4	23.0	22.0	15.0	15.9	18.8
Standardabweichung	4.3	3.4	5.2	5.9	7.4	3.6	.	1.9	4.4	8.5
1. Quartil	15.0	18.5	17.0	17.0	15.5	21.0	22.0	14.0	13.0	15.0
Medianwert	16.0	22.5	19.0	20.0	17.5	25.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3. Quartil	18.0	24.5	23.0	26.0	19.5	25.0	22.0	16.0	19.0	16.0
N*	798	12	286	169	12	9	1	323	17	5
fehlende Angaben	1503	8	179	63	5	15	0	167	31	5
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.1	22.8	22.4	24.2	21.5	27.2	22.0	16.2	17.1	27.4
Standardabweichung	8.1	3.9	5.6	6.8	8.0	6.3	.	2.7	4.4	12.1
1. Quartil	17.0	20.0	18.0	18.0	16.0	22.0	22.0	15.0	14.0	18.0
Medianwert	20.0	23.0	21.0	23.0	20.0	25.0	22.0	16.0	16.0	24.0
3. Quartil	25.0	26.0	25.0	28.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	34.0
N*	821	13	266	154	11	13	1	300	19	5
fehlende Angaben	1480	7	199	78	6	11	0	190	29	5
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	30.5	21.9	23.3	25.2	22.8	34.0	24.0	17.0	18.2	31.0
Standardabweichung	11.4	3.0	5.9	7.2	8.1	4.4	.	3.4	5.6	4.2
1. Quartil	20.0	20.0	19.0	20.0	18.0	32.0	24.0	15.0	14.5	28.0
Medianwert	29.0	21.0	22.0	24.0	20.0	35.0	24.0	16.0	17.0	31.0
3. Quartil	40.0	23.0	26.0	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	34.0
N*	635	9	159	119	10	5	1	202	12	2
fehlende Angaben	1666	11	306	113	7	19	0	288	36	8
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	26.2	9.6	9.5	6.1	6.6	13.0	.	5.8	14.4	14.0
Standardabweichung	13.4	10.4	8.6	5.3	7.9	0.0	.	5.9	18.0	12.5
1. Quartil	16.1	2.3	2.0	2.0	0.9	13.0	.	1.9	3.0	0.0
Medianwert	26.1	6.1	7.4	4.6	3.1	13.0	.	3.7	5.5	17.6
3. Quartil	34.9	16.9	14.9	9.9	9.9	13.0	.	7.9	13.1	24.3
N*	347	4	50	86	10	2	0	237	9	3
fehlende Angaben	399	0	14	18	2	3	0	82	13	3

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	17.5	21.5	21.2	19.4	19.0	21.3	.	14.6	17.7	19.6
Standardabweichung	6.3	5.6	7.4	4.5	2.8	9.3	.	3.1	7.4	13.6
1. Quartil	15.0	17.0	16.0	16.0	17.0	14.0	.	14.0	12.0	12.0
Medianwert	17.0	20.0	19.0	18.0	19.0	19.0	.	14.0	16.0	13.5
3. Quartil	19.0	26.0	25.0	22.0	21.0	27.0	.	15.0	20.0	27.5
N*	280	6	82	54	2	10	0	73	15	4
fehlende Angaben	633	3	51	20	1	4	0	39	26	7
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	26.7	22.2	22.2	20.5	19.5	23.8	.	16.1	18.1	23.6
Standardabweichung	11.3	6.0	7.1	5.3	2.1	12.1	.	3.7	7.2	13.2
1. Quartil	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	15.0	.	15.0	13.0	14.0
Medianwert	23.0	21.0	20.0	19.0	19.5	20.5	.	15.0	16.0	15.0
3. Quartil	34.0	28.0	25.0	23.0	21.0	27.0	.	16.0	20.0	36.0
N*	310	6	81	53	2	10	0	70	17	5
fehlende Angaben	603	3	52	21	1	4	0	42	24	6
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	33.9	22.5	23.0	23.7	21.0	17.7	.	16.0	18.7	36.0
Standardabweichung	11.8	5.7	7.7	6.5	.	3.5	.	2.4	7.7	.
1. Quartil	25.0	18.0	18.0	19.5	21.0	14.0	.	15.0	14.0	36.0
Medianwert	34.0	21.5	20.0	21.5	21.0	18.0	.	16.0	17.0	36.0
3. Quartil	42.0	28.0	25.0	26.0	21.0	21.0	.	17.0	20.0	36.0
N*	261	6	61	36	1	3	0	46	14	1
fehlende Angaben	652	3	72	38	2	11	0	66	27	10
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	46.3	2.5	5.3	4.9	1.1	12.3	.	5.2	21.3	15.7
Standardabweichung	194.4	0.3	4.2	6.0	.	5.7	.	3.8	18.9	4.9
1. Quartil	17.8	2.2	1.2	1.0	1.1	6.0	.	2.8	2.2	11.5
Medianwert	28.4	2.5	4.4	3.0	1.1	14.0	.	4.0	28.0	14.4
3. Quartil	35.7	2.7	8.0	5.2	1.1	17.0	.	7.3	38.7	21.1
N*	102	2	14	30	1	3	0	53	9	3
fehlende Angaben	193	0	3	3	0	1	0	21	11	5

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2006), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.6	21.7	20.7	21.5	19.4	22.1	22.0	14.9	16.7	19.2
Standardabweichung	4.9	4.1	5.8	5.7	6.8	7.1	.	2.2	6.0	10.3
1. Quartil	15.0	18.0	17.0	17.0	16.0	17.0	22.0	14.0	13.0	14.0
Medianwert	16.0	22.0	19.0	20.0	17.5	22.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3. Quartil	18.0	25.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.0	16.0	19.5	16.0
N*	1'078	18	368	223	14	19	1	396	32	9
fehlende Angaben	2'136	11	230	83	6	19	0	206	57	12
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.4	22.6	22.4	23.2	21.2	25.7	22.0	16.2	17.6	25.5
Standardabweichung	9.3	4.5	6.0	6.6	7.3	9.2	.	2.9	5.8	12.1
1. Quartil	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	20.0	22.0	15.0	14.0	15.0
Medianwert	20.0	23.0	21.0	22.0	20.0	24.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3. Quartil	27.0	26.0	25.0	27.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	36.0
N*	1'131	19	347	207	13	23	1	370	36	10
fehlende Angaben	2'083	10	251	99	7	15	0	232	53	11
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.5	22.1	23.2	24.8	22.6	27.9	24.0	16.8	18.5	32.7
Standardabweichung	11.6	4.1	6.4	7.0	7.7	9.3	.	3.3	6.7	4.2
1. Quartil	21.0	19.0	19.0	20.0	18.0	19.5	24.0	15.0	14.0	28.0
Medianwert	30.0	21.0	21.0	23.0	20.0	30.0	24.0	16.0	17.0	34.0
3. Quartil	40.0	26.0	25.5	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	36.0
N*	896	15	220	155	11	8	1	248	26	3
fehlende Angaben	2'318	14	378	151	9	30	0	354	63	18
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	30.8	7.3	8.6	5.8	6.1	12.6	.	5.7	17.8	14.8
Standardabweichung	93.5	8.9	8.0	5.5	7.7	4.0	.	5.5	18.3	8.6
1. Quartil	16.5	2.2	2.0	1.7	0.9	13.0	.	2.0	2.2	11.5
Medianwert	27.0	2.7	6.9	4.0	2.8	13.0	.	3.8	7.0	16.0
3. Quartil	35.4	9.4	13.2	8.6	9.9	14.0	.	7.9	38.7	21.1
N*	449	6	64	116	11	5	0	290	18	6
fehlende Angaben	592	0	17	21	2	4	0	103	24	8

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	31.4	.	34.0
Standardabweichung	9.9	.	8.5
1. Quartil	25.0	.	28.0
Medianwert	29.5	.	34.0
3. Quartil	40.0	.	40.0
N*	26	0	2
<i>fehlende Angaben</i>	38	2	23
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	32.0	.	30.7
Standardabweichung	9.2	.	8.3
1. Quartil	27.0	.	24.0
Medianwert	30.5	.	28.0
3. Quartil	40.0	.	40.0
N*	28	0	3
<i>fehlende Angaben</i>	36	2	22
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	32.4	.	33.3
Standardabweichung	9.2	.	7.6
1. Quartil	27.0	.	27.0
Medianwert	31.0	.	34.5
3. Quartil	40.0	.	39.5
N*	27	0	4
<i>fehlende Angaben</i>	37	2	21
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	3.9	.	6.2
Standardabweichung	3.0	.	7.2
1. Quartil	1.7	.	1.1
Medianwert	3.0	.	6.2
3. Quartil	5.7	.	11.4
N*	25	0	2
<i>fehlende Angaben</i>	39	2	23

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	28.3	17.3	28.2
Standardabweichung	6.0	3.9	17.7
1. Quartil	22.0	15.0	16.0
Medianwert	29.0	16.0	40.0
3. Quartil	34.0	18.0	40.0
N*	3	17	5
fehlende Angaben	8	20	17
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	29.3	18.1	31.3
Standardabweichung	6.4	4.3	12.4
1. Quartil	22.0	14.5	18.0
Medianwert	32.0	17.0	32.5
3. Quartil	34.0	21.0	42.0
N*	3	16	6
fehlende Angaben	8	21	16
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	29.3	18.4	26.2
Standardabweichung	6.4	4.7	12.2
1. Quartil	22.0	15.0	18.0
Medianwert	32.0	17.0	22.5
3. Quartil	34.0	24.0	40.0
N*	3	15	6
fehlende Angaben	8	22	16
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	2.1	8.2	12.1
Standardabweichung	2.0	7.4	10.0
1. Quartil	0.5	3.0	6.1
Medianwert	1.5	4.9	10.0
3. Quartil	4.4	10.9	18.2
N*	3	17	4
fehlende Angaben	8	20	18

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2006),
Männer und Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
<i>Männer & Frauen</i>	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	31.1	17.3	29.9
Standardabweichung	9.5	3.9	15.1
1. Quartil	25.0	15.0	16.0
Medianwert	29.0	16.0	40.0
3. Quartil	40.0	18.0	40.0
N*	29	17	7
<i>fehlende Angaben</i>	46	22	40
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	31.8	18.1	31.1
Standardabweichung	8.9	4.3	10.7
1. Quartil	27.0	14.5	24.0
Medianwert	31.0	17.0	28.0
3. Quartil	40.0	21.0	40.0
N*	31	16	9
<i>fehlende Angaben</i>	44	23	38
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	32.1	18.4	29.0
Standardabweichung	8.9	4.7	10.8
1. Quartil	27.0	15.0	20.0
Medianwert	31.5	17.0	27.5
3. Quartil	38.0	24.0	40.0
N*	30	15	10
<i>fehlende Angaben</i>	45	24	37
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	3.7	8.2	10.2
Standardabweichung	3.0	7.4	8.9
1. Quartil	1.5	3.0	2.4
Medianwert	2.8	4.9	10.0
3. Quartil	5.3	10.9	11.4
N*	28	17	6
<i>fehlende Angaben</i>	47	22	41

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2006)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Einnahmeart*															
injizieren	29.4	39.7	31.9	8.9	22.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	7.7
rauchen/inhalieren	42.4	29.3	39.1	16.3	22.2	17.9	0.0	0.0	0.0	99.3	100.0	99.4	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	1.1	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	20.0	100.0	33.3	0.7	0.0	0.6	90.0	66.7	84.6
sniffen	26.6	31.0	27.7	74.0	55.6	69.0	80.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7
anderes	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	177	58	235	123	45	168	5	1	6	283	63	346	10	3	13
fehlende Angaben	245	51	296	106	29	135	4	1	5	207	49	256	10	10	20

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injektion im Leben*																
ja	10.3	9.9	10.2	68.3	60.0	66.3	36.2	47.7	38.8	25.9	33.3	27.2	22.9	20.8	22.3	639
nie	89.7	90.1	89.8	31.7	40.0	33.7	63.8	52.3	61.2	74.1	66.7	72.8	77.1	79.2	77.7	2'221
N**	1'222	473	1'695	290	90	380	152	44	196	344	72	416	2'104	756	2'860	2'860
fehlende Angaben	1'079	440	1'519	195	52	247	80	30	110	146	40	186	1'617	640	2'257	2'257
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	3.7	4.7	4.0	40.8	42.9	41.3	26.8	45.5	31.1	24.3	30.1	25.4	13.8	14.7	14.1	397
nein	96.3	95.3	96.0	59.2	57.1	58.7	73.2	54.5	68.9	75.7	69.9	74.6	86.2	85.3	85.9	2'428
N**	1'212	472	1'684	267	91	358	149	44	193	345	73	418	2'068	757	2'825	2'825
fehlende Angaben	1'089	441	1'530	218	51	269	83	30	113	145	39	184	1'653	639	2'292	2'292
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	1.1	0.6	1.0	38.9	35.6	38.1	11.8	24.4	14.6	0.0	0.0	0.0	6.1	5.5	6.0	182
nein	98.9	99.4	99.0	61.1	64.4	61.9	88.2	75.6	85.4	100.0	100.0	100.0	93.9	94.5	94.0	2'871
N**	1'358	505	1'863	262	87	349	153	45	198	346	76	422	2'238	815	3'053	3'053
fehlende Angaben	943	408	1'351	223	55	278	79	29	108	144	36	180	1'483	581	2'064	2'064
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	2.7	0.0	1.8	9.4	14.3	10.3	3.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	3.4	10
nein	97.3	100.0	98.2	90.6	85.7	89.7	96.8	100.0	97.6	100.0	100.0	100.0	96.4	97.2	96.6	283
N**	37	18	55	64	14	78	31	11	42	83	22	105	221	72	293	293
fehlende Angaben	5	3	8	25	15	40	5	4	9	1	0	1	38	23	61	61
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	5.7	10.0	6.3	3.4	11.8	5.3	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	4.5	10.2	5.7	15
15-16	9.4	20.0	11.1	6.8	14.7	8.6	13.6	0.0	9.4	25.0	50.0	30.0	9.4	15.3	10.7	28
17-18	26.4	30.0	27.0	23.1	20.6	22.5	27.3	40.0	31.3	25.0	0.0	20.0	24.3	25.4	24.5	64
19-20	13.2	20.0	14.3	17.9	23.5	19.2	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	14.9	18.6	15.7	41
21-25	26.4	20.0	25.4	28.2	17.6	25.8	31.8	30.0	31.3	37.5	0.0	30.0	28.2	20.3	26.4	69
26-30	9.4	0.0	7.9	14.5	11.8	13.9	0.0	10.0	3.1	12.5	0.0	10.0	11.9	8.5	11.1	29
30-39	5.7	0.0	4.8	4.3	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	50.0	10.0	5.0	1.7	4.2	11
ab 40	3.8	0.0	3.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.5	4
N**	53	10	63	117	34	151	22	10	32	8	2	10	202	59	261	261
fehlende Angaben	73	37	110	81	20	101	33	11	44	81	22	103	280	98	378	378

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		27.8	33.3	40.9	41.7	35.0	0.0	23.6	29.4	11.1
Cocktail	0.6		6.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Heroin	2.8	44.4	2.8	15.8	0.0	50.0	0.0	2.2	0.0	22.2
Methadon	1.5	27.8	28.4	6.4	0.0	35.0	0.0	0.3	0.0	0.0
andere Opiate	0.2	0.0	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Kokain	6.9	44.4	43.0	0.5	25.0	20.0	0.0	8.8	0.0	11.1
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Amphetamine	0.6	0.0	2.5	3.9	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.7	5.6	5.2	10.3	25.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.2	27.8	15.2	5.9	0.0	10.0	0.0	0.8	0.0	11.1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.0	0.0	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	5.6	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	5.6	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Cannabis	9.2	44.4	40.2	37.9	41.7	20.0	0.0		11.8	11.1
Tabak	27.6	38.9	38.6	32.0	41.7	35.0	0.0	26.9		11.1
andere Substanz	0.6	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
Essstörungen	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	59.7	11.1	17.1	20.2	8.3	20.0	0.0	52.2	70.6	44.4
N**	1'267	18	363	203	12	20	0	364	17	9
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'034</i>	<i>2</i>	<i>102</i>	<i>29</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>126</i>	<i>31</i>	<i>1</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		0.0	31.0	47.5	100.0	23.1	0.0	25.0	8.3	0.0
Cocktail	0.0		5.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	1.7	0.0	4.0	16.9	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
Methadon	2.1	14.3	18.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain	3.9	14.3	33.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.8	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	2.0	3.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.4	42.9	2.0	18.6	100.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.8	28.6	6.0	16.9	0.0	7.7	0.0	10.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	8.7	0.0	26.0	8.5	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	10.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.4	0.0	3.0	3.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	7.0	5.1	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Cannabis	7.0	28.6	29.0	47.5	0.0	23.1	0.0		8.3	0.0
Tabak	27.3	0.0	34.0	33.9	0.0	46.2	0.0	38.8		10.0
andere Substanz	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	3.3	28.6	5.0	1.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
anderes suchtägliches Problem	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.6	28.6	20.0	11.9	0.0	38.5	0.0	41.3	83.3	80.0
N**	483	7	100	59	1	13	0	80	12	10
fehlende Angaben	430	2	33	15	2	1	0	32	29	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		20.0	32.8	42.4	46.2	30.3	0.0	23.9	20.7	5.3
Cocktail	0.4		5.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Heroin	2.5	32.0	3.0	16.0	0.0	33.3	0.0	2.3	0.0	10.5
Methadon	1.7	24.0	26.1	7.3	0.0	21.2	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Opiate	0.3	0.0	2.6	0.4	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain	6.1	36.0	40.8	0.4	23.1	18.2	0.0	9.7	0.0	5.3
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.7	0.8	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	12.0	2.4	7.3	7.7	3.0	0.0	3.2	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.7	12.0	5.4	11.8	23.1	3.0	0.0	5.6	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Benzodiazepine	4.7	20.0	17.5	6.5	0.0	9.1	0.0	1.1	0.0	10.5
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.1	0.0	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.3	4.0	4.8	2.3	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	4.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Cannabis	8.6	40.0	37.8	40.1	38.5	21.2	0.0		10.3	5.3
Tabak	27.5	28.0	37.6	32.4	38.5	39.4	0.0	29.1		10.5
andere Substanz	0.5	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Essstörungen	0.9	8.0	1.1	0.8	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	59.1	16.0	17.7	18.3	7.7	27.3	0.0	50.2	75.9	63.2
N**	1'750	25	463	262	13	33	0	444	29	19
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'464</i>	<i>4</i>	<i>135</i>	<i>44</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>158</i>	<i>60</i>	<i>2</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	7.7	0.0	12.5
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	12.5
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.6	0.0	0.0
Tabak	12.8	0.0	37.5
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		0.0
anderes suchtähnliches Problem	2.6	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	74.4	0.0	50.0
N**	39	0	8
<i>fehlende Angaben</i>	25	2	17

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Frauen

Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	14.3	13.6	10.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0
Tabak	0.0	4.5	10.0
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	14.3		20.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	85.7	81.8	60.0
N**	7	22	10
<i>fehlende Angaben</i>	4	15	12

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2006), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	8.7	13.6	11.1
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	5.6
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.2	0.0	0.0
Tabak	10.9	4.5	22.2
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	2.2		11.1
anderes suchtähnliches Problem	2.2	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	76.1	81.8	55.6
N**	46	22	18
<i>fehlende Angaben</i>	29	17	29

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	11.2	9.4	10.7	13.0	22.2	15.2	10.4	8.3	9.9	15.4	20.4	16.3	12.3	12.2	12.3	310
1-mal pro Monat oder weniger	3.4	3.7	3.5	15.5	15.9	15.6	13.6	11.1	13.0	14.5	24.1	16.3	7.2	8.2	7.5	189
2-4-mal pro Monat	6.1	5.8	6.0	20.3	28.6	22.2	20.0	33.3	23.0	41.2	37.0	40.4	13.7	12.8	13.5	340
2-3-mal pro Woche	18.2	18.9	18.4	21.3	15.9	20.0	34.4	25.0	32.3	19.3	14.8	18.4	19.6	18.6	19.4	489
4-mal oder mehr pro Woche	61.0	62.2	61.3	30.0	17.5	27.0	21.6	22.2	21.7	9.6	3.7	8.5	47.2	48.1	47.4	1'199
N**	1'239	481	1'720	207	63	270	125	36	161	228	54	282	1'856	671	2'527	2'527
<i>fehlende Angaben</i>	1'062	432	1'494	278	79	357	107	38	145	262	58	320	1'865	725	2'590	2'590
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.2	8.7	7.6	43.9	66.7	48.7	41.8	32.1	39.7	50.3	59.5	52.0	19.6	20.9	19.9	395
3 oder 4	18.2	21.7	19.2	37.4	14.3	32.5	35.7	32.1	34.9	31.7	29.7	31.4	23.3	21.7	22.8	453
5 oder 6	21.9	21.2	21.7	10.3	14.3	11.2	12.2	28.6	15.9	9.6	8.1	9.3	18.2	19.8	18.6	369
7 bis 9	20.6	23.0	21.3	3.9	2.4	3.6	6.1	7.1	6.3	5.4	0.0	4.4	15.6	17.9	16.2	321
10 oder mehr	32.1	25.5	30.3	4.5	2.4	4.1	4.1	0.0	3.2	3.0	2.7	2.9	23.4	19.8	22.4	445
N**	1'005	392	1'397	155	42	197	98	28	126	167	37	204	1'462	521	1'983	1'983
<i>fehlende Angaben</i>	1'296	521	1'817	330	100	430	134	46	180	323	75	398	2'259	875	3'134	3'134
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	12.9	15.2	13.5	43.5	54.0	46.0	39.0	37.0	38.6	53.7	72.7	57.3	24.3	27.6	25.2	519
weniger als 1-mal pro Monat	10.5	11.1	10.6	16.8	22.0	18.0	20.0	22.2	20.5	22.3	13.6	20.7	13.4	12.8	13.2	273
1-mal pro Monat	11.0	10.8	10.9	13.0	4.0	10.9	14.0	22.2	15.7	12.2	11.4	12.1	11.5	10.8	11.3	234
1-mal pro Woche	23.5	21.1	22.8	19.9	16.0	19.0	22.0	7.4	18.9	9.0	2.3	7.8	20.7	17.3	19.8	409
fast jeden Tag	42.2	41.9	42.1	6.8	4.0	6.2	5.0	11.1	6.3	2.7	0.0	2.2	30.1	31.5	30.4	628
N**	1'031	389	1'420	161	50	211	100	27	127	188	44	232	1'524	539	2'063	2'063
<i>fehlende Angaben</i>	1'270	524	1'794	324	92	416	132	47	179	302	68	370	2'197	857	3'054	3'054

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	30.0	40.8	33.2	5.2	4.8	5.1	13.4	12.5	13.2	21.2	13.5	19.8	22.9	29.8	24.8	450
1 Tag pro Woche oder weniger	1.5	0.7	1.3	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.1	5.8	3.6	1.5	1.2	1.4	26
2-3 Tage pro Woche	1.5	0.3	1.2	1.0	1.6	1.2	2.1	0.0	1.6	3.5	1.9	3.2	1.8	0.8	1.5	28
4-6 Tage pro Woche	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	1.8	1.0	1.0	1.0	18
einmal täglich	1.5	0.3	1.2	1.0	4.8	2.0	2.1	6.3	3.1	2.7	3.8	2.9	1.6	1.6	1.6	29
mehrmals täglich	64.1	56.5	61.8	91.7	88.7	90.9	82.5	81.3	82.2	67.7	73.1	68.7	71.2	65.7	69.6	1'264
N**	710	299	1'009	192	62	254	97	32	129	226	52	278	1'308	507	1'815	1'815
fehlende Angaben	1'591	614	2'205	293	80	373	135	42	177	264	60	324	2'413	889	3'302	3'302
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	14.4	15.9	14.7	12.4	13.0	12.6	24.3	23.8	24.2	45.0	54.1	46.9	19.9	22.3	20.5	231
11 bis 20	33.4	37.2	34.4	40.0	47.8	41.9	43.2	66.7	48.4	47.1	35.1	44.6	38.6	40.9	39.2	441
21 bis 30	33.2	27.6	31.8	31.0	23.9	29.3	24.3	9.5	21.1	5.7	5.4	5.6	27.2	23.0	26.1	294
31 und mehr	19.1	19.3	19.1	16.6	15.2	16.2	8.1	0.0	6.3	2.1	5.4	2.8	14.3	13.7	14.1	159
N**	425	145	570	145	46	191	74	21	95	140	37	177	834	291	1'125	1'125
fehlende Angaben	72	32	104	37	13	50	10	7	17	38	8	46	175	65	240	240

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	39.2	60.0	71.4	82.5	80.0	37.5	0.0	41.2	60.0	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.5	0.0	2.3	4.4	0.0	6.3	0.0	11.0	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	23.1	20.0	9.9	4.4	0.0	37.5	0.0	24.2	20.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	2.5	10.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.1	10.0	13.2	8.8	20.0	12.5	100.0	20.9	20.0	0.0
anderes	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'147	10	304	137	5	16	1	182	5	4
<i>fehlende Angaben</i>	1154	10	161	95	12	8	0	308	43	6

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	40.4	50.0	81.7	65.8	0.0	70.0	0.0	50.0	70.0	80.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	13.9	0.0	1.4	2.6	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	33.9	0.0	9.9	13.2	0.0	20.0	0.0	7.1	0.0	20.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	10.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	10.4	50.0	5.6	18.4	0.0	10.0	0.0	21.4	20.0	0.0
anderes	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
N**	431	2	71	38	0	10	0	28	10	5
<i>fehlende Angaben</i>	482	7	62	36	3	4	0	84	31	6

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2006), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	39.5	58.3	73.3	78.9	80.0	50.0	0.0	42.4	66.7	88.9
zeitlich begrenzte Abstinenz	18.7	0.0	2.1	4.0	0.0	3.8	0.0	11.0	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	26.0	16.7	9.9	6.3	0.0	30.8	0.0	21.9	6.7	11.1
keine Beschränkung beabsichtigt	2.2	8.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.1	16.7	11.7	10.9	20.0	11.5	100.0	21.0	20.0	0.0
anderes	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.5	0.0	0.0
N**	1'578	12	375	175	5	26	1	210	15	9
<i>fehlende Angaben</i>	1636	17	223	131	15	12	0	392	74	12

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer			70.0			75.6			72.4			81.8			22.3			61.0	2'449
Frauen			30.0			22.1			27.6			17.4			77.7			37.4	1'503
Geschlecht nicht bekannt			0.0			2.3			0.0			0.8			0.0			1.6	63
N**	1'341	575	1'916	232	68	307	110	42	152	315	67	385	157	546	703	2'449	1'503	4'015	4'015
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.6	2.7	2.7	0.8	1.2	0.6	0.8	0.6	25
15-19	1.3	0.7	1.1	1.3	11.9	3.7	8.2	16.7	10.5	53.8	63.1	55.4	12.8	3.9	5.9	9.7	6.4	8.5	327
20-24	3.7	2.5	3.3	11.0	28.4	14.9	25.5	31.0	27.0	20.2	12.3	18.8	4.7	4.1	4.2	7.9	6.8	7.5	290
25-29	7.5	3.7	6.4	19.7	14.9	18.6	11.8	23.8	15.1	10.3	6.2	9.5	4.7	6.0	5.7	9.3	6.4	8.2	317
30-34	10.4	8.2	9.7	21.1	16.4	20.0	17.3	7.1	14.5	6.4	6.2	6.4	4.7	6.6	6.2	10.8	8.0	9.7	376
35-39	13.0	11.4	12.5	29.8	16.4	26.8	20.0	16.7	19.1	3.5	4.6	3.7	14.8	13.5	13.7	13.8	11.7	13.0	502
40-44	15.3	16.7	15.7	11.8	9.0	11.2	11.8	4.8	9.9	2.2	3.1	2.4	6.0	15.4	13.3	12.9	14.6	13.5	523
45-49	15.5	18.3	16.3	3.9	3.0	3.7	3.6	0.0	2.6	0.6	0.0	0.5	15.4	17.2	16.8	11.6	14.8	12.8	494
50-54	13.3	14.6	13.7	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.3	0.0	0.3	10.7	14.0	13.3	9.2	12.1	10.3	397
55-59	9.1	10.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0	6.3	6.0	7.6	6.6	254
60-64	6.0	6.6	6.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	4.1	4.1	5.0	4.4	171
65-69	3.2	4.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	6.0	2.9	3.6	2.4	3.5	2.8	107
70 -74	1.2	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.5	3.2	1.3	1.3	1.3	50
75 und mehr	0.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.4	2.4	0.6	1.0	0.8	29
N**	1'327	563	1'890	228	67	295	110	42	152	312	65	377	149	513	662	2'413	1'449	3'862	3'862
fehlende Angaben	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	153
Alter																			
Mittelwert	44.6	46.9	45.3	33.7	29.3	32.7	31.1	26.5	29.8	22.0	20.5	21.8	43.9	44.4	44.3	39.6	42.6	40.7	
Standardabweichung	12.1	11.6	12.0	7.2	8.1	7.7	8.4	7.4	8.4	7.4	7.0	7.3	18.6	13.4	14.7	14.1	14.1	14.2	
1. Quartil	36.0	39.1	36.9	27.7	21.7	26.3	23.8	20.8	22.6	17.2	16.1	17.0	30.8	36.0	35.3	28.6	32.6	30.1	
Medianwert	44.6	46.7	45.3	34.1	29.3	33.3	31.1	25.9	28.0	18.7	17.4	18.5	44.9	44.8	44.9	39.1	43.6	41.0	
3. Quartil	52.9	54.6	53.5	38.1	37.2	37.9	37.5	32.3	36.4	24.1	21.3	24.0	54.3	52.3	52.6	49.3	52.2	50.4	
N**	1'327	563	1'890	228	67	295	110	42	152	312	65	377	149	513	662	2'413	1'449	3'862	
fehlende Angaben	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T24 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	38.1	27.2	34.8	74.1	67.2	72.6	71.0	78.6	73.2	93.0	92.3	93.0	38.8	21.5	25.2	51.4	33.7	45.0	1'686
verheiratet	35.5	28.9	33.5	10.5	13.1	10.8	18.7	4.8	14.8	4.3	3.1	4.1	47.0	59.0	56.5	28.2	37.8	31.6	1'182
getrennt	5.5	7.2	6.0	3.6	1.6	3.8	1.9	4.8	2.7	0.3	1.5	0.5	4.5	4.1	4.1	4.6	5.1	5.0	186
geschieden	19.1	30.8	22.5	10.0	13.1	10.4	8.4	9.5	8.7	2.3	3.1	2.4	8.2	14.2	12.9	14.3	19.8	16.1	604
verwitwet	1.7	5.8	3.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.8	1.2	3.0	1.9	70
reg. Partnerschaft	0.2	0.2	0.2	1.4	4.9	2.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	15
N**	1'258	530	1'788	220	61	288	107	42	149	302	65	370	134	493	627	2'300	1'381	3'743	3'743
fehlende Angaben	83	45	128	12	7	19	3	0	3	13	2	15	23	53	76	149	122	272	272
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	14.6	20.2	16.3	1.0	0.0	0.8	1.0	8.3	3.0	0.3	1.7	0.6	14.8	12.6	13.1	9.7	13.1	11.0	389
Umland der Grossstadtzentren	15.2	16.4	15.5	1.5	3.3	1.9	2.1	0.0	1.5	2.7	3.4	2.9	14.8	12.8	13.3	11.3	13.2	12.0	425
Mittelzentren	15.4	15.2	15.4	29.4	45.0	33.0	27.8	30.6	28.6	25.1	25.4	25.1	12.0	18.8	17.3	18.7	19.9	19.1	678
Kleinzentren	29.8	25.9	28.6	44.6	30.0	41.3	38.1	38.9	38.3	34.4	35.6	34.6	32.4	25.7	27.1	33.9	28.2	31.7	1'123
rural	25.0	22.2	24.2	23.5	21.7	23.1	30.9	22.2	28.6	37.5	33.9	36.9	26.1	30.1	29.2	26.5	25.6	26.2	926
N**	1'188	499	1'687	204	60	264	97	36	133	291	59	350	142	499	641	2'197	1'344	3'541	3'541
fehlende Angaben	153	76	229	28	8	43	13	6	19	24	8	35	15	47	62	252	159	474	474

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T25 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.8	37.1	39.0	43.3	22.0	37.9	30.8	27.0	29.7	14.9	6.3	13.5	12.0	11.6	11.7	34.4	23.2	30.2	855
mit Eltern/Elternteil	6.6	2.8	5.5	11.7	8.0	11.0	19.8	18.9	19.5	62.9	60.3	62.5	21.7	5.7	9.0	18.2	9.6	14.9	421
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	2.4	13.2	5.5	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.6	7.6	14.4	13.0	2.0	11.6	5.5	156
mit PartnerIn (ohne Kinder)	25.2	26.7	25.6	17.0	36.0	20.7	24.2	18.9	22.7	6.5	9.5	7.0	25.0	22.9	23.4	20.3	25.5	22.1	625
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.3	13.5	17.7	9.4	14.0	10.1	9.9	0.0	7.0	2.5	6.3	3.2	28.3	42.5	39.6	16.0	22.8	18.5	522
mit anderen Verw./Angeh.	1.9	0.8	1.6	1.8	8.0	3.1	4.4	5.4	4.7	4.7	4.8	4.7	1.1	1.1	1.1	2.5	1.7	2.2	63
mit FreundInnen (WG)	1.1	2.8	1.6	3.5	2.0	3.1	2.2	16.2	6.3	2.2	0.0	1.8	2.2	1.1	1.3	1.6	2.4	1.9	55
anderes	3.6	3.1	3.5	13.5	8.0	13.2	8.8	13.5	10.2	5.8	11.1	6.7	2.2	0.6	0.9	5.0	3.2	4.6	131
N**	884	356	1'240	171	50	227	91	37	128	275	63	341	92	353	445	1'742	1'029	2'828	2'828
fehlende Angaben	457	219	676	61	18	80	19	5	24	40	4	44	65	193	258	707	474	1'187	1'187
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	94.5	95.5	94.8	82.9	80.8	81.6	92.2	83.8	89.8	94.4	89.7	93.6	92.7	97.7	96.6	93.1	94.9	93.6	2'739
instabile Wohnsituation	3.6	3.1	3.4	7.6	13.5	8.8	6.7	5.4	6.3	1.9	0.0	1.5	6.4	2.1	3.0	4.2	3.1	3.7	109
Institution	1.9	1.3	1.8	9.4	5.8	9.6	1.1	10.8	3.9	3.7	10.3	4.9	0.9	0.3	0.4	2.7	1.9	2.7	79
N**	925	381	1'306	170	52	228	90	37	127	267	58	328	109	388	497	1'791	1'080	2'927	2'927
fehlende Angaben	416	194	610	62	16	79	20	5	25	48	9	57	48	158	206	658	423	1'088	1'088
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	27.3	32.9	28.9	48.5	20.0	41.3	23.0	40.0	27.2	63.9	40.6	59.8	13.3	15.7	15.2	33.0	24.4	29.8	665
zeitweilige Beziehung(en)	4.9	5.7	5.2	10.4	8.0	9.5	6.6	5.0	6.2	7.7	15.6	9.0	8.0	2.2	3.4	6.6	5.4	6.3	140
festе Beziehung, getrennt lebend	13.0	13.4	13.1	7.5	12.0	9.5	19.7	20.0	19.8	11.0	12.5	11.6	10.7	8.3	8.8	12.3	11.1	11.9	265
festе Beziehung, zus. lebend	54.8	48.0	52.8	33.6	60.0	39.7	50.8	35.0	46.9	17.4	31.3	19.6	68.0	73.8	72.7	48.1	59.0	52.0	1'158
N**	730	298	1'028	134	50	189	61	20	81	155	32	189	75	313	388	1'334	847	2'228	2'228
fehlende Angaben	611	277	888	98	18	118	49	22	71	160	35	196	82	233	315	1'115	656	1'787	1'787

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T26 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	4.1	6.9	4.9	7.4	5.8	7.0	2.5	3.4	2.7	9.6	22.2	11.9	4.2	5.9	5.5	5.5	7.2	6.1	147
obligatorische Schule	14.7	21.8	16.7	28.2	50.0	33.5	29.6	34.5	30.9	58.2	57.4	58.1	23.6	18.1	19.2	24.7	25.3	24.9	599
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	1.1	4.0	1.9	1.8	5.8	2.8	3.7	6.9	4.5	1.6	5.6	2.3	1.4	3.0	2.6	1.8	3.9	2.5	61
Berufslehre, Berufsschule	62.2	50.2	58.9	56.4	36.5	51.6	55.6	55.2	55.5	25.3	9.3	22.4	43.1	54.2	51.9	54.2	47.7	51.9	1'248
Maturität-, Diplommittelschule	2.7	6.3	3.7	2.5	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	3.2	5.6	3.6	4.2	6.6	6.1	2.5	6.7	4.0	96
Lehrerseminar	0.9	2.0	1.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	4.1	0.6	2.6	1.3	31
höhere Fach-/Berufsausbildung	7.7	4.6	6.8	1.2	0.0	0.9	6.2	0.0	4.5	1.6	0.0	1.3	8.3	3.7	4.7	5.5	3.4	4.8	115
höhere Fachschule	1.1	0.7	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4.2	0.4	1.2	1.1	0.4	0.8	20
Fachhochschule	1.7	1.3	1.6	0.6	0.0	0.5	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.1	1.5	1.3	0.8	1.1	27
Universität, Hochschule	3.8	2.3	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	3.2	2.8	2.1	2.5	61
N**	784	303	1'087	163	52	215	81	29	110	249	54	303	72	271	343	1'554	851	2'405	2'405
fehlende Angaben	557	272	829	69	16	92	29	13	42	66	13	82	85	275	360	895	652	1'610	1'610
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	57.5	37.2	51.7	36.8	26.9	34.1	56.3	37.5	50.9	31.9	16.7	29.0	61.4	58.0	58.8	52.2	44.2	49.1	1'434
Ersparnisse	0.3	0.8	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	2.6	0.3	0.8	0.7	0.5	0.6	17
Rente (AHV/IV u.a.)	17.4	26.8	20.1	20.9	19.2	21.2	11.3	18.8	13.4	3.9	3.3	3.8	15.8	8.9	10.5	15.7	17.8	16.7	488
Sozialhilfe/Fürsorge	13.1	11.2	12.5	33.1	28.8	31.8	15.0	25.0	17.9	4.7	10.0	5.7	3.5	3.5	3.5	12.6	8.7	11.2	326
Arbeitslosenversicherung	8.1	6.6	7.7	6.7	11.5	7.8	10.0	6.3	8.9	5.8	6.7	6.0	0.9	1.3	1.2	7.1	4.6	6.2	181
durch PartnerIn	1.1	14.3	4.9	0.6	3.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	1.6	0.9	21.8	16.9	0.9	15.0	6.1	179
durch Eltern/Angehörige	2.1	2.3	2.1	1.2	7.7	2.8	3.8	12.5	6.3	50.6	58.3	52.1	14.0	5.7	7.6	10.0	8.2	9.3	271
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	2.5	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	4
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
anderes	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	20
N**	972	392	1'364	163	52	217	80	32	112	257	60	317	114	371	485	1'829	1'078	2'923	2'923
fehlende Angaben	369	183	552	69	16	90	30	10	40	58	7	68	43	175	218	620	425	1'092	1'092
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	54.2	23.6	45.6	35.2	19.6	31.3	56.6	20.6	46.2	27.7	13.1	24.8	63.4	35.5	41.9	48.7	27.7	40.8	1'095
Teilzeitarbeit	4.8	20.0	9.1	4.4	6.5	4.8	3.6	17.6	7.7	1.9	8.2	3.0	3.2	33.2	26.4	3.7	24.2	10.9	292
Gelegenheitsarbeit	2.3	2.1	2.3	0.6	6.5	1.9	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.8	0.0	0.3	0.2	1.8	1.3	1.7	45
in Ausbildung	2.3	2.1	2.3	0.6	4.3	1.4	3.6	20.6	8.5	47.6	57.4	49.2	14.0	6.1	7.9	10.4	8.5	9.5	256
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	20.4	35.2	24.6	23.9	26.1	25.0	14.5	17.6	15.4	4.5	6.6	4.8	15.1	18.5	17.7	18.5	25.7	21.8	584
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	13.2	14.0	13.4	25.8	32.6	27.4	19.3	20.6	19.7	12.4	6.6	11.5	2.2	1.9	2.0	13.1	9.0	11.6	311
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	5
anderes	2.6	2.7	2.6	9.4	4.3	8.2	1.2	2.9	1.7	4.1	8.2	4.8	2.2	4.2	3.7	3.6	3.5	3.5	94
N**	858	335	1'193	159	46	208	83	34	117	267	61	331	93	313	406	1'689	943	2'682	2'682
fehlende Angaben	483	240	723	73	22	99	27	8	35	48	6	54	64	233	297	760	560	1'333	1'333

¹Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T27 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	30.6	44.9	34.7	59.5	59.1	59.5	31.4	47.4	35.7	19.5	12.5	18.5	17.3	20.3	19.7	31.7	35.4	33.7	562
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.2	1.7	1.3	0.9	0.0	0.6	3.9	10.5	5.7	28.3	31.3	28.5	1.9	2.9	2.7	4.4	3.0	3.9	65
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.4	4.3	3.7	7.8	6.8	7.4	5.9	5.3	5.7	1.8	0.0	1.5	0.0	3.9	3.1	3.7	4.1	3.7	62
angelernete(r) ArbeiterIn	5.1	4.3	4.9	5.2	6.8	5.5	7.8	5.3	7.1	1.8	6.3	2.3	3.8	4.3	4.2	5.3	4.2	4.8	80
gelernte(r) ArbeiterIn	13.5	6.4	11.5	12.9	11.4	12.3	7.8	5.3	7.1	6.2	6.3	6.2	5.8	8.7	8.1	12.0	7.6	10.2	170
VorarbeiterIn	2.1	0.4	1.6	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.8	2.2	0.3	1.5	25
einfache(r) Angestellte(r)	14.7	23.5	17.2	9.5	11.4	10.4	17.6	5.3	14.3	11.5	0.0	10.0	13.5	25.6	23.2	13.9	22.2	17.1	285
mittl. Angestellte(r)/Kader	10.9	5.6	9.4	0.9	4.5	1.8	5.9	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	17.3	12.1	13.1	8.5	8.3	8.2	137
leit. Angestellte(r)/Kader	5.0	1.7	4.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	13.5	3.4	5.4	3.9	2.2	3.3	55
selbständig	11.8	5.6	10.0	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	2.7	0.0	2.3	23.1	13.5	15.4	9.8	8.0	8.9	149
SchülerIn/StudentIn	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	21.1	7.1	26.5	37.5	28.5	0.0	2.4	1.9	3.6	3.4	3.5	58
andere Stellung	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.6	2.0	0.0	1.4	0.9	6.3	1.5	1.9	2.4	2.3	1.1	1.4	1.1	19
N**	585	234	819	116	44	163	51	19	70	113	16	130	52	207	259	1'039	591	1'667	1'667
fehlende Angaben	756	341	1'097	116	24	144	59	23	82	202	51	255	105	339	444	1'410	912	2'348	2'348
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	19.6	30.4	22.3	20.9	39.1	25.6	31.0	0.0	23.7	41.0	60.0	43.5	0.0	17.4	14.5	23.4	29.6	25.1	222
weniger als 1000 Fr.	3.8	4.3	3.9	10.4	0.0	7.8	10.3	22.2	13.2	28.0	20.0	27.0	11.1	4.3	5.5	8.6	5.3	7.7	68
1001 bis 2000 Fr.	7.9	8.7	8.1	23.9	17.4	22.2	3.4	44.4	13.2	11.0	6.7	10.4	11.1	19.6	18.2	9.4	12.8	10.3	91
2001 bis 3000 Fr.	12.3	25.2	15.5	16.4	30.4	20.0	17.2	11.1	15.8	2.0	6.7	2.6	0.0	21.7	18.2	10.8	23.5	14.3	126
3001 bis 4000 Fr.	11.1	13.0	11.6	14.9	13.0	14.4	20.7	22.2	21.1	10.0	0.0	8.7	11.1	15.2	14.5	12.8	13.2	12.9	114
4001 bis 5000 Fr.	18.1	7.8	15.5	7.5	0.0	5.6	10.3	0.0	7.9	6.0	6.7	6.1	22.2	8.7	10.9	16.1	7.4	13.7	121
5001 bis 6000 Fr.	14.0	6.1	12.0	3.0	0.0	2.2	6.9	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	22.2	6.5	9.1	9.4	4.5	8.0	71
6001 bis 8000 Fr.	10.2	2.6	8.3	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	11.1	6.5	7.3	7.3	2.9	6.1	54
8001 bis 10 000 Fr.	2.3	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	10
10001 bis 15 000 Fr.	0.3	0.9	0.4	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	1.8	0.5	0.4	0.5	4
über 15 000 Fr.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	2
N**	342	115	457	67	23	90	29	9	38	100	15	115	9	46	55	640	243	883	883
fehlende Angaben	999	460	1'459	165	45	217	81	33	114	215	52	270	148	500	648	1'809	1'260	3'132	3'132

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
planm. Beendigung ohne Übertritt	42.0	40.0	41.4	22.4	17.6	21.5	29.4	28.6	29.1	62.6	64.2	62.9	65.4	62.1	62.9	43.8	48.9	45.5	1'806
planm. Beendigung mit Übertr	5.3	8.6	6.3	14.9	23.5	17.8	10.1	16.7	11.9	2.6	6.0	3.1	1.9	3.5	3.1	6.0	7.3	6.8	271
Wohnortwechsel	4.1	2.3	3.6	9.6	10.3	9.6	6.4	7.1	6.6	2.9	0.0	2.3	0.0	1.5	1.1	4.1	2.4	3.5	137
Hospitalisierung	1.1	1.6	1.2	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9	35
Inhaftierung	0.2	0.0	0.1	5.3	1.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	18
Kontaktverlust	27.7	26.4	27.3	30.3	27.9	29.0	32.1	35.7	33.1	17.9	17.9	17.8	19.9	19.7	19.7	26.3	23.7	25.2	1'001
expliziter Abbruch	14.2	16.1	14.7	11.8	14.7	12.2	14.7	9.5	13.2	9.9	10.4	10.2	7.1	6.4	6.6	12.6	11.4	12.0	477
Tod	2.0	1.4	1.9	1.8	1.5	2.0	2.8	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	2.0	0.9	1.7	66
anderer Grund	3.5	3.6	3.5	3.1	2.9	3.0	2.8	2.4	2.6	2.6	1.5	2.3	5.8	6.3	6.1	3.6	4.4	3.9	154
N**	1'327	560	1'887	228	68	303	109	42	151	313	67	383	156	544	700	2'422	1'480	3'965	3'965
fehlende Angaben	14	15	29	4	0	4	1	0	1	2	0	2	1	2	3	27	23	50	50

T28b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem1 sowie bei Angehörigen (2006)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***																			
stationäre Therapie	40.7	43.6	41.9	36.7	23.1	29.8	33.3	42.9	37.5	12.5	0.0	9.1	50.0	7.7	13.3	37.8	27.9	32.7	71
ambulante Behandlung	50.0	41.0	46.2	46.7	53.8	53.2	44.4	57.1	50.0	75.0	100.0	81.8	50.0	53.8	53.3	48.7	53.5	52.5	114
Aussenwohngruppe	3.7	5.1	4.3	3.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.3	5
andere Stelle/Institution	5.6	10.3	7.5	13.3	23.1	14.9	22.2	0.0	12.5	12.5	0.0	9.1	0.0	38.5	33.3	10.9	16.3	12.4	27
N**	54	39	93	30	13	47	9	7	16	8	3	11	2	13	15	119	86	217	217
fehlende Angaben	16	9	25	4	3	7	2	0	2	0	1	1	1	6	7	27	22	54	54

T28c Todesursachen nach Hauptproblem1 sowie bei Angehörigen (2006)

Todesursache****																			
Suizid	17.6	28.6	20.8	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	30.0	23.8	10
Unfall	0.0	14.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.8	2
Krankheit	58.8	42.9	54.2	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	47.6	20
Überdosis bzw. Vergiftung	17.6	0.0	12.5	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	16.7	7
andere Todesursache	5.9	14.3	8.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0	7.1	3
N**	17	7	24	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	32	10	42	42
fehlende Angaben	10	1	11	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	16	3	24	24

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T29 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
Dauer der Behandlung (%)*																			
1 Woche oder weniger	7.4	10.3	8.3	6.0	9.0	6.5	4.5	7.1	5.3	5.1	6.0	5.5	24.8	16.8	18.6	8.8	12.6	10.2	374
> 1 Woche bis 1 Monat	4.9	7.9	5.8	3.9	3.0	3.6	7.3	14.3	9.2	10.5	14.9	11.2	11.5	6.4	7.5	6.2	7.8	6.8	250
> 1 Monat bis 2 Monate	6.0	7.3	6.4	6.0	6.0	6.2	1.8	7.1	3.3	11.5	11.9	11.5	8.3	5.5	6.1	6.8	6.7	6.8	248
> 2 bis 3 Monate	5.6	5.4	5.5	6.0	1.5	4.9	5.5	9.5	6.6	4.8	9.0	5.5	4.5	4.0	4.1	5.5	5.6	5.5	202
> 3 bis 6 Monate	13.2	14.3	13.6	11.6	6.0	10.1	14.5	9.5	13.2	14.3	10.4	13.8	11.5	16.5	15.4	13.2	14.5	13.7	500
> 6 Monate bis 1 Jahr	25.8	26.2	25.9	25.4	35.8	28.1	30.9	26.2	29.6	32.2	38.8	33.1	24.2	32.4	30.6	26.8	29.3	27.7	1'014
> 1 Jahr bis 2 Jahre	20.8	17.1	19.7	23.3	20.9	22.9	21.8	11.9	19.1	16.2	7.5	14.8	9.6	13.6	12.7	19.3	15.1	17.7	648
> 2 bis 3 Jahre	9.9	6.3	8.8	9.5	9.0	9.2	12.7	9.5	11.8	4.8	1.5	4.2	3.8	2.9	3.1	8.5	5.0	7.1	261
> 3 bis 5 Jahre	4.2	3.1	3.9	3.4	6.0	4.2	0.9	2.4	1.3	0.6	0.0	0.5	1.3	0.7	0.9	3.0	2.0	2.7	98
> 5 bis 10 Jahre	1.7	1.6	1.7	4.7	3.0	4.2	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.0	1.5	1.3	1.4	53
mehr als 10 Jahre	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	10
N**	1'339	572	1'911	232	67	306	110	42	152	314	67	384	157	546	703	2'263	1'382	3'658	3'658
<i>fehlende Angaben</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357	357
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	58.1	48.1	55.1	63.8	62.4	63.5	48.9	44.1	47.6	35.3	24.7	33.5	27.1	33.2	31.9	51.3	40.6	47.3	
Standardabweichung	80.4	75.3	79.0	76.6	68.8	74.4	41.9	59.6	47.3	34.6	23.5	33.2	41.4	46.3	45.3	70.6	61.0	67.3	
1. Quartil	13.0	8.0	11.7	14.4	23.9	15.0	20.7	5.9	13.3	6.6	4.9	6.1	1.3	5.0	3.9	10.3	6.9	9.0	
Medianwert	35.1	27.9	33.1	42.6	39.3	42.1	37.6	26.6	35.0	27.3	18.9	26.6	13.1	24.7	23.0	31.1	26.1	28.9	
3. Quartil	74.6	58.8	69.4	83.9	78.7	82.1	64.6	54.0	63.8	48.3	37.6	45.5	32.3	41.9	39.9	65.0	49.7	58.4	
N**	1'339	572	1'911	232	67	306	110	42	152	314	67	384	157	546	703	2'263	1'382	3'658	
<i>fehlende Angaben</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	97.4	98.0	97.5	44.3	34.4	41.6	86.7	83.3	85.7	99.3	100.0	99.4	90.4	90.3	90.2	2'208
ja	2.6	2.0	2.5	55.7	65.6	58.4	13.3	16.7	14.3	0.7	0.0	0.6	9.6	9.7	9.8	239
N**	982	401	1'383	183	61	245	83	36	119	271	55	326	1'755	689	2'447	2'447
fehlende Angaben	357	174	531	48	7	61	27	6	33	41	10	54	519	225	800	800
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	1.7	4
Methadon	47.8	50.0	48.4	91.1	97.4	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	84.2	90.9	85.9	201
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.0	7
andere Substanzen	52.2	50.0	51.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	7.6	9.4	22
N**	23	8	31	101	39	141	11	6	17	2	0	2	165	66	234	234
fehlende Angaben	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
Substitution nach der Behandlung*																
nein	98.9	100.0	99.2	65.6	58.3	63.9	93.1	85.7	91.3	99.2	100.0	99.4	95.3	96.1	95.5	2'210
ja	1.1	0.0	0.8	34.4	41.7	36.1	6.9	14.3	8.7	0.8	0.0	0.6	4.7	3.9	4.5	103
N**	941	386	1'327	157	48	205	87	28	115	259	55	314	1'673	640	2'313	2'313
fehlende Angaben	398	189	587	74	20	101	23	14	37	53	10	66	601	274	934	934
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	20.0	0.0	20.0	7.4	5.0	6.8	16.7	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.3	4.0	8.7	9
Substitution	80.0	0.0	80.0	92.6	95.0	93.2	83.3	100.0	90.0	100.0	0.0	100.0	89.7	96.0	91.3	94
N**	10	0	10	54	20	74	6	4	10	2	0	2	78	25	103	103
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T31 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	83.9	81.0	83.1	72.9	62.8	70.5	72.5	65.0	70.8	87.3	86.7	87.2	82.9	79.6	82.0	1'548
ja	16.1	19.0	16.9	27.1	37.2	29.5	27.5	35.0	29.2	12.7	13.3	12.8	17.1	20.4	18.0	340
N**	820	315	1'135	140	43	183	69	20	89	181	30	211	1'388	500	1'888	1'888
fehlende Angaben	519	260	779	91	25	123	41	22	63	131	35	169	886	414	1'359	1'359
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
institutionseigene Nachsorgestelle	3.5	0.0	2.4	5.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	3.8	0.0	2.6	8
fremde Aussenwohngruppe	6.2	7.4	6.6	5.7	7.1	6.1	5.9	0.0	4.2	4.3	0.0	3.7	5.6	5.4	5.6	17
fremde Nachsorgestelle	13.3	18.5	15.0	20.0	0.0	14.3	17.6	28.6	20.8	13.0	0.0	11.1	13.1	15.1	13.7	42
Alkoholberatungsstelle	18.6	11.1	16.2	2.9	0.0	2.0	5.9	42.9	16.7	13.0	25.0	14.8	14.6	11.8	13.7	42
Drogenberatungsstelle	2.7	1.9	2.4	20.0	50.0	28.6	23.5	28.6	25.0	13.0	0.0	11.1	8.5	10.8	9.2	28
andere Beratungsstelle	17.7	3.7	13.2	20.0	28.6	22.4	17.6	0.0	12.5	21.7	25.0	22.2	18.3	9.7	15.7	48
Selbsthilfegruppe	8.0	9.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	5.2	6.5	5.6	17
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	33.6	48.1	38.3	34.3	28.6	32.7	35.3	14.3	29.2	30.4	25.0	29.6	35.7	45.2	38.6	118
N**	113	54	167	35	14	49	17	7	24	23	4	27	213	93	306	306
fehlende Angaben	19	6	25	3	2	5	2	0	2	0	0	0	25	9	34	34

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T32 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2006)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	62.1	68.7	64.0	15.2	24.4	17.3	20.3	25.0	21.4	12.0	5.0	10.9	44.0	51.8	46.1	953
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.1	0.3	0.2	6.0	8.9	6.6	5.4	12.5	7.1	0.4	0.0	0.4	1.0	1.6	1.2	24
Heroin	1.0	0.9	0.9	46.4	55.6	48.5	9.5	20.8	12.2	0.4	0.0	0.4	7.3	7.0	7.3	150
Methodon	1.0	0.9	0.9	25.8	31.1	27.0	6.8	4.2	6.1	0.4	0.0	0.4	3.8	3.7	3.8	78
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1
Kokain	2.3	1.8	2.1	14.6	35.6	19.4	52.7	58.3	54.1	4.9	0.0	4.2	7.0	6.9	7.0	144
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Amphetamine	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	12.5	4.1	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	8
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	8.3	2.0	1.3	2.5	1.5	0.6	0.5	0.6	12
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Barbiturate	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2
Benzodiazepine	1.8	3.2	2.2	11.9	26.7	15.3	4.1	4.2	4.1	0.4	0.0	0.4	3.1	6.5	4.0	83
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	1.2	0.3	2.6	6.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.8	16
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	2.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	4
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	3
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Cannabis	4.3	3.5	4.1	12.6	13.3	12.8	14.9	20.8	16.3	56.9	35.0	53.6	14.2	7.9	12.4	257
Tabak	17.3	16.1	17.0	19.2	24.4	20.4	12.2	12.5	12.2	10.7	10.0	10.6	16.3	16.7	16.4	339
andere Substanzen	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.7	1.1	0.8	16
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1.0	20
Essstörungen	0.0	1.2	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	1.0	20
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.3	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.8	0.4	0.4	0.4	8
keine	33.7	30.1	32.7	24.5	26.7	25.0	25.7	16.7	23.5	36.0	57.5	39.2	32.3	31.3	32.0	662
N**	836	342	1'178	151	45	196	74	24	98	225	40	265	1'497	569	2'066	2'066
<i>fehlende Angaben</i>	<i>503</i>	<i>233</i>	<i>736</i>	<i>80</i>	<i>23</i>	<i>110</i>	<i>36</i>	<i>18</i>	<i>54</i>	<i>87</i>	<i>25</i>	<i>115</i>	<i>777</i>	<i>345</i>	<i>1'181</i>	<i>1'181</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T33 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	58.2	46.5	55.0	28.2	22.6	26.7	35.1	28.6	34.1	66.7	76.5	68.0	53.9	42.1	50.6	623
einmal	9.9	8.8	9.6	12.9	9.7	12.1	16.2	14.3	15.9	5.7	17.6	7.4	9.4	11.3	9.8	121
zweimal	7.5	11.2	8.5	16.5	6.5	13.8	13.5	14.3	13.6	2.9	0.0	2.5	8.2	9.8	8.8	108
drei- oder viermal	11.8	13.0	12.2	12.9	19.4	14.7	10.8	0.0	9.1	10.5	5.9	9.8	12.1	14.0	12.6	155
fünfmal oder mehr	12.5	20.5	14.7	29.4	41.9	32.8	24.3	42.9	27.3	14.3	0.0	12.3	16.4	22.9	18.3	225
N**	558	215	773	85	31	116	37	7	44	105	17	122	898	328	1'232	1'232
fehlende Angaben	781	360	1'141	146	37	190	73	35	108	207	48	258	1'376	586	2'015	2'015
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	96.4	98.2	97.0	14.3	34.8	20.3	33.3	40.0	34.6	17.1	0.0	15.8	70.1	79.2	72.9	415
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.0	0.0	0.0	3.6	8.7	5.1	4.8	0.0	3.8	2.9	0.0	2.6	1.0	2.2	1.4	8
Opiate	3.2	1.8	2.7	71.4	78.3	73.4	28.6	40.0	30.8	0.0	0.0	0.0	16.6	16.3	16.5	94
Kokain und Derivate	2.3	3.7	2.7	26.8	47.8	32.9	71.4	100.0	76.9	8.6	0.0	7.9	11.8	14.0	12.5	71
Stimulantien	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	4
Medikamente	3.6	5.5	4.3	19.6	34.8	24.1	19.0	20.0	19.2	0.0	0.0	0.0	7.4	11.8	8.8	50
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1.8	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	2
Cannabis	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
Tabak	3.2	1.8	2.7	14.3	26.1	17.7	9.5	0.0	7.7	97.1	100.0	97.4	14.1	6.2	11.6	66
flüchtige Stoffe	5.0	2.8	4.3	0.0	8.7	2.5	9.5	0.0	7.7	5.7	0.0	5.3	4.3	5.6	4.7	27
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
pathologisches Spielen	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.2	7
Essstörungen	0.0	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.1	6
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	1
N**	220	109	329	56	23	79	21	5	26	35	3	38	391	178	569	569
fehlende Angaben	13	6	19	5	1	6	3	0	3	0	1	1	23	12	40	40
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	32.1	15.9	27.5	52.4	20.0	46.2	50.0	33.3	45.5	44.4	100.0	50.0	36.2	21.9	32.4	77
3-6 Tage	28.4	36.4	30.7	14.3	20.0	15.4	12.5	33.3	18.2	22.2	0.0	20.0	24.1	31.3	26.1	62
7-10 Tage	11.9	27.3	16.3	14.3	20.0	15.4	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	10.9	21.9	13.9	33
>10 Tage bis 2 Wochen	7.3	6.8	7.2	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	4.7	5.9	14
>2 bis 4 Wochen	12.8	6.8	11.1	4.8	0.0	3.8	12.5	0.0	9.1	11.1	0.0	10.0	11.5	7.8	10.5	25
>4 bis 6 Wochen	2.8	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	2.9	3.1	2.9	7
>6 bis 8 Wochen	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
>2 Monate	3.7	2.3	3.3	9.5	40.0	15.4	12.5	33.3	18.2	11.1	0.0	10.0	7.5	9.4	8.0	19
N**	109	44	153	21	5	26	8	3	11	9	1	10	174	64	238	238
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T34 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	31.1	37.4	32.8	2.7	7.7	4.0	11.8	25.0	14.3	13.4	8.3	12.8	24.8	33.7	27.1	261
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	0.7	1.2	0.8	8
2 bis 3 Tage pro Woche	2.1	1.8	2.0	1.4	0.0	1.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2	1.6	15
4 bis 6 Tage pro Woche	1.2	0.0	0.8	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.5	0.4	1.2	12
einmal täglich	1.2	1.2	1.2	2.7	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.3	4.3	1.5	1.6	1.6	15
mehrmals täglich	63.6	58.3	62.1	91.9	88.5	91.0	85.3	75.0	83.3	79.3	83.3	79.8	69.8	61.9	67.7	652
N**	428	163	591	74	26	100	34	8	42	82	12	94	711	252	963	963
fehlende Angaben	911	412	1'323	157	42	206	76	34	110	230	53	286	1'563	662	2'284	2'284
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	14.1	20.3	15.6	11.4	28.6	15.5	21.1	0.0	18.2	36.6	66.7	38.6	15.7	24.0	17.5	81
11-20 Zigaretten pro Tag	41.8	27.5	38.3	43.2	35.7	41.4	52.6	33.3	50.0	48.8	0.0	45.5	43.4	27.0	39.9	185
21-30 Zigaretten pro Tag	28.6	36.2	30.5	40.9	21.4	36.2	15.8	66.7	22.7	14.6	33.3	15.9	29.7	33.0	30.4	141
31 und mehr Zigaretten pro Tag	15.5	15.9	15.6	4.5	14.3	6.9	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	11.3	16.0	12.3	57
N**	213	69	282	44	14	58	19	3	22	41	3	44	364	100	464	464
fehlende Angaben	82	33	115	28	10	38	11	3	14	30	8	38	171	67	238	238

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T35 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2006)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	38.5	36.4	37.9	71.4	64.9	69.3	72.7	53.8	69.6	34.2	56.0	37.1	43.9	42.5	43.8	708
zeitlich begrenzte Abstinenz	14.1	14.2	14.2	3.6	2.7	3.3	4.5	7.7	5.1	7.4	12.0	8.0	11.6	11.7	11.4	185
kontrollierter Konsum	33.2	38.7	34.7	9.8	10.8	10.7	6.1	7.7	6.3	36.2	32.0	36.0	28.9	32.3	29.5	477
keine Beschränkung beabsichtigt	4.5	2.3	3.9	2.7	8.1	4.0	1.5	7.7	2.5	8.1	0.0	6.9	4.8	3.9	4.6	74
bis jetzt nicht festgelegt	8.8	8.0	8.6	10.7	13.5	11.3	12.1	23.1	13.9	13.4	0.0	11.4	9.6	8.8	9.7	157
andere	0.9	0.4	0.7	1.8	0.0	1.3	3.0	0.0	2.5	0.7	0.0	0.6	1.2	0.7	1.1	17
N**	693	261	954	112	37	150	66	13	79	149	25	175	1'170	409	1'618	1'618
fehlende Angaben	646	314	960	119	31	156	44	29	73	163	40	205	1'104	505	1'629	1'629
Prognose*																
sehr gute Prognose	10.2	12.0	10.7	7.4	8.9	7.8	5.4	10.5	6.7	11.7	26.1	13.6	10.4	13.2	11.1	188
gute Prognose	45.7	39.4	44.0	34.7	20.0	30.7	42.9	15.8	36.0	52.6	56.5	53.1	45.4	36.6	43.1	728
eher ungünstige Prognose	30.2	39.1	32.7	43.8	46.7	44.6	42.9	47.4	44.0	29.2	13.0	27.1	31.7	37.7	33.3	563
ungünstige Prognose	13.9	9.5	12.7	14.0	24.4	16.9	8.9	26.3	13.3	6.5	4.3	6.2	12.6	12.4	12.5	212
N**	748	284	1'032	121	45	166	56	19	75	154	23	177	1'234	453	1'691	1'691
fehlende Angaben	591	291	882	110	23	140	54	23	77	158	42	203	1'040	461	1'556	1'556

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein