

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2009

Statistischer Tabellenband

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@sucht-info.ch

Bearbeitung: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo,
Sucht Info Schweiz

Vertrieb: Buchhandlung Sucht Info Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
E-Mail librairie@sucht-info.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Info Schweiz

Copyright: © Sucht Info Schweiz, Lausanne 2010

Zitierhinweis: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2010). Ambulante
Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2009.
Lausanne: Sucht Info Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

EINTRITT

- T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2009)
- T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2009)
- T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2009)
- T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer
- T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer
- T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2009)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer und Frauen

- T23a Psychische Probleme im Leben (2009), Männer
- T23b Psychische Probleme im Leben (2009), Frauen
- T23c Psychische Probleme im Leben (2009), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2009)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2009)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2009)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2009)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2009)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), Sucht Info Schweiz in Lausanne und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und ersetzen damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Info Schweiz in Lausanne realisiert.

die Statistik *act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2009 beteiligten sich 80 der 216 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.7			75.8			82.1			83.0			21.4			65.7	4'878
Frauen			29.3			24.2			17.9			17.0			78.6			34.3	2'549
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'710	1'123	3'833	542	173	715	253	55	308	832	171	1'003	213	783	996	4'878	2'549	7'427	7'427
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	7.0	7.0	7.0	1.9	0.8	1.0	1.7	1.1	1.5	112
15-19	2.7	3.1	2.8	4.3	9.2	5.5	5.5	21.8	8.4	60.3	60.8	60.4	7.1	2.3	3.3	13.8	8.7	12.0	893
20-24	5.2	3.0	4.6	12.6	23.1	15.1	20.9	25.5	21.8	13.5	12.3	13.3	3.8	4.4	4.2	8.5	6.9	8.0	591
25-29	8.4	4.7	7.3	19.8	19.1	19.6	25.3	20.0	24.4	9.1	9.9	9.3	4.2	7.7	7.0	10.7	7.9	9.7	722
30-34	9.4	7.9	9.0	17.2	15.0	16.7	17.8	16.4	17.5	4.9	4.7	4.9	5.7	8.6	8.0	9.9	8.8	9.5	703
35-39	11.2	7.9	10.2	21.4	11.6	19.0	13.4	3.6	11.7	2.2	1.8	2.1	10.8	10.7	10.7	11.0	8.7	10.2	758
40-44	14.3	16.6	15.0	15.5	12.1	14.7	9.1	10.9	9.4	2.4	2.3	2.4	8.0	17.2	15.3	11.7	15.0	12.8	951
45-49	15.6	16.9	16.0	5.7	6.4	5.9	4.0	0.0	3.2	0.2	0.6	0.3	15.1	17.5	17.0	10.7	14.0	11.8	877
50-54	13.0	15.3	13.7	2.6	2.9	2.7	2.8	1.8	2.6	0.1	0.6	0.2	16.5	12.7	13.5	8.7	11.6	9.7	720
55-59	8.9	10.1	9.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	9.9	6.3	7.1	5.8	7.0	6.2	460
60-64	6.3	8.5	6.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.4	5.3	4.0	5.6	4.6	339
65-69	2.9	3.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.5	3.4	1.8	2.9	2.2	163
70-74	1.6	1.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.9	2.5	1.1	1.2	1.2	87
75 und mehr	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.0	1.7	0.4	0.7	0.5	37
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	7'413
fehlende Angaben	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	14
Alter																			
Mittelwert	44.0	46.3	44.6	33.9	31.7	33.4	31.2	27.5	30.6	20.6	20.5	20.6	46.3	44.3	44.7	37.7	41.5	39.0	
Standardabweichung	12.9	12.5	12.8	8.6	9.4	8.8	8.7	8.4	8.7	6.7	7.1	6.8	16.2	13.0	13.8	14.7	14.4	14.7	
1. Quartil	34.6	39.4	35.6	27.5	24.1	26.5	24.7	20.9	24.2	16.5	16.3	16.4	36.3	36.2	36.2	25.4	30.3	27.0	
Medianwert	44.6	46.8	45.3	33.7	29.4	32.7	29.5	25.9	29.0	17.7	17.3	17.7	47.8	44.5	45.1	37.6	42.9	39.6	
3. Quartil	52.9	54.6	53.5	39.9	39.4	39.8	36.85	31.6	36.1	23.0	23.7	23.0	55.5	52.0	52.8	48.5	51.4	49.8	
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	
fehlende Angaben	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	41.5	29.8	38.1	72.3	69.3	71.5	75.2	71.7	74.6	95.0	92.0	94.5	27.4	23.1	24.0	56.2	38.2	50.1	3'564
verheiratet	30.6	32.2	31.1	12.9	12.0	12.7	10.2	13.2	10.7	3.1	3.1	3.1	59.2	53.2	54.5	23.9	33.2	27.1	1'928
getrennt	6.1	7.0	6.3	3.3	5.4	3.8	2.8	1.9	2.7	0.6	0.6	0.6	3.5	4.5	4.2	4.3	5.3	4.7	332
geschieden	20.2	25.1	21.6	10.2	9.0	9.9	11.0	11.3	11.0	1.1	3.1	1.5	9.0	15.2	13.9	14.3	18.7	15.8	1'124
verwitwet	1.3	5.4	2.5	0.6	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	2.2	0.9	3.7	1.8	130
reg. Partnerschaft	0.3	0.4	0.3	0.8	1.8	1.0	0.8	1.9	1.0	0.1	1.2	0.3	0.5	1.3	1.2	0.4	0.9	0.5	39
N**	2'604	1'083	3'687	519	166	685	246	53	299	799	163	962	201	741	942	4'682	2'435	7'117	7'117
fehlende Angaben	106	40	146	23	7	30	7	2	9	33	8	41	12	42	54	196	114	310	310
Staatsangehörigkeit*																			
CH	80.1	87.5	82.3	67.2	86.3	71.9	68.7	76.9	70.2	86.1	92.0	87.1	83.6	86.7	86.1	79.0	87.0	81.8	5'687
EU	11.6	10.0	11.2	18.8	10.6	16.8	17.2	19.2	17.5	7.8	4.9	7.3	8.2	9.9	9.6	11.9	9.7	11.1	774
andere	8.2	2.6	6.6	14.0	3.1	11.3	14.2	3.8	12.3	6.1	3.1	5.6	8.2	3.3	4.4	9.1	3.3	7.1	495
N**	2'578	1'053	3'631	500	161	661	233	52	285	769	162	931	195	724	919	4'574	2'382	6'956	6'956
fehlende Angaben	132	70	202	42	12	54	20	3	23	63	9	72	18	59	77	304	167	471	471

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	7.4	8.8	7.8	3.0	1.8	2.7	1.2	3.8	1.7	0.5	0.6	0.5	7.9	8.2	8.1	4.9	6.6	5.5	395
Umland der Grossstadtzentren	13.9	16.7	14.7	5.9	4.8	5.6	13.6	7.5	12.5	7.1	4.1	6.6	12.4	14.2	13.8	11.3	12.8	11.8	850
Mittelzentren	15.7	16.2	15.9	18.3	22.2	19.2	25.1	20.8	24.3	24.2	27.8	24.8	18.8	16.6	17.1	18.4	18.7	18.5	1'328
Kleinzentren	34.2	32.5	33.7	46.9	43.1	46.0	34.2	39.6	35.1	37.5	40.2	37.9	34.2	29.9	30.8	36.8	33.9	35.8	2'574
rural	28.8	25.9	28.0	25.9	28.1	26.4	25.9	28.3	26.4	30.7	27.2	30.1	26.7	31.2	30.2	28.5	28.0	28.3	2'036
N**	2'622	1'075	3'697	525	167	692	243	53	296	817	169	986	202	747	949	4'731	2'452	7'183	7'183
fehlende Angaben	88	48	136	17	6	23	10	2	12	15	2	17	11	36	47	147	97	244	244
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	38.3	35.3	37.4	33.1	25.0	31.1	32.1	25.0	30.7	10.3	9.7	10.2	12.5	13.3	13.2	30.4	25.7	28.8	1'705
mit Eltern/Elternteil	8.6	5.1	7.6	18.5	18.8	18.6	22.0	16.7	21.0	69.7	59.0	68.0	9.0	5.1	5.9	23.0	12.1	19.4	1'146
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	2.3	10.1	4.5	0.2	4.9	1.4	1.0	6.3	1.9	0.1	4.9	0.9	4.2	16.0	13.6	1.5	10.8	4.6	274
mit PartnerIn (ohne Kinder)	23.1	27.0	24.2	16.2	26.4	18.8	16.7	25.0	18.3	5.7	4.9	5.5	27.8	26.1	26.5	18.7	24.4	20.6	1'219
mit PartnerIn und Kind(ern)	18.4	15.5	17.6	9.0	13.2	10.1	11.0	2.1	9.3	2.2	0.0	1.8	38.2	37.2	37.4	14.6	19.6	16.3	963
mit anderen Verw./Angeh.	1.4	0.6	1.2	1.9	1.4	1.7	3.8	4.2	3.9	0.9	2.1	1.1	0.0	1.2	1.0	1.5	1.2	1.4	82
mit FreundInnen (WG)	2.6	1.6	2.4	4.2	5.6	4.5	5.7	4.2	5.4	3.5	3.5	3.5	2.8	0.5	1.0	3.1	1.8	2.7	159
anderes	5.3	4.8	5.1	16.9	4.9	13.9	7.7	16.7	9.3	7.6	16.0	8.9	5.6	0.5	1.5	7.2	4.5	6.3	372
N**	2'152	863	3'015	432	144	576	209	48	257	740	144	884	144	570	714	3'948	1'972	5'920	5'920
fehlende Angaben	558	260	818	110	29	139	44	7	51	92	27	119	69	213	282	930	577	1'507	1'507
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	94.0	93.6	93.9	75.3	85.3	77.8	85.5	84.6	85.3	93.3	91.4	92.9	96.6	97.0	96.9	91.6	93.8	92.3	5'115
instabile Wohnsituation	4.0	4.8	4.2	17.1	14.0	16.3	11.2	10.3	11.0	4.6	4.3	4.6	3.4	3.0	3.1	5.9	5.0	5.6	310
Institution	2.0	1.6	1.9	7.6	0.8	5.9	3.4	5.1	3.7	2.1	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	1.2	2.1	116
N**	2'056	795	2'851	381	129	510	179	39	218	667	139	806	147	561	708	3'682	1'859	5'541	5'541
fehlende Angaben	654	328	982	161	44	205	74	16	90	165	32	197	66	222	288	1196	690	1886	1'886

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	33.9	35.2	34.2	45.6	22.7	39.5	37.4	27.6	35.9	63.2	47.4	60.5	13.4	14.1	13.9	38.9	28.6	35.4	1'573
zeitweilige Beziehung(en)	3.8	4.8	4.1	9.5	4.5	8.2	7.4	13.8	8.3	10.1	13.7	10.7	4.7	1.3	2.0	5.7	4.6	5.3	236
festе Beziehung, getrennt lebend	13.7	12.6	13.4	12.5	20.9	14.7	21.5	27.6	22.4	15.1	29.5	17.6	10.2	10.4	10.4	14.1	14.5	14.3	634
festе Beziehung, zusammen leb.	48.6	47.5	48.3	32.5	51.8	37.6	33.7	31.0	33.3	11.6	9.5	11.2	71.7	74.2	73.7	41.3	52.3	45.1	2'003
N**	1'677	668	2'345	305	110	415	163	29	192	457	95	552	127	462	589	2'928	1'518	4'446	4'446
fehlende Angaben	1'033	455	1'488	237	63	300	90	26	116	375	76	451	86	321	407	1'950	1'031	2'981	2'981
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	42.8	37.5	41.2	63.9	55.4	61.6	65.0	71.4	66.0	94.7	91.9	94.2	32.1	22.7	24.7	55.9	41.2	50.7	2'849
1 Kind	18.0	18.4	18.1	24.6	25.9	25.0	18.1	11.4	17.0	3.0	5.9	3.5	15.7	19.3	18.5	15.7	17.4	16.3	917
2 Kinder	26.1	30.7	27.5	9.2	15.1	10.7	11.3	14.3	11.8	1.8	2.2	1.8	32.7	39.6	38.1	18.9	28.4	22.3	1'250
3 Kinder oder mehr	13.1	13.4	13.2	2.4	3.6	2.7	5.6	2.9	5.2	0.5	0.0	0.4	19.5	18.4	18.6	9.5	13.0	10.7	601
N**	2'057	887	2'944	382	139	521	177	35	212	628	136	764	159	581	740	3'646	1'971	5'617	5'617
fehlende Angaben	653	236	889	160	34	194	76	20	96	204	35	239	54	202	256	1'232	578	1'810	1'810
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	74.1	67.5	72.1	81.7	70.4	78.7	78.4	75.9	78.0	61.9	57.7	61.1	57.6	40.1	43.7	72.1	59.9	67.8	3'350
1 Kind	10.7	15.2	12.0	10.3	16.8	12.0	9.2	6.9	8.8	9.9	13.1	10.5	17.3	22.5	21.4	10.7	16.5	12.8	630
2 Kinder	11.2	12.5	11.6	6.3	12.0	7.8	9.2	17.2	10.4	19.1	19.2	19.1	18.0	29.2	26.8	12.3	17.5	14.1	696
3 Kinder oder mehr	4.0	4.7	4.2	1.7	0.8	1.5	3.3	0.0	2.7	9.0	10.0	9.2	7.2	8.2	8.0	4.9	6.1	5.3	263
N**	1'762	742	2'504	350	125	475	153	29	182	575	130	705	139	524	663	3'204	1'735	4'939	4'939
fehlende Angaben	948	381	1'329	192	48	240	100	26	126	257	41	298	74	259	333	1'674	814	2'488	2'488

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	4.7	6.1	5.1	9.0	4.3	7.9	8.7	8.3	8.6	21.5	21.7	21.5	4.2	6.3	5.9	9.1	8.0	8.7	490
obligatorische Schule	13.3	18.4	14.7	30.8	40.0	32.9	21.6	29.2	23.0	50.6	48.1	50.2	16.9	13.3	14.1	23.4	21.3	22.7	1'277
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	3.9	6.5	4.7	3.1	6.4	3.8	1.9	4.2	2.3	3.5	10.1	4.5	1.7	4.4	3.8	3.5	6.1	4.3	243
Berufslehre, Berufsschule	59.5	51.1	57.1	48.0	44.3	47.2	52.4	52.1	52.3	20.2	18.6	20.0	41.5	51.9	49.7	48.9	47.5	48.4	2'720
Maturität, Diplommittelschule	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.5	4.3	4.2	4.3	2.7	1.6	2.5	5.9	5.7	5.7	3.8	4.4	4.0	225
Lehrerseminar	0.8	1.8	1.1	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.5	2.8	2.8	0.7	1.9	1.1	59
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.3	6.3	6.3	2.4	1.4	2.2	4.3	0.0	3.5	1.1	0.0	1.0	12.7	8.1	9.0	4.9	5.7	5.2	290
höhere Fachschule	1.6	1.1	1.5	0.2	0.0	0.2	2.4	2.1	2.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1	64
Fachhochschule	1.5	1.1	1.4	0.4	0.0	0.3	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	1.8	2.1	1.1	1.1	1.1	64
Universität, Hochschule	4.6	3.8	4.4	1.7	0.0	1.3	2.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	11.0	4.6	5.9	3.4	3.0	3.3	184
N**	2'103	820	2'923	458	140	598	208	48	256	707	129	836	118	457	575	3'832	1'784	5'616	5'616
fehlende Angaben	607	303	910	84	33	117	45	7	52	125	42	167	95	326	421	1'046	765	1'811	1'811
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	34.3	44.5	37.2	52.3	67.5	56.0	31.8	52.4	35.1	18.0	30.2	20.0	28.3	28.6	28.6	33.8	40.9	36.1	962
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.6	1.2	2.2	4.6	5.2	4.7	3.6	0.0	3.1	28.4	25.6	27.9	8.7	1.3	2.5	6.4	3.3	5.4	143
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	2.8	5.4	3.5	5.9	2.6	5.1	1.8	0.0	1.5	5.0	0.0	4.2	2.2	1.3	1.4	3.4	3.6	3.5	92
angelernte(r) ArbeiterIn	7.0	5.2	6.5	7.5	2.6	6.3	11.8	0.0	9.9	1.4	4.7	1.9	0.0	3.4	2.9	6.7	4.2	5.9	157
gelernte(r) ArbeiterIn	13.9	9.1	12.5	13.0	9.1	12.0	16.4	9.5	15.3	13.1	0.0	10.9	2.2	8.1	7.1	13.5	8.7	11.9	318
VorarbeiterIn	2.2	0.2	1.7	1.3	0.0	0.9	2.7	0.0	2.3	1.4	0.0	1.1	2.2	0.9	1.1	2.0	0.3	1.5	39
einfache(r) Angestellte(r)	13.9	18.7	15.2	6.7	10.4	7.6	9.1	28.6	12.2	5.9	9.3	6.4	10.9	33.8	30.0	11.6	22.3	15.1	402
mittl. Angestellte(r)/ Kader	8.9	6.8	8.3	2.9	0.0	2.2	10.0	0.0	8.4	2.3	4.7	2.6	15.2	12.0	12.5	7.4	7.1	7.3	194
leit. Angestellte(r)/Kader	2.7	2.1	2.5	1.3	0.0	0.9	1.8	9.5	3.1	0.9	0.0	0.8	10.9	1.3	2.9	2.3	1.6	2.1	56
selbständig	9.7	5.2	8.4	1.7	1.3	1.6	7.3	0.0	6.1	0.9	0.0	0.8	17.4	7.7	9.3	7.3	4.9	6.5	173
SchülerIn/StudentIn	1.0	1.2	1.1	0.8	1.3	0.9	2.7	0.0	2.3	22.5	23.3	22.6	2.2	1.3	1.4	4.6	2.6	3.9	105
andere Stellung	1.1	0.5	0.9	2.1	0.0	1.6	0.9	0.0	0.8	0.5	2.3	0.8	0.0	0.4	0.4	1.1	0.5	0.9	23
N**	1'083	427	1'510	239	77	316	110	21	131	222	43	265	46	234	280	1'804	860	2'664	2'664
fehlende Angaben	1'627	696	2'323	303	96	399	143	34	177	610	128	738	167	549	716	3'074	1'689	4'763	4'763

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	55.3	38.8	50.7	27.8	26.7	27.5	58.3	44.0	55.9	24.4	22.1	24.0	63.3	58.5	59.5	46.9	43.3	45.7	3'044
Ersparnisse	1.5	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	4.0	1.7	1.2	0.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	1.1	1.3	86
Rente (AHV/IV u.a.)	14.3	20.6	16.1	12.4	13.9	12.8	7.1	4.0	6.6	3.1	5.5	3.5	19.9	13.1	14.5	11.8	16.0	13.2	877
Sozialhilfe/Fürsorge	14.9	12.3	14.2	37.1	38.2	37.4	12.5	24.0	14.5	8.1	13.5	9.0	5.4	2.1	2.8	15.1	11.2	13.8	921
Arbeitslosenversicherung	8.3	6.6	7.8	9.3	5.5	8.4	9.2	8.0	9.0	3.7	3.1	3.6	3.0	1.3	1.7	7.1	4.4	6.2	413
durch PartnerIn	1.2	15.6	5.3	1.0	3.0	1.5	2.1	0.0	1.7	0.2	1.2	0.4	0.6	19.7	15.6	1.0	13.6	5.2	345
durch Eltern/Angehörige	2.9	2.8	2.9	6.7	9.7	7.4	7.5	14.0	8.6	58.0	54.0	57.3	4.8	3.7	3.9	14.8	9.0	12.9	857
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	11
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
anderes	1.5	1.9	1.6	2.4	1.2	2.1	0.8	2.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.8	0.6	0.9	1.5	1.4	1.5	99
N**	2'454	964	3'418	493	165	658	240	50	290	803	163	966	166	620	786	4'459	2'197	6'656	6'656
fehlende Angaben	256	159	415	49	8	57	13	5	18	29	8	37	47	163	210	419	352	771	771
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.1	24.2	42.8	22.4	14.7	20.5	50.4	36.5	48.0	17.1	11.0	16.1	58.7	37.4	41.9	41.0	27.5	36.6	2'374
Teilzeitarbeit	3.9	18.6	8.0	4.8	10.4	6.1	4.5	5.8	4.7	2.3	6.1	2.9	3.3	28.3	23.0	3.7	18.2	8.4	544
Gelegenheitsarbeit	1.1	1.1	1.1	1.4	0.6	1.2	2.0	1.9	2.0	0.8	0.6	0.7	0.7	1.8	1.6	1.0	1.3	1.1	73
in Ausbildung	3.5	3.0	3.3	2.4	6.1	3.3	3.7	9.6	4.7	56.8	58.3	57.1	6.0	4.9	5.1	14.2	9.8	12.8	828
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	17.8	35.3	22.8	22.0	33.1	24.7	13.5	13.5	13.5	4.5	9.2	5.3	20.7	24.3	23.5	15.5	28.8	19.8	1'285
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	15.7	11.9	14.6	27.2	17.8	24.9	15.6	23.1	16.9	9.1	6.7	8.7	3.3	2.4	2.6	14.9	8.9	13.0	841
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.5	0.2	0.4	1.0	0.6	0.9	0.8	0.0	0.7	0.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	28
anderes	7.5	5.7	7.0	18.8	16.6	18.3	9.4	9.6	9.5	9.0	6.7	8.6	7.3	0.9	2.3	9.1	5.2	7.8	507
N**	2'384	934	3'318	504	163	667	244	52	296	799	163	962	150	551	701	4'389	2'091	6'480	6'480
fehlende Angaben	326	189	515	38	10	48	9	3	12	33	8	41	63	232	295	489	458	947	947

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	24.5	34.5	27.1	29.9	30.2	30.0	28.1	45.5	30.7	37.3	58.3	40.1	23.5	21.4	21.7	27.1	32.3	28.7	461
weniger als 1000 Fr.	5.7	5.1	5.5	15.2	17.0	15.7	7.8	9.1	8.0	30.4	29.2	30.2	11.8	10.7	10.8	10.8	9.2	10.3	166
1001 bis 2000 Fr.	7.5	9.8	8.1	15.2	24.5	17.5	6.3	9.1	6.7	8.2	4.2	7.7	11.8	7.8	8.3	8.3	11.1	9.1	147
2001 bis 3000 Fr.	13.5	17.0	14.4	18.3	17.0	18.0	12.5	18.2	13.3	2.5	0.0	2.2	5.9	13.6	12.5	12.0	15.6	13.1	210
3001 bis 4000 Fr.	12.4	13.6	12.7	9.8	9.4	9.7	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	5.9	18.4	16.7	12.3	13.9	12.7	205
4001 bis 5000 Fr.	15.3	10.2	13.9	6.1	0.0	4.6	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	17.6	14.6	15.0	13.6	9.4	12.4	199
5001 bis 6000 Fr.	12.5	4.7	10.5	3.7	0.0	2.8	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	11.8	9.7	10.0	9.1	4.7	7.8	126
6001 bis 8000 Fr.	5.2	3.8	4.8	1.2	0.0	0.9	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	0.0	2.9	2.5	3.9	2.6	3.5	56
8001 bis 10 000 Fr.	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	1.6	0.0	1.3	1.3	0.0	1.1	11.8	1.0	2.5	1.9	0.2	1.4	23
10001 bis 15 000 Fr.	1.5	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.8	13
über 15 000 Fr.	0.2	0.4	0.2	0.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	3
N**	654	235	889	164	53	217	64	11	75	158	24	182	17	103	120	1'142	467	1'609	1'609
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'056</i>	<i>888</i>	<i>2'944</i>	<i>378</i>	<i>120</i>	<i>498</i>	<i>189</i>	<i>44</i>	<i>233</i>	<i>674</i>	<i>147</i>	<i>821</i>	<i>196</i>	<i>680</i>	<i>876</i>	<i>3'736</i>	<i>2'082</i>	<i>5'818</i>	<i>5'818</i>
Schulden*																			
keine Schulden	65.6	80.1	69.6	26.0	38.9	29.0	41.1	50.0	42.3	84.0	88.2	84.7	85.5	92.3	90.6	64.1	78.9	68.4	2'011
bis 5000 Fr.	4.6	4.5	4.6	14.0	19.4	15.3	16.3	22.7	17.2	5.3	5.4	5.3	3.2	2.6	2.7	6.5	5.7	6.3	185
5001 bis 10 000 Fr.	8.7	5.0	7.7	12.3	18.1	13.7	9.9	13.6	10.4	2.8	1.1	2.6	3.2	1.5	2.0	7.5	5.5	6.9	203
10 001 bis 25 000 Fr.	8.5	3.7	7.2	20.4	12.5	18.6	17.0	9.1	16.0	3.2	3.2	3.2	3.2	1.0	1.6	9.2	4.2	7.7	227
25 001 bis 50 000 Fr.	5.5	3.1	4.8	15.3	8.3	13.7	4.3	4.5	4.3	2.6	1.1	2.4	3.2	2.6	2.7	6.1	3.3	5.3	155
50 001 bis 100 000 Fr.	3.0	1.8	2.7	8.9	2.8	7.5	6.4	0.0	5.5	1.0	0.0	0.9	1.6	0.0	0.4	3.5	1.3	2.9	84
über 100 000 Fr.	4.1	1.8	3.5	3.0	0.0	2.3	5.0	0.0	4.3	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	2.5	73
N**	1'000	382	1'382	235	72	307	141	22	163	495	93	588	62	194	256	2'083	855	2'938	2'938
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'710</i>	<i>741</i>	<i>2'451</i>	<i>307</i>	<i>101</i>	<i>408</i>	<i>112</i>	<i>33</i>	<i>145</i>	<i>337</i>	<i>78</i>	<i>415</i>	<i>151</i>	<i>589</i>	<i>740</i>	<i>2'795</i>	<i>1'694</i>	<i>4'489</i>	<i>4'489</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	87.1	96.8	90.0	41.8	73.1	48.9	64.0	70.0	64.7	91.0	92.6	91.2	80.4	93.6	83.9	1'559
Strafhaft	7.1	2.2	5.6	24.3	13.5	21.8	14.7	10.0	14.1	3.4	3.7	3.4	9.2	3.4	7.6	142
Untersuchungshaft	3.6	1.1	2.8	11.3	7.7	10.5	10.7	10.0	10.6	3.4	3.7	3.4	5.1	2.0	4.3	80
Straf- und Untersuchungshaft	2.2	0.0	1.5	22.6	5.8	18.8	10.7	10.0	10.6	2.3	0.0	2.0	5.3	1.0	4.1	77
N**	863	372	1'235	177	52	229	75	10	85	177	27	204	1'360	498	1'858	1'858
fehlende Angaben	1'847	751	2'598	365	121	486	178	45	223	655	144	799	3'305	1'268	4'573	4'573
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	26.3	25.0	26.1	20.0	27.3	20.9	38.9	66.7	42.9	50.0	100.0	53.3	26.7	37.5	27.9	61
1 bis 2 Monate	8.8	12.5	9.1	13.3	18.2	14.0	0.0	33.3	4.8	7.1	0.0	6.7	10.8	16.7	11.4	25
>2 bis 6 Monate	32.5	37.5	33.0	28.0	27.3	27.9	11.1	0.0	9.5	7.1	0.0	6.7	27.2	25.0	26.9	59
>6 bis 12 Monate	17.5	0.0	15.9	12.0	18.2	12.8	11.1	0.0	9.5	21.4	0.0	20.0	14.4	8.3	13.7	29
mehr als 1 Jahr	15.0	25.0	15.9	26.7	9.1	24.4	38.9	0.0	33.3	14.3	0.0	13.3	21.0	12.5	20.1	44
N**	80	8	88	75	11	86	18	3	21	13	1	14	194	24	218	218
fehlende Angaben	31	4	35	28	3	31	9	0	9	3	1	4	73	8	81	81

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	31.3	37.8	33.2	43.9	57.7	47.3	40.2	36.0	39.4	19.4	17.3	19.0	66.3	74.3	72.6	32.9	49.3	38.5	2'602
PartnerIn	5.8	3.1	5.1	3.8	2.6	3.5	3.6	2.0	3.3	0.8	0.6	0.7	1.1	2.7	2.4	4.3	2.7	3.8	255
Familie	3.4	3.9	3.6	4.0	5.8	4.4	8.0	6.0	7.7	10.1	8.3	9.8	6.8	4.1	4.7	5.5	4.8	5.3	357
FreundInnen/Bekannte	1.4	3.1	1.9	2.1	2.6	2.2	3.6	10.0	4.7	0.9	3.0	1.3	2.1	4.7	4.1	1.5	4.0	2.4	162
spez. ambulante Institution	1.5	1.8	1.6	4.6	5.8	4.9	2.7	4.0	2.9	0.4	0.6	0.4	1.6	1.3	1.3	1.7	2.0	1.8	122
spez. stationäre Institution	5.1	6.1	5.4	5.0	5.1	5.0	2.2	4.0	2.6	0.9	1.8	1.1	1.1	0.4	0.6	3.8	3.6	3.7	250
Arztpraxis	7.7	10.3	8.4	7.9	8.3	8.0	8.5	4.0	7.7	2.5	3.0	2.6	4.7	3.6	3.8	6.6	7.2	6.8	462
Spital/Klinik	11.6	15.3	12.7	3.8	3.8	3.8	2.2	8.0	3.3	1.3	3.0	1.6	3.2	0.9	1.3	7.7	8.1	7.8	529
Sozialdienste	6.7	5.3	6.3	8.6	5.1	7.7	4.0	8.0	4.7	4.0	5.4	4.3	3.2	2.7	2.8	5.9	4.6	5.4	368
Justiz/adm. Massnahme	17.5	6.1	14.3	9.8	1.3	7.7	21.0	12.0	19.3	52.1	41.7	50.2	4.7	1.0	1.8	21.6	6.4	16.4	1'108
ArbeitgeberIn	3.8	2.9	3.5	1.7	0.6	1.4	0.9	0.0	0.7	1.6	1.2	1.5	3.2	0.4	1.0	3.1	1.9	2.7	180
LehrerIn	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	3.0	0.5	0.9	0.8	1.0	1.3	1.1	77
anderes	3.6	3.9	3.7	4.8	1.3	3.9	3.1	6.0	3.6	3.4	10.1	4.6	1.6	3.1	2.8	4.3	4.1	4.2	286
N**	2'473	991	3'464	478	156	634	224	50	274	770	168	938	190	703	893	4'452	2'306	6'758	6'758
fehlende Angaben	237	132	369	64	17	81	29	5	34	62	3	65	23	80	103	426	243	669	669
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	27.7	23.0	26.5	26.6	22.9	25.8	34.7	42.9	36.3	17.8	22.9	18.5	11.5	15.6	14.9	25.8	21.5	24.4	827
PartnerIn	8.9	5.5	8.0	4.9	8.3	5.8	9.3	0.0	7.5	2.4	2.1	2.4	18.0	3.8	6.1	7.7	4.9	6.8	230
Familie	4.3	6.1	4.8	4.3	8.3	5.3	9.3	7.1	8.9	16.4	12.5	15.8	4.9	4.8	4.8	6.0	6.2	6.1	206
FreundInnen/Bekannte	1.6	1.6	1.6	2.3	1.0	2.0	2.5	0.0	2.1	1.7	4.2	2.1	4.9	4.5	4.5	1.9	2.5	2.1	71
spez. ambulante Institution	0.6	1.6	0.8	4.6	3.1	4.3	2.5	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	4.9	2.9	3.2	1.2	2.0	1.4	49
spez. stationäre Institution	1.8	2.0	1.9	3.9	2.1	3.5	1.7	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	3.3	0.3	0.8	2.0	1.2	1.8	60
Arztpraxis	7.1	6.1	6.9	9.5	10.4	9.8	4.2	3.6	4.1	2.1	4.2	2.4	4.9	1.6	2.1	6.5	5.1	6.0	204
Spital/Klinik	6.0	10.6	7.2	3.0	4.2	3.3	4.2	7.1	4.8	3.5	4.2	3.6	4.9	0.0	0.8	5.0	6.2	5.3	181
Sozialdienste	2.1	2.6	2.2	3.9	3.1	3.8	0.8	14.3	3.4	1.4	2.1	1.5	1.6	1.6	1.6	2.2	2.5	2.3	79
Justiz/adm. Massnahme	3.9	2.0	3.4	8.6	1.0	6.8	5.1	7.1	5.5	6.3	0.0	5.4	0.0	0.3	0.3	4.6	1.5	3.6	123
ArbeitgeberIn	1.9	2.2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	0.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	1.5	51
LehrerIn	0.5	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	19
anderes	1.7	1.6	1.7	2.3	1.0	2.0	1.7	0.0	1.4	3.5	0.0	3.0	0.0	1.0	0.8	1.9	1.2	1.7	58
keine	42.1	43.1	42.4	37.2	42.7	38.5	33.1	25.0	31.5	47.4	52.1	48.1	41.0	65.3	61.3	42.5	50.0	44.8	1'519
N**	1'414	508	1'922	304	96	400	118	28	146	287	48	335	61	314	375	2'320	1'067	3'387	3'387
fehlende Angaben	1'296	615	1'911	238	77	315	135	27	162	545	123	668	152	469	621	2'558	1'482	4'040	4'040

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hilferwartungen für...*																			
Suchtprobleme	80.8	87.1	82.5	90.3	93.8	91.2	78.6	76.0	78.2	69.5	81.5	71.5	46.7	51.6	50.6	78.1	76.4	77.5	2'648
somatische Probleme	3.6	3.7	3.6	7.3	4.1	6.5	3.4	0.0	2.8	0.8	1.9	0.9	2.7	0.9	1.3	3.6	2.8	3.3	113
psychische Probleme	16.4	24.1	18.5	18.0	17.5	17.9	11.1	12.0	11.3	7.6	14.8	8.9	14.7	14.6	14.6	14.7	19.9	16.4	560
Beziehungsprobleme	12.8	19.0	14.5	12.1	12.4	12.2	16.2	16.0	16.2	4.6	7.4	5.1	33.3	45.3	43.1	12.4	24.8	16.4	561
Familienprobleme	9.4	17.3	11.6	11.1	16.5	12.4	12.8	8.0	12.0	9.9	11.1	10.1	45.3	46.3	46.1	10.8	24.9	15.4	527
finanzielle Probleme	8.1	7.7	8.0	19.7	27.8	21.8	8.5	0.0	7.0	6.1	5.6	6.0	4.0	3.7	3.8	9.4	8.1	9.0	307
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	13.2	11.4	12.7	19.0	18.6	18.9	10.3	8.0	9.9	11.1	9.3	10.8	5.3	4.0	4.3	12.8	9.5	11.7	401
Wohnprobleme	4.0	3.5	3.9	7.6	16.5	9.8	5.1	8.0	5.6	1.9	3.7	2.2	6.7	3.4	4.0	4.3	4.9	4.5	154
Gewaltprobleme	1.4	2.0	1.6	3.1	1.0	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	5.6	1.3	2.7	5.0	4.5	1.5	2.8	1.9	66
rechtliche Probleme	10.2	4.2	8.6	7.3	7.2	7.3	15.4	16.0	15.5	14.1	9.3	13.3	9.3	4.0	5.0	10.1	5.0	8.4	288
andere(s)	2.5	2.0	2.3	1.0	1.0	1.0	2.6	4.0	2.8	4.2	1.9	3.8	1.3	0.6	0.8	3.9	2.4	3.4	116
keine Erwartung	12.2	6.3	10.6	5.5	0.0	4.1	7.7	8.0	7.7	18.3	5.6	16.1	2.7	2.2	2.3	11.4	4.6	9.2	313
N**	1'415	543	1'958	289	97	386	117	25	142	262	54	316	75	322	397	2'298	1'118	3'416	3'416
fehlende Angaben	1'267	575	1'842	248	74	322	136	30	166	561	115	676	133	390	523	2'531	1'349	3'880	3'880
Rechtsgrundlage der Behandlung																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.3	0.2	0.3	0.8	0.0	0.6	3.0	0.0	2.5	6.6	2.3	5.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	26
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	2.9	1.5	2.6	2.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.7	1.7	2.3	1.8	0.0	0.4	0.3	2.4	1.0	2.0	59
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	7.4	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	25
anderes	10.8	4.3	9.1	5.7	2.5	4.9	10.1	5.0	9.2	22.7	11.4	20.9	1.6	0.0	0.3	11.4	3.5	8.9	267
keine (freiwillige Behandlung)	85.4	93.7	87.6	91.0	97.5	92.6	83.8	95.0	85.7	61.1	84.1	64.8	98.4	99.6	99.4	83.7	95.2	87.3	2'616
N**	1'301	460	1'761	245	81	326	99	20	119	229	44	273	64	266	330	2'060	936	2'996	2'996
fehlende Angaben	1'409	663	2'072	297	92	389	154	35	189	603	127	730	149	517	666	2'818	1'613	4'431	4'431

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	46.2	38.1	43.9	15.5	20.0	16.6	47.6	60.9	50.0	79.9	75.7	79.2	70.3	66.2	67.0	51.7	50.8	51.4	3'139
ja	53.8	61.9	56.1	84.5	80.0	83.4	52.4	39.1	50.0	20.1	24.3	20.8	29.7	33.8	33.0	48.3	49.2	48.6	2'969
N**	2'256	910	3'166	444	140	584	208	46	254	730	144	874	158	597	755	4'063	2'045	6'108	6'108
fehlende Angaben	454	213	667	98	33	131	45	9	54	102	27	129	55	186	241	815	504	1'319	1'319
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.2	1.7	1.4	4.9	5.6	5.1	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	2.0	2.0	2.1	2.0	48
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.8	4.8	4.8	76.3	72.2	75.3	15.8	27.3	17.2	3.0	5.0	3.3	7.9	1.8	3.3	18.2	12.4	16.3	388
weitere medikamentöse Suchtbeh.	12.2	10.5	11.7	7.1	6.7	7.0	5.3	0.0	4.6	1.0	0.0	0.8	0.0	2.6	2.0	9.9	7.8	9.2	219
ambulante Beratung	64.9	66.5	65.4	59.7	57.8	59.2	77.6	72.7	77.0	84.2	75.0	82.6	73.7	84.2	81.6	66.1	69.4	67.2	1'598
stationäre Therapie	51.2	56.4	52.9	48.4	43.3	47.2	48.7	54.5	49.4	18.8	15.0	18.2	23.7	17.5	19.1	47.4	46.2	47.0	1'118
Entzug	43.2	49.3	45.1	59.4	62.2	60.1	35.5	36.4	35.6	12.9	10.0	12.4	5.3	7.0	6.6	42.7	41.2	42.2	1'004
Selbsthilfegruppe	4.7	6.1	5.1	3.5	3.3	3.5	1.3	0.0	1.1	2.0	0.0	1.7	0.0	3.5	2.6	4.1	5.1	4.5	106
andere	2.4	1.9	2.2	1.1	3.3	1.6	1.3	9.1	2.3	3.0	5.0	3.3	0.0	6.1	4.6	2.1	3.5	2.6	61
N**	1'046	477	1'523	283	90	373	76	11	87	101	20	121	38	114	152	1'599	780	2'379	2'379
fehlende Angaben	168	86	254	92	22	114	33	7	40	46	15	61	9	88	97	363	227	590	590

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung*																
nein	97.8	96.6	97.5	56.4	52.8	55.5	95.0	97.4	95.4	99.7	99.3	99.6	93.5	92.7	93.3	4'287
ja	2.2	3.4	2.5	43.6	47.2	44.5	5.0	2.6	4.6	0.3	0.7	0.4	6.5	7.3	6.7	309
N**	1'917	758	2'675	367	125	492	180	38	218	658	137	795	3'359	1'237	4'596	4'596
fehlende Angaben	793	365	1'158	175	48	223	73	17	90	174	34	208	1'306	529	1'835	1'835
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	2.6	3.8	3.1	0.6	5.2	1.9	11.1	0.0	10.0	0.0	-	0.0	1.4	4.5	2.3	7
Methadon	76.9	73.1	75.4	90.5	87.9	89.8	66.7	100.0	70.0	50.0	-	50.0	86.9	84.1	86.1	260
andere Opiate	12.8	3.8	9.2	8.2	5.2	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	8.4	4.5	7.3	22
andere Substanzen	7.7	19.2	12.3	0.6	1.7	0.9	22.2	0.0	20.0	50.0	-	50.0	3.3	6.8	4.3	13
N**	39	26	65	158	58	216	9	1	10	2	0	2	214	88	302	302
fehlende Angaben	3	0	3	2	1	3	0	0	0	0	1	1	5	2	7	7
Andere parallele Behandlung*																
nein	89.9	86.8	89.1	79.3	83.1	80.2	84.2	90.5	85.2	92.4	95.7	93.0	89.0	87.6	88.6	2'379
ja	10.1	13.2	10.9	20.7	16.9	19.8	15.8	9.5	14.8	7.6	4.3	7.0	11.0	12.4	11.4	306
N**	1'282	476	1'758	251	83	334	101	21	122	238	46	284	1'992	693	2'685	2'685
fehlende Angaben	1'428	647	2'075	291	90	381	152	34	186	594	125	719	2'673	1'073	3'746	3'746
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	67.8	53.3	63.0	65.4	85.7	69.7	53.3	50.0	52.9	83.3	0.0	75.0	66.8	56.6	63.9	188
stationäre Therapie	9.9	16.7	12.2	15.4	7.1	13.6	20.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	10.9	14.5	11.9	35
Selbsthilfegruppe	3.3	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.8	3.1	9
anderes	23.1	26.7	24.3	21.2	7.1	18.2	26.7	50.0	29.4	16.7	100.0	25.0	22.7	26.5	23.8	70
N**	121	60	181	52	14	66	15	2	17	18	2	20	211	83	294	294
fehlende Angaben	8	3	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	3	12	12

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	78.6	73.6	77.2	87.3	87.5	87.4	90.8	85.0	89.8	93.8	93.0	93.7	83.2	78.4	82.0	2'098
Entzug in der gleichen Institution	0.7	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	0.7	17
Entzug in einer anderen Institution	20.8	24.8	21.9	12.7	12.5	12.6	9.2	10.0	9.3	6.2	7.0	6.3	16.4	20.3	17.4	445
N**	1'223	447	1'670	245	80	325	98	20	118	225	43	268	1'906	654	2'560	2'560
fehlende Angaben	1'487	676	2'163	297	93	390	155	35	190	607	128	735	2'759	1'112	3'871	3'871

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2009)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
nie	60.9	60.7	60.8	21.2	22.6	21.6	56.5	30.0	52.8	73.9	75.0	74.1	58.4	56.5	57.9	801
einmal	8.0	9.4	8.4	14.4	22.6	16.8	19.4	30.0	20.8	11.6	20.0	12.7	9.7	11.8	10.3	142
zwei oder dreimal	10.4	10.2	10.3	20.5	26.4	22.2	4.8	10.0	5.6	6.5	5.0	6.3	10.6	11.5	10.8	150
mehr als dreimal	20.7	19.7	20.4	43.9	28.3	39.5	19.4	30.0	20.8	8.0	0.0	7.0	21.3	20.2	21.0	291
N**	637	244	881	132	53	185	62	10	72	138	20	158	1'028	356	1'384	1'384
fehlende Angaben	2'073	879	2'952	410	120	530	191	45	236	694	151	845	3'637	1'410	5'047	5'047

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2009)

alle Selbstbetroffenen										
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total		
	%	%	%	N		%	%	%	N	
Alkohol	58.1	63.6	59.6	3'833	Alkohol	58.1	63.6	59.6	3'833	
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.2	0.2	16	Cocktail	0	0	0	16	
Heroin	10.1	8.1	9.5	612	Opiate	11.4	9.6	10.9	699	
Methadon	1.0	1.2	1.0	67						
andere Opiate	0.3	0.3	0.3	20						
Kokain	5.4	3.1	4.8	308	Kokain und Derivate	5.4	3.1	4.8	308	
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0						
Amphetamine	0.3	0.7	0.4	28	Stimulantien	0.5	1.0	0.6	40	
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.2	0.1	8						
andere Stimulantien	0.1	0.1	0.1	4						
Barbiturate	0.0	0.1	0.0	2	Medikamente	0.7	1.8	1.0	64	
Benzodiazepine	0.6	1.3	0.8	49						
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.5	0.2	13						
LSD	0.0	0.0	0.0	1	Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	2	
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1						
Cannabis	17.8	9.7	15.6	1'003	Cannabis	17.8	9.7	15.6	1'003	
Tabak	2.0	4.8	2.7	176	Tabak	2.0	4.8	2.7	176	
flüchtige Stoffe	0.0	0.2	0.1	5	andere Substanzen	0.4	0.8	0.5	33	
andere Substanz	0.4	0.6	0.4	28						
pathologisches Spielen	2.3	1.3	2.0	128	suchtähnliche Verhaltensweisen	3.5	5.4	4.0	257	
Essstörungen	0.1	3.2	1.0	62						
anderes suchtähnliches Problem	1.1	1.0	1.0	67						
N**	4'665	1'766	6'431	6'431		4'665	1'766	6'431	6'431	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	28.0	20.0	25.5	41.0	27.3	31.6	0.0	27.9	3.5	40.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.5	20.0	9.3	24.0	27.3	0.0	50.0	20.4	1.2	20.0
2-3 Tage pro Woche	13.5	20.0	11.7	20.5	27.3	5.3	50.0	17.0	4.7	40.0
4-6 Tage pro Woche	10.7	10.0	8.5	5.0	9.1	0.0	0.0	7.7	3.5	0.0
einmal täglich	11.0	20.0	24.1	5.0	0.0	36.8	0.0	9.9	4.7	0.0
mehrmals täglich	29.4	10.0	21.0	4.5	9.1	26.3	0.0	17.0	82.6	0.0
N**	1'856	10	377	200	11	19	2	705	86	5
fehlende Angaben	854	2	153	53	11	13	0	127	6	14
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	8.3	10.0	14.8	23.0	27.3	10.0	0.0	7.7	2.3	8.3
1 Tag pro Woche oder weniger	7.5	20.0	8.8	28.1	18.2	5.0	50.0	25.7	1.2	8.3
2-3 Tage pro Woche	16.7	20.0	12.9	23.0	27.3	10.0	50.0	21.2	5.8	33.3
4-6 Tage pro Woche	13.8	10.0	8.5	8.7	18.2	0.0	0.0	8.9	3.5	0.0
einmal täglich	12.6	20.0	29.1	7.1	0.0	40.0	0.0	12.1	5.8	0.0
mehrmals täglich	41.0	20.0	25.8	10.2	9.1	35.0	0.0	24.4	81.4	50.0
N**	1'863	10	364	196	11	20	2	685	86	12
fehlende Angaben	847	2	166	57	11	12	0	147	6	7

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer

Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	54.3	0.0	12.8
1 Tag pro Woche oder weniger	15.7	0.0	5.1
2-3 Tage pro Woche	8.6	33.3	15.4
4-6 Tage pro Woche	10.0	0.0	15.4
einmal täglich	2.9	0.0	12.8
mehrmals täglich	8.6	66.7	38.5
N**	70	3	39
fehlende Angaben	35	3	11
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	27.3	0.0	2.6
1 Tag pro Woche oder weniger	36.4	0.0	5.3
2-3 Tage pro Woche	14.5	0.0	13.2
4-6 Tage pro Woche	12.7	33.3	13.2
einmal täglich	1.8	0.0	10.5
mehrmals täglich	7.3	66.7	55.3
N**	55	3	38
fehlende Angaben	50	3	12

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	25.4	0.0	20.0	40.5	33.3	22.7	-	29.0	2.6	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.9	33.3	15.4	19.0	13.3	0.0	-	19.6	1.3	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.5	33.3	6.9	11.9	40.0	13.6	-	14.5	2.6	25.0
4-6 Tage pro Woche	13.6	33.3	6.9	9.5	6.7	0.0	-	8.0	1.3	0.0
einmal täglich	10.9	0.0	27.7	11.9	6.7	18.2	-	10.9	3.9	25.0
mehrmals täglich	28.7	0.0	23.1	7.1	0.0	45.5	-	18.1	88.3	50.0
N**	743	3	130	42	15	22	0	138	77	4
fehlende Angaben	380	1	39	13	3	10	0	33	7	10
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.5	0.0	9.6	20.5	12.5	0.0	-	6.5	2.6	12.5
1 Tag pro Woche oder weniger	7.0	0.0	14.4	18.2	12.5	0.0	-	30.2	0.0	12.5
2-3 Tage pro Woche	16.7	33.3	9.6	20.5	50.0	0.0	-	13.7	3.9	12.5
4-6 Tage pro Woche	15.1	33.3	5.6	15.9	6.3	0.0	-	7.2	1.3	0.0
einmal täglich	12.4	0.0	31.2	9.1	12.5	30.4	-	9.4	3.9	12.5
mehrmals täglich	41.3	33.3	29.6	15.9	6.3	69.6	-	33.1	88.3	50.0
N**	724	3	125	44	16	23	0	139	77	8
fehlende Angaben	399	1	44	11	2	9	0	32	7	6

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Frauen

Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	56.3	2.8	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	18.8	5.6	16.7
2-3 Tage pro Woche	6.3	22.2	50.0
4-6 Tage pro Woche	12.5	2.8	0.0
einmal täglich	0.0	13.9	0.0
mehrmals täglich	6.3	52.8	33.3
N**	16	36	6
fehlende Angaben	7	20	11
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	44.4	2.9	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	44.4	5.7	16.7
2-3 Tage pro Woche	11.1	22.9	50.0
4-6 Tage pro Woche	0.0	5.7	0.0
einmal täglich	0.0	5.7	0.0
mehrmals täglich	0.0	57.1	33.3
N**	9	35	6
fehlende Angaben	14	21	11

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	27.2	15.4	24.1	40.9	30.8	26.8	0.0	28.1	3.1	22.2
1 Tag pro Woche oder weniger	7.9	23.1	10.8	23.1	19.2	0.0	50.0	20.3	1.2	11.1
2-3 Tage pro Woche	13.2	23.1	10.5	19.0	34.6	9.8	50.0	16.6	3.7	33.3
4-6 Tage pro Woche	11.5	15.4	8.1	5.8	7.7	0.0	0.0	7.7	2.5	0.0
einmal täglich	11.0	15.4	25.0	6.2	3.8	26.8	0.0	10.1	4.3	11.1
mehrmals täglich	29.2	7.7	21.5	5.0	3.8	36.6	0.0	17.2	85.3	22.2
N**	2'599	13	507	242	26	41	2	843	163	9
fehlende Angaben	1'234	3	192	66	14	23	0	160	13	24
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	8.1	7.7	13.5	22.5	18.5	4.7	0.0	7.5	2.5	10.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.3	15.4	10.2	26.3	14.8	2.3	50.0	26.5	0.6	10.0
2-3 Tage pro Woche	16.7	23.1	12.1	22.5	40.7	4.7	50.0	19.9	4.9	25.0
4-6 Tage pro Woche	14.2	15.4	7.8	10.0	11.1	0.0	0.0	8.6	2.5	0.0
einmal täglich	12.6	15.4	29.7	7.5	7.4	34.9	0.0	11.7	4.9	5.0
mehrmals täglich	41.1	23.1	26.8	11.3	7.4	53.5	0.0	25.8	84.7	50.0
N**	2'587	13	489	240	27	43	2	824	163	20
fehlende Angaben	1'246	3	210	68	13	21	0	179	13	13

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2009), Männer und Frauen

Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	54.7	2.6	11.1
1 Tag pro Woche oder weniger	16.3	5.1	6.7
2-3 Tage pro Woche	8.1	23.1	20.0
4-6 Tage pro Woche	10.5	2.6	13.3
einmal täglich	2.3	12.8	11.1
mehrmals täglich	8.1	53.8	37.8
N**	86	39	45
fehlende Angaben	42	23	22
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	29.7	2.6	2.3
1 Tag pro Woche oder weniger	37.5	5.3	6.8
2-3 Tage pro Woche	14.1	21.1	18.2
4-6 Tage pro Woche	10.9	7.9	11.4
einmal täglich	1.6	5.3	9.1
mehrmals täglich	6.3	57.9	52.3
N**	64	38	44
fehlende Angaben	64	24	23

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.1	21.6	21.0	22.4	20.1	33.1	20.0	14.9	14.2	20.2
Standardabweichung	3.7	7.0	5.5	6.7	3.6	12.6	1.4	2.5	2.4	8.4
1. Quartil	14.0	16.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	15.0
Medianwert	16.0	22.0	20.0	20.0	19.0	28.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3. Quartil	18.0	24.0	23.0	25.0	22.0	38.0	21.0	16.0	16.0	25.0
N*	1'102	9	323	179	7	15	2	642	43	6
fehlende Angaben	1'608	3	207	74	15	17	0	190	49	13
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	21.9	23.4	22.5	24.0	21.8	34.9	22.0	16.0	16.2	19.7
Standardabweichung	7.2	6.2	5.8	6.7	4.9	12.8	-	2.9	5.1	5.0
1. Quartil	18.0	19.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	14.0	15.0
Medianwert	20.0	23.0	21.0	22.0	22.0	33.0	22.0	16.0	15.0	19.0
3. Quartil	25.0	26.5	25.0	27.0	25.0	38.0	22.0	16.0	18.0	25.0
N*	1'055	8	275	141	5	13	1	504	38	3
fehlende Angaben	1'655	4	255	112	17	19	1	328	54	16
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.4	26.4	23.7	25.1	27.0	34.9	22.0	16.7	17.5	22.8
Standardabweichung	11.7	4.6	6.7	6.7	5.9	11.6	-	3.7	6.8	11.2
1. Quartil	22.0	23.0	19.0	20.0	25.0	28.0	22.0	15.0	14.0	14.0
Medianwert	30.0	24.0	22.0	24.0	28.0	33.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3. Quartil	40.0	28.0	27.0	28.5	31.0	34.0	22.0	17.0	18.0	31.5
N*	1'045	7	263	156	6	9	1	487	41	4
fehlende Angaben	1'665	5	267	97	16	23	1	345	51	15
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.3	1.6	6.6	6.4	9.1	9.0	8.4	4.7	8.2	4.5
Standardabweichung	13.0	-	7.2	5.1	6.2	5.0	4.9	5.8	9.7	3.8
1. Quartil	14.4	1.6	1.4	2.8	4.8	4.2	5.0	1.3	2.2	1.2
Medianwert	24.2	1.6	4.1	5.5	10.7	8.7	8.4	2.5	3.0	4.4
3. Quartil	33.7	1.6	8.5	7.9	13.3	14.2	11.8	5.3	11.9	7.8
N*	508	1	48	85	4	3	2	498	31	4
fehlende Angaben	534	1	19	14	4	3	0	85	30	8

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	17.4	16.0	19.4	20.5	18.7	30.1	-	14.7	15.1	28.9
Standardabweichung	5.2	1.7	6.2	6.8	4.6	10.8	-	2.2	2.8	18.2
1. Quartil	15.0	15.0	15.0	17.0	15.0	22.0	-	13.0	14.0	17.0
Medianwert	16.0	15.0	18.0	19.0	18.0	31.5	-	15.0	15.0	19.0
3. Quartil	19.0	18.0	21.0	22.0	20.5	38.0	-	16.0	17.0	41.0
N*	419	3	109	41	12	14	0	127	40	7
fehlende Angaben	704	1	60	14	6	18	0	44	44	7
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	27.2	18.7	20.7	22.0	19.0	36.5	-	15.4	17.2	36.3
Standardabweichung	11.2	2.3	6.5	8.0	4.0	7.8	-	2.4	3.4	18.4
1. Quartil	18.0	16.0	16.0	17.0	16.0	29.0	-	14.0	15.0	19.0
Medianwert	25.0	20.0	19.0	19.0	18.0	38.0	-	15.0	17.0	33.5
3. Quartil	35.0	20.0	22.0	23.0	20.0	44.0	-	16.0	20.0	48.0
N*	420	3	91	33	14	11	0	99	39	6
fehlende Angaben	703	1	78	22	4	21	0	72	45	8
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	35.1	18.7	21.2	22.8	20.9	33.4	-	16.5	19.3	33.7
Standardabweichung	12.2	2.3	6.7	8.4	6.4	9.2	-	3.2	7.3	27.2
1. Quartil	25.0	16.0	17.0	17.0	16.5	27.0	-	15.0	16.0	17.0
Medianwert	35.0	20.0	19.0	19.0	19.0	32.5	-	16.0	17.5	19.0
3. Quartil	43.0	20.0	23.0	25.0	23.5	39.0	-	17.0	20.0	65.0
N*	450	3	90	35	16	10	0	95	36	3
fehlende Angaben	673	1	79	20	2	22	0	76	48	11
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	26.0	-	5.7	7.5	4.5	28.1	-	3.9	15.5	3.8
Standardabweichung	13.2	-	6.6	7.9	3.8	-	-	4.3	14.5	2.8
1. Quartil	15.0	-	1.6	1.9	1.8	28.1	-	1.3	1.5	2.1
Medianwert	27.4	-	2.4	3.5	3.5	28.1	-	2.6	15.5	3.4
3. Quartil	36.1	-	6.8	9.3	6.4	28.1	-	4.4	27.4	5.5
N*	164	0	24	23	9	1	0	93	31	4
fehlende Angaben	183	0	4	5	2	4	0	16	19	3

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2009), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.5	20.2	20.6	22.0	19.2	31.7	20.0	14.9	14.6	24.8
Standardabweichung	4.2	6.5	5.7	6.7	4.2	11.6	1.4	2.4	2.6	14.7
1. Quartil	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	17.0
Medianwert	16.0	19.0	19.0	20.0	18.0	30.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3. Quartil	18.0	23.0	23.0	24.0	21.0	38.0	21.0	16.0	16.0	26.0
N*	1'521	12	432	220	19	29	2	769	83	13
fehlende Angaben	2'312	4	267	88	21	35	0	234	93	20
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.4	22.1	22.1	23.6	19.7	35.6	22.0	15.9	16.7	30.8
Standardabweichung	8.9	5.8	6.1	7.0	4.3	10.6	-	2.8	4.3	16.9
1. Quartil	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	27.0	22.0	14.0	14.0	19.0
Medianwert	20.0	20.0	21.0	22.0	18.0	34.0	22.0	16.0	16.0	25.0
3. Quartil	26.0	25.0	25.0	27.0	22.0	42.5	22.0	16.0	18.0	41.0
N*	1'475	11	366	174	19	24	1	603	77	9
fehlende Angaben	2'358	5	333	134	21	40	1	400	99	24
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.6	24.1	23.1	24.7	22.6	34.1	22.0	16.7	18.4	27.4
Standardabweichung	11.9	5.4	6.7	7.1	6.7	10.2	-	3.6	7.1	18.5
1. Quartil	23.0	20.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	15.0	16.0
Medianwert	30.0	23.5	21.0	23.0	20.5	33.0	22.0	16.0	16.0	19.0
3. Quartil	40.0	27.0	26.0	28.0	27.0	38.0	22.0	17.0	20.0	37.0
N*	1'495	10	353	191	22	19	1	582	77	7
fehlende Angaben	2'338	6	346	117	18	45	1	421	99	26
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.7	1.6	6.3	6.7	5.9	13.8	8.4	4.6	11.9	4.1
Standardabweichung	13.0	-	7.0	5.8	4.9	10.4	4.9	5.6	12.8	3.1
1. Quartil	14.5	1.6	1.5	2.5	1.8	6.5	5.0	1.3	2.1	1.2
Medianwert	24.8	1.6	3.9	5.3	4.2	11.4	8.4	2.5	4.9	3.4
3. Quartil	33.9	1.6	7.9	8.0	9.8	21.1	11.8	5.1	19.7	7.5
N*	672	1	72	108	13	4	2	591	62	8
fehlende Angaben	717	1	23	19	6	7	0	101	49	11

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	28.3	18.0	19.0
Standardabweichung	9.2	0.0	11.3
1. Quartil	20.0	18.0	13.0
Medianwert	28.0	18.0	16.0
3. Quartil	35.0	18.0	18.0
N*	34	2	25
<i>fehlende Angaben</i>	71	4	25
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	31.8	22.0	20.1
Standardabweichung	13.4	6.9	11.3
1. Quartil	20.0	18.0	14.0
Medianwert	30.5	18.0	17.5
3. Quartil	36.0	30.0	22.0
N*	30	3	26
<i>fehlende Angaben</i>	75	3	24
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	34.9	22.0	21.4
Standardabweichung	11.9	6.9	11.3
1. Quartil	28.0	18.0	14.0
Medianwert	32.0	18.0	18.0
3. Quartil	39.0	30.0	24.0
N*	41	3	27
<i>fehlende Angaben</i>	64	3	23
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	13.4	1.5	8.0
Standardabweichung	13.8	1.2	7.1
1. Quartil	4.0	0.6	2.3
Medianwert	5.7	1.5	5.5
3. Quartil	18.1	2.4	11.4
N*	34	2	25
<i>fehlende Angaben</i>	71	4	25

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	22.8	16.9	19.0
Standardabweichung	5.3	4.5	-
1. Quartil	18.0	14.0	19.0
Medianwert	22.0	17.0	19.0
3. Quartil	25.0	20.0	19.0
N*	6	28	1
fehlende Angaben	17	28	16
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	30.2	18.4	21.3
Standardabweichung	13.9	4.1	3.2
1. Quartil	19.0	15.0	19.0
Medianwert	26.0	18.0	20.0
3. Quartil	36.0	21.0	25.0
N*	6	27	3
fehlende Angaben	17	29	14
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	34.1	19.6	22.0
Standardabweichung	12.5	4.9	2.6
1. Quartil	22.0	16.0	20.0
Medianwert	36.0	18.0	21.0
3. Quartil	42.0	22.0	25.0
N*	9	26	3
fehlende Angaben	14	30	14
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	10.1	9.3	5.6
Standardabweichung	8.8	9.1	-
1. Quartil	4.6	3.0	5.6
Medianwert	5.5	4.6	5.6
3. Quartil	19.5	15.6	5.6
N*	6	28	1
fehlende Angaben	17	28	16

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2009), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	27.5	17.0	19.0
Standardabweichung	8.9	4.3	11.0
1. Quartil	20.0	14.0	13.0
Medianwert	25.5	17.5	16.0
3. Quartil	32.5	20.0	19.0
N*	40	30	26
fehlende Angaben	88	32	41
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	31.5	18.7	20.2
Standardabweichung	13.3	4.4	10.7
1. Quartil	20.0	15.0	14.0
Medianwert	30.0	18.0	18.0
3. Quartil	36.0	21.0	22.0
N*	36	30	29
fehlende Angaben	92	32	38
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	34.7	19.9	21.5
Standardabweichung	11.9	5.0	10.8
1. Quartil	26.0	16.0	15.0
Medianwert	32.0	18.0	18.0
3. Quartil	41.0	22.0	24.0
N*	50	29	30
fehlende Angaben	78	33	37
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	12.9	8.8	7.9
Standardabweichung	13.1	9.0	7.0
1. Quartil	4.0	2.7	2.3
Medianwert	5.6	4.3	5.5
3. Quartil	18.8	15.3	11.4
N*	40	30	26
fehlende Angaben	88	32	41

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2009)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Einnahmeart*															
injizieren	31.9	26.8	30.5	9.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	44.9	45.1	45.0	16.5	6.7	14.7	50.0	50.0	50.0	98.3	97.5	98.2	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	50.0	30.0	35.7	0.8	1.7	1.0	100.0	100.0	100.0
sniffen	23.1	28.0	24.5	73.7	93.3	77.3	0.0	20.0	14.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	216	82	298	133	30	163	4	10	14	603	120	723	10	9	19
fehlende Angaben	253	61	314	120	25	145	11	3	14	229	51	280	16	14	30

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injektion im Leben*																
ja	6.2	6.9	6.4	64.4	66.4	64.9	16.1	12.1	15.5	2.0	4.3	2.4	12.5	12.3	12.4	518
nie	93.8	93.1	93.6	35.6	33.6	35.1	83.9	87.9	84.5	98.0	95.7	97.6	87.5	87.7	87.6	3'646
N**	1'639	700	2'339	348	119	467	174	33	207	664	138	802	3'024	1'140	4'164	4'164
fehlende Angaben	1'071	423	1'494	194	54	248	79	22	101	168	33	201	1'641	626	2'267	2'267
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	1.4	1.3	1.4	40.8	43.8	41.6	9.8	0.0	8.3	1.2	2.2	1.4	6.2	5.5	6.0	250
nein	98.6	98.7	98.6	59.2	56.3	58.4	90.2	100.0	91.7	98.8	97.8	98.6	93.8	94.5	94.0	3'903
N**	1'650	700	2'350	333	112	445	173	33	206	665	138	803	3'019	1'134	4'153	4'153
fehlende Angaben	1'060	423	1'483	209	61	270	80	22	102	167	33	200	1'646	632	2'278	2'278
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.3	0.5	0.4	34.8	33.9	34.6	7.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	3.9	3.4	3.7	164
nein	99.7	99.5	99.6	65.2	66.1	65.4	93.0	100.0	94.1	100.0	100.0	100.0	96.1	96.6	96.3	4'213
N**	1'805	750	2'555	296	109	405	171	32	203	664	139	803	3'167	1'210	4'377	4'377
fehlende Angaben	905	373	1'278	246	64	310	82	23	105	168	32	200	1'498	556	2'054	2'054
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	0.0	0.0	0.0	13.1	15.4	13.8	27.3	-	27.3	0.0	0.0	0.0	12.9	12.5	12.8	15
nein	100.0	100.0	100.0	86.9	84.6	86.2	72.7	-	72.7	100.0	100.0	100.0	87.1	87.5	87.2	102
N**	7	2	9	61	26	87	11	0	11	4	3	7	85	32	117	117
fehlende Angaben	12	5	17	56	21	77	4	0	4	4	0	4	77	26	103	103
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	4.7	0.0	3.5	3.6	13.0	5.9	0.0	33.3	5.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.3	5.0	14
15-16	11.6	14.3	12.3	7.2	21.7	10.8	17.6	0.0	15.0	14.3	0.0	11.1	8.9	19.1	11.4	32
17-18	23.3	42.9	28.1	17.3	19.6	17.8	23.5	33.3	25.0	28.6	0.0	22.2	19.2	25.0	20.6	58
19-20	18.6	21.4	19.3	19.4	21.7	20.0	11.8	33.3	15.0	0.0	50.0	11.1	17.8	23.5	19.2	54
21-25	30.2	14.3	26.3	36.0	13.0	30.3	17.6	0.0	15.0	57.1	50.0	55.6	34.3	13.2	29.2	82
26-30	7.0	7.1	7.0	11.5	8.7	10.8	17.6	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	10.8	7.4	10.0	28
30-39	2.3	0.0	1.8	3.6	2.2	3.2	11.8	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	3.2	9
ab 40	2.3	0.0	1.8	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	4
N**	43	14	57	139	46	185	17	3	20	7	2	9	213	68	281	281
fehlende Angaben	58	34	92	85	33	118	11	1	12	6	4	10	165	72	237	237

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	22.2	30.4	44.8	40.0	23.8	0.0	26.6	13.5	30.8
Cocktail	0.4	-	4.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Heroin	2.3	11.1	4.5	12.8	10.0	23.8	0.0	2.2	0.0	0.0
Methadon	1.4	11.1	20.9	7.6	0.0	23.8	0.0	0.4	0.0	0.0
andere Opiate	0.7	0.0	2.6	0.6	10.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
Kokain	6.4	22.2	30.2	0.0	30.0	23.8	0.0	9.9	1.9	0.0
Crack, Freebase	0.2	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	0.0	3.2	9.3	0.0	4.8	100.0	2.4	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.9	0.0	2.9	11.0	0.0	4.8	100.0	3.2	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	1.9	1.2	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.4	44.4	18.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.5	0.0	2.6	5.8	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.5	0.0	1.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	11.2	11.1	36.0	38.4	30.0	9.5	0.0	-	9.6	7.7
Tabak	30.6	33.3	34.4	32.6	30.0	23.8	0.0	32.2	-	7.7
andere Substanz	0.5	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	0.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	58.2	22.2	22.8	23.8	40.0	23.8	0.0	45.4	78.8	61.5
N**	1'687	9	378	172	10	21	1	537	52	13
<i>fehlende Angaben</i>	1'023	3	152	81	12	11	1	295	40	6

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	50.0	24.6	47.5	42.9	39.1	-	26.9	4.3	50.0
Cocktail	0.2	-	5.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.1	0.0	9.3	10.0	0.0	4.3	-	3.8	0.0	0.0
Methadon	2.3	0.0	17.8	5.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
Kokain	4.2	0.0	32.2	0.0	21.4	13.0	-	15.4	0.0	20.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
Amphetamine	0.3	0.0	5.1	25.0	14.3	0.0	-	5.8	0.0	10.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.3	0.0	5.1	30.0	21.4	0.0	-	6.7	0.0	20.0
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	0.0	21.4	4.3	-	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
Benzodiazepine	8.4	50.0	26.3	7.5	0.0	8.7	-	0.0	0.0	20.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	10.0
LSD	0.0	0.0	1.7	5.0	7.1	0.0	-	1.0	0.0	10.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.8	7.5	0.0	0.0	-	1.9	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	1.0	0.0	0.0
Cannabis	5.7	0.0	34.7	42.5	50.0	4.3	-	-	8.5	20.0
Tabak	31.4	0.0	32.2	32.5	21.4	21.7	-	30.8	-	20.0
andere Substanz	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	-	1.0	0.0	0.0
Essstörungen	1.8	0.0	1.7	5.0	0.0	0.0	-	0.0	2.1	0.0
anderes suchtägliches Problem	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	54.1	0.0	20.3	25.0	21.4	34.8	-	42.3	85.1	30.0
N**	663	2	118	40	14	23	0	104	47	10
fehlende Angaben	460	2	51	15	4	9	0	67	37	4

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	27.3	29.0	45.3	41.7	31.8	0.0	26.7	9.1	39.1
Cocktail	0.3	-	4.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Heroin	2.2	9.1	5.6	12.3	4.2	13.6	0.0	2.5	0.0	0.0
Methadon	1.7	9.1	20.2	7.1	0.0	13.6	0.0	0.3	0.0	0.0
andere Opiate	0.5	0.0	2.6	0.5	4.2	2.3	0.0	0.5	0.0	0.0
Kokain	5.8	18.2	30.6	0.0	25.0	18.2	0.0	10.8	1.0	8.7
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Amphetamine	0.8	0.0	3.6	12.3	8.3	2.3	100.0	3.0	0.0	4.3
MDMA und verwandte Stoffe	0.7	0.0	3.4	14.6	12.5	2.3	100.0	3.7	0.0	8.7
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.2	1.4	12.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.3	0.0	1.8	0.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3
Benzodiazepine	4.1	45.5	20.4	5.7	0.0	4.5	0.0	0.6	1.0	8.7
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.3	0.0	4.3
LSD	0.3	0.0	2.4	5.7	8.3	0.0	0.0	2.3	0.0	4.3
andere Halluzinogene	0.3	0.0	1.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Cannabis	9.7	9.1	35.7	39.2	41.7	6.8	0.0	-	9.1	13.0
Tabak	30.8	27.3	33.9	32.5	25.0	22.7	0.0	32.0	-	13.0
andere Substanz	0.6	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0
Essstörungen	0.6	0.0	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.4	0.0	0.2	0.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.0	18.2	22.2	24.1	29.2	29.5	0.0	44.9	81.8	47.8
N**	2'350	11	496	212	24	44	1	641	99	23
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'483</i>	<i>5</i>	<i>203</i>	<i>96</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>362</i>	<i>77</i>	<i>10</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	7.8	0.0	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	2.9
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	3.1	0.0	11.8
Tabak	10.9	0.0	8.8
andere Substanz	1.6	0.0	0.0
pathologisches Spielen	-	0.0	2.9
Essstörungen	1.6	-	2.9
anderes suchtähnliches Problem	0.0	25.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	78.1	75.0	79.4
N**	64	4	34
<i>fehlende Angaben</i>	41	2	16

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Frauen

Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	16.7	15.2	12.5
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	3.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	3.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	8.3	3.0	0.0
Tabak	8.3	6.1	0.0
andere Substanz	8.3	0.0	0.0
pathologisches Spielen	-	0.0	12.5
Essstörungen	0.0	-	12.5
anderes suchtähnliches Problem	0.0	3.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	66.7	72.7	62.5
N**	12	33	8
<i>fehlende Angaben</i>	11	23	9

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2009), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	9.2	13.5	2.4
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	2.7	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	2.7	2.4
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	3.9	2.7	9.5
Tabak	10.5	5.4	7.1
andere Substanz	2.6	0.0	0.0
pathologisches Spielen	-	0.0	4.8
Essstörungen	1.3	-	4.8
anderes suchtähnliches Problem	0.0	5.4	0.0
kein weiteres Suchtproblem	76.3	73.0	76.2
N**	76	37	42
<i>fehlende Angaben</i>	52	25	25

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	12.4	10.7	11.9	17.6	19.8	18.1	10.3	14.3	10.9	14.7	13.6	14.5	13.9	14.0	13.9	520
1-mal pro Monat oder weniger	3.6	4.3	3.8	13.7	23.5	16.0	13.5	21.4	14.8	25.4	32.0	26.5	10.1	10.5	10.2	380
2-4-mal pro Monat	5.9	6.3	6.0	21.4	25.9	22.4	25.2	17.9	24.0	38.2	36.9	38.0	15.3	12.2	14.5	542
2-3-mal pro Woche	18.0	17.7	17.9	17.6	9.9	15.7	26.5	35.7	27.9	15.8	9.7	14.8	17.8	16.8	17.5	655
4-mal oder mehr pro Woche	60.2	61.0	60.4	29.8	21.0	27.7	24.5	10.7	22.4	6.0	7.8	6.3	42.9	46.5	43.9	1'638
N**	1'704	672	2'376	262	81	343	155	28	183	532	103	635	2'763	972	3'735	3'735
<i>fehlende Angaben</i>	1'006	451	1'457	280	92	372	98	27	125	300	68	368	1'902	794	2'696	2'696
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.6	6.2	7.2	46.2	50.8	47.2	41.0	26.3	39.0	57.1	53.8	56.6	23.5	18.2	22.1	658
3 oder 4	17.9	16.7	17.6	30.8	22.0	28.7	39.3	36.8	39.0	30.5	29.5	30.3	22.8	19.2	21.9	651
5 oder 6	20.9	25.8	22.3	9.2	20.3	11.8	7.4	21.1	9.2	8.1	10.3	8.5	16.4	23.1	18.1	540
7 bis 9	19.3	23.2	20.4	4.6	5.1	4.7	8.2	5.3	7.8	2.5	3.8	2.8	13.8	18.2	14.9	444
10 oder mehr	34.3	28.1	32.6	9.2	1.7	7.5	4.1	10.5	5.0	1.8	2.6	1.9	23.5	21.4	23.0	684
N**	1'418	569	1'987	195	59	254	122	19	141	394	78	472	2'201	776	2'977	2'977
<i>fehlende Angaben</i>	1'292	554	1'846	347	114	461	131	36	167	438	93	531	2'464	990	3'454	3'454
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	15.3	14.8	15.2	42.7	53.1	45.1	34.6	31.8	34.2	51.8	61.8	53.4	27.5	27.6	27.6	902
weniger als 1-mal pro Monat	9.0	12.0	9.8	23.0	17.2	21.7	28.5	22.7	27.6	28.9	28.1	28.8	15.0	14.5	14.9	488
1-mal pro Monat	10.4	9.5	10.1	11.3	7.8	10.5	18.5	13.6	17.8	10.4	1.1	8.9	10.8	8.2	10.1	332
1-mal pro Woche	23.7	22.0	23.2	11.3	9.4	10.8	13.1	31.8	15.8	8.0	6.7	7.8	18.5	18.7	18.6	608
fast jeden Tag	41.7	41.7	41.7	11.7	12.5	11.9	5.4	0.0	4.6	0.9	2.2	1.1	28.1	30.9	28.8	943
N**	1'539	600	2'139	213	64	277	130	22	152	450	89	539	2'419	854	3'273	3'273
<i>fehlende Angaben</i>	1'171	523	1'694	329	109	438	123	33	156	382	82	464	2'246	912	3'158	3'158

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	29.4	34.1	30.7	5.0	1.3	4.1	9.0	10.0	9.2	21.0	25.0	21.7	23.2	26.4	24.0	672
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	1.0	0.9	0.5	0.0	0.3	1.6	0.0	1.4	4.8	2.9	4.4	1.8	1.1	1.6	45
2-3 Tage pro Woche	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.8	0.0	0.7	5.4	3.8	5.1	1.7	1.3	1.6	44
4-6 Tage pro Woche	0.7	0.7	0.7	0.0	1.3	0.3	0.8	0.0	0.7	3.0	1.0	2.6	1.2	0.8	1.1	31
einmal täglich	1.0	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	0.0	0.7	4.0	1.9	3.6	1.8	1.1	1.6	44
mehrmals täglich	67.8	62.1	66.1	93.2	96.1	93.9	86.9	90.0	87.3	61.9	65.4	62.5	70.4	69.3	70.1	1'960
N**	1'049	419	1'468	219	76	295	122	20	142	504	104	608	2'047	749	2'796	2'796
fehlende Angaben	1'661	704	2'365	323	97	420	131	35	166	328	67	395	2'618	1'017	3'635	3'635
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	14.0	16.0	14.6	11.1	7.8	10.3	21.4	29.4	22.6	50.6	45.1	49.6	24.4	21.0	23.5	443
11 bis 20	39.8	47.5	41.9	54.0	43.8	51.4	57.1	58.8	57.4	39.9	43.7	40.5	43.0	46.1	43.8	826
21 bis 30	28.9	26.9	28.3	24.3	34.4	26.9	19.4	5.9	17.4	8.4	7.0	8.2	21.8	23.5	22.2	419
31 und mehr	17.3	9.7	15.2	10.6	14.1	11.5	2.0	5.9	2.6	1.1	4.2	1.6	10.8	9.5	10.5	197
N**	648	238	886	189	64	253	98	17	115	356	71	427	1'399	486	1'885	1'885
fehlende Angaben	93	38	131	19	11	30	13	1	14	42	7	49	174	65	239	239

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	34.2	100.0	78.1	79.8	40.0	57.1	100.0	49.2	33.3	88.9
zeitlich begrenzte Abstinenz	22.3	0.0	3.1	6.1	20.0	7.1	0.0	9.1	11.1	0.0
kontrollierter Konsum	26.7	0.0	8.3	3.0	0.0	28.6	0.0	23.4	0.0	11.1
keine Beschränkung beabsichtigt	2.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	22.2	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.6	0.0	7.5	10.1	40.0	7.1	0.0	11.7	22.2	0.0
anderes	0.4	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.1	0.0
N**	1'157	5	228	99	5	14	1	197	9	9
<i>fehlende Angaben</i>	1'553	7	302	154	17	18	1	635	83	10

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	39.9	0.0	81.8	76.5	60.0	73.7	-	53.8	50.0	42.9
zeitlich begrenzte Abstinenz	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	12.8	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	28.3	0.0	7.8	5.9	20.0	5.3	-	17.9	0.0	14.3
keine Beschränkung beabsichtigt	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	50.0	14.3
bis jetzt nicht festgelegt	13.8	100.0	10.4	17.6	20.0	15.8	-	15.4	0.0	28.6
anderes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-	0.0	0.0	0.0
N**	414	1	77	17	5	19	0	39	4	7
<i>fehlende Angaben</i>	709	3	92	38	13	13	0	132	80	7

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2009), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	35.7	83.3	79.0	79.3	50.0	66.7	100.0	50.0	38.5	68.8
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.7	0.0	2.3	5.2	10.0	3.0	0.0	9.7	7.7	0.0
kontrollierter Konsum	27.1	0.0	8.2	3.4	10.0	15.2	0.0	22.5	0.0	12.5
keine Beschränkung beabsichtigt	2.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	30.8	6.3
bis jetzt nicht festgelegt	13.6	16.7	8.2	11.2	30.0	12.1	0.0	12.3	15.4	12.5
anderes	0.4	0.0	1.3	0.9	0.0	3.0	0.0	1.7	7.7	0.0
N**	1'571	6	305	116	10	33	1	236	13	16
<i>fehlende Angaben</i>	2'262	10	394	192	30	31	1	767	163	17

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23a Psychische Probleme im Leben (2009), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	32.0	20.0	36.6	33.8	33.3	53.3	-	14.5	0.0	44.4
schwere Angst- und Spannungszustände	27.6	20.0	29.0	31.2	33.3	60.0	-	15.6	0.0	55.6
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	14.1	0.0	21.5	14.3	33.3	33.3	-	16.8	0.0	22.2
Halluzinationen	2.4	20.0	5.9	2.6	33.3	6.7	-	4.5	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	13.4	20.0	19.4	15.6	0.0	13.3	-	12.3	37.5	66.7
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	13.5	40.0	13.4	14.3	0.0	33.3	-	5.0	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	13.9	0.0	19.9	15.6	33.3	46.7	-	10.6	0.0	22.2
Selbstmordversuche	6.6	0.0	12.9	9.1	0.0	33.3	-	5.0	0.0	22.2
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.1	0.0	3.2	2.6	0.0	6.7	-	1.7	0.0	0.0
keine	39.5	20.0	34.9	44.2	33.3	6.7	-	59.2	62.5	22.2
N**	957	5	186	77	3	15	0	179	8	9
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'753</i>	<i>7</i>	<i>344</i>	<i>176</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>653</i>	<i>84</i>	<i>10</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23b Psychische Probleme im Leben (2009), Frauen
Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	47.0	100.0	38.6	43.8	0.0	71.4	-	45.9	25.0	66.7
schwere Angst- und Spannungszustände	39.7	100.0	40.0	43.8	0.0	92.9	-	27.0	25.0	66.7
Schw. mit Verständnis/Gedächtn./Konzentr.	14.6	0.0	10.0	31.3	20.0	35.7	-	21.6	25.0	33.3
Halluzinationen	3.0	0.0	2.9	18.8	0.0	7.1	-	13.5	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	8.9	0.0	11.4	6.3	20.0	21.4	-	16.2	0.0	0.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	21.4	0.0	28.6	31.3	20.0	28.6	-	13.5	25.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	19.7	0.0	17.1	6.3	20.0	57.1	-	27.0	25.0	50.0
Selbstmordversuche	10.3	0.0	14.3	0.0	20.0	28.6	-	21.6	25.0	16.7
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.2	0.0	4.3	6.3	0.0	0.0	-	5.4	0.0	0.0
keine	23.0	0.0	34.3	37.5	60.0	0.0	-	35.1	50.0	33.3
N**	370	1	70	16	5	14	0	37	4	6
<i>fehlende Angaben</i>	753	3	99	39	13	18	0	134	80	8

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23c Psychische Probleme im Leben (2009), Männer & Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	36.2	33.3	37.1	35.5	12.5	62.1	-	19.9	8.3	53.3
schwere Angst- und Spannungszustände	31.0	33.3	32.0	33.3	12.5	75.9	-	17.6	8.3	60.0
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	14.2	0.0	18.4	17.2	25.0	34.5	-	17.6	8.3	26.7
Halluzinationen	2.6	16.7	5.1	5.4	12.5	6.9	-	6.0	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	12.1	16.7	17.2	14.0	12.5	17.2	-	13.0	25.0	40.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	15.7	33.3	17.6	17.2	12.5	31.0	-	6.5	8.3	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	15.5	0.0	19.1	14.0	25.0	51.7	-	13.4	8.3	33.3
Selbstmordversuche	7.6	0.0	13.3	7.5	12.5	31.0	-	7.9	8.3	20.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.4	0.0	3.5	3.2	0.0	3.4	-	2.3	0.0	0.0
keine	34.9	16.7	34.8	43.0	50.0	3.4	-	55.1	58.3	26.7
N**	1'327	6	256	93	8	29	0	216	12	15
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'506</i>	<i>10</i>	<i>443</i>	<i>215</i>	<i>32</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>787</i>	<i>164</i>	<i>18</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2009)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	26.5	27.0	26.9	255
Tochter/Sohn	10.8	14.2	13.5	128
Schwester/Bruder	5.4	4.8	5.0	47
Ehe-/LebenspartnerIn	39.7	46.7	45.2	429
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.0	2.6	2.2	21
KollegIn/FreundIn	2.0	2.1	2.1	20
ArbeitgeberIn/LehrerIn	2.9	0.5	1.1	10
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	11.8	2.0	4.1	39
N**	204	745	949	949
<i>fehlende Angaben</i>	9	38	47	47

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2009)

Angehörige					
Total			Total		
	%	N		%	N
Hauptproblem der Drittperson*			Weitere Probleme der Drittperson***		
Alkohol	69.2	660	Alkohol	25.6	91
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.8	8	Cocktail (Heroin und Kokain)	1.4	5
Heroin	4.8	46	Heroin	3.4	12
Methadon	0.2	2	Methadon	3.4	12
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.2	2	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	1.1	4
Kokain	2.8	27	Kokain	8.4	30
Crack, Freebase	0.1	1	Crack, Freebase	0.3	1
Amphetamine	0.5	5	Amphetamine	1.4	5
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.1	4
andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0	andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0
Barbiturate	1.5	14	Barbiturate	0.3	1
Benzodiazepine	0.5	5	Benzodiazepine	5.6	20
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.4	5
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
andere Halluzinogene	0.7	7	andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.8	3
Cannabis	10.7	102	Cannabis	20.2	72
Tabak	0.6	6	Tabak	22.8	81
andere Substanz	0.5	5	andere Substanz	0.0	0
pathologisches Spielen	1.6	15	pathologisches Spielen	0.8	3
Essstörungen	1.5	14	Essstörungen	1.4	5
anderes suchtägliches Problem	3.6	34	anderes suchtägliches Problem	3.7	13
			keine	31.5	112
N**	954	954	N**	356	356
<i>fehlende Angaben</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>fehlende Angaben</i>	<i>639</i>	<i>639</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2009)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Eigene Probleme*				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	3.5	9.7	8.7	32
eigene suchtähnliche Probleme	3.5	0.6	1.1	4
eigene somatische Probleme	7.0	5.8	6.0	22
eigene psychische Probleme	21.1	33.9	31.9	117
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	35.1	46.5	44.7	164
Familienprobleme	45.6	54.8	53.4	196
finanzielle Probleme	12.3	11.9	12.0	44
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	1.8	3.5	3.3	12
Wohnprobleme	8.8	4.2	4.9	18
Gewaltprobleme (als Opfer)	8.8	10.0	9.8	36
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	1.8	1.3	1.4	5
rechtliche Probleme	0.0	2.9	2.5	9
anderes	0.0	0.6	0.5	2
keine	24.6	15.5	16.9	62
N**	57	310	367	367
<i>fehlende Angaben</i>	<i>156</i>	<i>473</i>	<i>629</i>	<i>629</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer			69.6			72.9			76.2			83.2			22.0			64.6	4'226
Frauen			30.4			27.1			23.8			16.8			78.0			35.4	2'314
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'307	1'007	3'314	488	181	669	243	76	319	717	145	862	203	718	921	4'226	2'314	6'540	6'540
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.4	4.2	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	54
15-19	1.9	2.7	2.1	2.7	4.4	3.1	3.3	18.4	6.9	60.8	57.2	60.2	9.0	3.1	4.4	13.2	7.6	11.2	731
20-24	4.4	3.3	4.1	12.7	16.6	13.8	16.5	19.7	17.2	14.9	20.7	15.9	3.5	4.3	4.1	8.3	7.2	7.9	516
25-29	6.3	5.8	6.2	18.0	21.5	19.0	23.5	23.7	23.5	8.9	8.3	8.8	3.0	6.4	5.7	9.5	8.6	9.2	598
30-34	8.8	6.4	8.1	16.6	18.2	17.0	20.6	18.4	20.1	5.3	4.1	5.1	2.5	9.2	7.8	9.5	8.5	9.2	600
35-39	12.7	7.8	11.2	20.7	15.5	19.3	17.7	6.6	15.0	2.0	2.8	2.1	9.0	10.8	10.4	11.9	9.4	11.0	719
40-44	15.2	16.5	15.6	16.2	15.5	16.0	8.2	7.9	8.2	2.1	2.1	2.1	8.0	15.7	14.0	12.2	14.4	13.0	847
45-49	14.8	17.6	15.6	8.8	6.6	8.2	7.0	1.3	5.6	1.3	1.4	1.3	18.4	17.1	17.4	11.3	14.5	12.4	810
50-54	12.9	16.4	14.0	3.5	1.1	2.8	1.6	2.6	1.9	0.1	0.0	0.1	14.9	10.8	11.7	8.6	11.2	9.5	620
55-59	10.3	10.2	10.3	0.4	0.6	0.4	1.6	0.0	1.3	0.3	0.0	0.2	10.0	10.2	10.2	6.5	8.3	7.1	465
60-64	6.5	7.0	6.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	5.7	4.2	4.7	4.4	288
65-69	3.3	3.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	3.1	3.7	2.2	2.6	2.4	154
70 -74	1.9	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	2.3	1.2	1.3	1.2	79
75 und mehr	0.9	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	2.1	0.6	1.0	0.8	49
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	6'530
fehlende Angaben	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	10
Alter																			
Mittelwert	45.2	46.4	45.6	34.9	32.9	34.4	32.6	28.9	31.7	21.1	21.1	21.1	47.4	44.8	45.4	38.7	41.8	39.8	
Standardabweichung	12.7	12.6	12.6	8.8	8.6	8.8	8.6	9.5	8.9	7.0	6.9	7.0	16.1	13.4	14.0	14.7	14.3	14.6	
1. Quartil	36.7	39.1	37.3	28.2	26.0	27.6	25.6	21.8	25.0	16.9	16.7	16.9	39.0	35.8	36.5	26.5	30.7	27.8	
Medianwert	45.4	47.4	45.9	35.0	32.1	34.3	31.2	26.5	30.6	18.2	18.0	18.2	48.7	44.9	46.0	38.7	42.8	40.3	
3. Quartil	54.2	54.2	54.2	41.2	39.9	40.7	37.8	34.3	37.1	23.2	23.4	23.2	57.2	54.0	54.5	49.3	51.5	50.1	
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	
fehlende Angaben	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	41.0	32.5	38.4	76.9	76.1	76.7	72.9	69.8	72.2	95.2	92.4	94.6	18.9	23.9	22.8	54.9	39.6	49.3	2'821
verheiratet	31.7	30.7	31.4	10.7	8.2	10.1	12.5	9.4	11.8	2.9	4.5	3.2	62.2	53.9	55.7	25.1	33.4	28.1	1'608
getrennt	5.8	6.8	6.1	3.9	3.7	3.8	2.1	3.8	2.4	0.9	0.0	0.7	3.9	3.7	3.7	4.4	4.7	4.5	260
geschieden	19.8	25.6	21.6	7.4	9.0	7.8	10.9	15.1	11.8	1.0	2.3	1.3	12.2	14.7	14.2	14.2	18.5	15.7	900
verwitwet	1.5	4.1	2.3	0.3	1.5	0.6	0.0	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.6	1.0	2.9	1.7	97
reg. Partnerschaft	0.2	0.3	0.3	0.8	1.5	1.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.8	0.1	0.6	1.2	1.1	0.4	0.8	0.5	31
N**	2'095	906	3'001	363	134	497	192	53	245	578	132	710	180	675	855	3'646	2'071	5'717	5'717
fehlende Angaben	212	101	313	125	47	172	51	23	74	139	13	152	23	43	66	580	243	823	823
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.3	9.7	9.4	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	9.7	8.9	5.8	7.6	6.4	382
Umland der Grossstadtzentren	14.9	17.0	15.6	4.1	2.2	3.6	7.5	7.1	7.5	3.5	1.5	3.1	16.7	13.9	14.5	11.1	12.7	11.6	692
Mittelzentren	13.3	14.3	13.6	22.9	23.9	23.2	29.1	30.4	29.4	26.8	23.7	26.2	19.9	19.0	19.2	18.5	18.2	18.4	1'095
Kleinzentren	33.8	32.6	33.5	49.9	39.9	47.3	39.2	39.3	39.2	37.7	36.3	37.4	27.4	29.8	29.3	36.5	33.7	35.5	2'110
rural	28.6	26.4	27.9	21.6	33.3	24.7	24.1	23.2	23.9	32.1	38.5	33.2	30.1	27.6	28.1	28.1	27.9	28.0	1'666
N**	2'157	946	3'103	393	138	531	199	56	255	608	135	743	186	699	885	3'790	2'155	5'945	5'945
fehlende Angaben	150	61	211	95	43	138	44	20	64	109	10	119	17	19	36	436	159	595	595

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.0	36.8	38.3	43.5	34.5	41.1	48.8	25.0	43.6	10.7	16.1	11.7	14.0	15.3	15.0	32.8	27.7	31.0	1'274
mit Eltern/Elternteil	7.2	4.0	6.2	16.7	11.5	15.3	12.6	19.4	14.1	72.2	55.4	69.0	6.1	4.2	4.6	21.3	10.2	17.3	713
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.5	13.2	5.0	1.2	3.4	1.8	1.6	5.6	2.5	0.6	1.8	0.8	8.8	17.6	15.9	1.6	12.6	5.5	227
mit PartnerIn (ohne Kinder)	23.9	24.6	24.1	13.4	29.9	17.7	11.8	16.7	12.9	2.3	7.1	3.2	29.8	24.8	25.8	18.6	22.9	20.2	829
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.9	14.6	18.3	11.0	9.2	10.5	15.0	8.3	13.5	2.9	0.9	2.5	38.6	34.4	35.2	16.3	18.8	17.2	707
mit anderen Verw./Angeh.	1.0	0.5	0.8	0.8	0.0	0.6	0.8	5.6	1.8	1.9	1.8	1.8	0.0	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	46
mit FreundInnen (WG)	2.5	2.9	2.6	3.7	2.3	3.3	3.9	0.0	3.1	2.5	3.6	2.7	1.8	1.1	1.2	2.6	2.3	2.5	103
anderes	5.1	3.6	4.6	9.8	9.2	9.6	5.5	19.4	8.6	7.0	13.4	8.2	0.9	1.1	1.0	5.6	4.4	5.2	213
N**	1'503	631	2'134	246	87	333	127	36	163	485	112	597	114	471	585	2'650	1'462	4'112	4'112
fehlende Angaben	804	376	1'180	242	94	336	116	40	156	232	33	265	89	247	336	1'576	852	2'428	2'428
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	92.6	92.8	92.6	77.4	78.1	77.6	86.4	75.0	83.8	90.9	89.9	90.8	98.4	97.0	97.3	90.9	92.5	91.4	4'061
instabile Wohnsituation	5.3	5.3	5.3	19.2	19.0	19.1	10.4	15.9	11.6	5.7	7.3	6.0	0.8	3.0	2.6	6.8	6.1	6.5	290
Institution	2.1	1.9	2.0	3.4	2.9	3.3	3.2	9.1	4.5	3.3	2.8	3.2	0.8	0.0	0.2	2.4	1.5	2.0	91
N**	1'612	683	2'295	292	105	397	154	44	198	508	109	617	127	495	622	2'878	1'564	4'442	4'442
fehlende Angaben	695	324	1'019	196	76	272	89	32	121	209	36	245	76	223	299	1'348	750	2'098	2'098
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	29.9	35.0	31.4	48.7	35.1	44.9	40.4	26.1	37.6	68.2	52.2	64.9	14.7	21.2	19.8	36.3	31.4	34.5	1'095
zeitweilige Beziehung(en)	5.0	5.4	5.1	4.2	9.5	5.7	7.4	8.7	7.7	8.6	13.0	9.5	2.9	1.0	1.4	5.3	4.6	5.0	160
festе Beziehung, getrennt lebend	11.7	13.0	12.1	12.2	10.8	11.8	13.8	30.4	17.1	12.4	18.8	13.7	5.9	9.8	9.0	11.6	13.1	12.2	387
festе Beziehung, zus. lebend	53.4	46.6	51.4	34.9	44.6	37.6	38.3	34.8	37.6	10.9	15.9	11.9	76.5	68.0	69.7	46.7	50.9	48.3	1'531
N**	1'228	517	1'745	189	74	263	94	23	117	267	69	336	102	397	499	2'001	1'172	3'173	3'173
fehlende Angaben	1'079	490	1'569	299	107	406	149	53	202	450	76	526	101	321	422	2'225	1'142	3'367	3'367

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	5.2	8.5	6.2	10.8	14.7	11.8	8.7	5.6	8.1	22.3	21.3	22.1	8.2	6.5	6.8	9.9	9.8	9.9	389
obligatorische Schule	12.5	16.0	13.5	31.5	38.9	33.4	15.4	50.0	22.2	52.1	46.3	51.1	8.2	13.5	12.4	22.8	20.6	22.1	866
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	3.3	3.3	3.3	1.8	4.2	2.4	4.7	5.6	4.9	3.3	5.6	3.7	4.1	3.0	3.2	3.3	3.7	3.4	134
Berufslehre, Berufsschule	59.5	53.7	57.8	49.5	36.8	46.3	54.4	30.6	49.7	19.3	20.4	19.5	49.0	56.6	55.0	48.9	48.6	48.8	1'916
Maturität-, Diplommittelschule	2.9	5.4	3.6	3.2	2.1	2.9	5.4	5.6	5.4	2.0	1.9	1.9	6.1	5.1	5.3	3.3	5.1	3.9	154
Lehrerseminar	1.1	1.6	1.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	3.1	3.8	3.6	0.8	2.1	1.2	48
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.9	5.6	6.6	1.1	1.1	1.1	7.4	2.8	6.5	0.4	1.9	0.6	13.3	4.3	6.2	5.3	4.7	5.1	199
höhere Fachschule	1.7	0.7	1.4	0.4	1.1	0.5	2.0	0.0	1.6	0.4	0.9	0.5	2.0	0.3	0.6	1.3	0.5	1.1	42
Fachhochschule	3.0	1.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	2.3	1.8	1.5	1.7	66
Universität, Hochschule	3.8	4.0	3.8	1.1	1.1	1.1	1.3	0.0	1.1	0.2	0.0	0.2	4.1	4.6	4.5	2.7	3.3	2.9	113
N**	1'439	574	2'013	279	95	374	149	36	185	512	108	620	98	371	469	2'637	1'290	3'927	3'927
fehlende Angaben	868	433	1'301	209	86	295	94	40	134	205	37	242	105	347	452	1'589	1'024	2'613	2'613
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	54.9	42.7	51.3	30.5	26.3	29.4	70.7	33.3	62.0	22.4	23.1	22.5	67.6	57.8	59.9	48.0	45.1	47.0	2'229
Ersparnisse	1.3	0.3	1.0	1.0	0.0	0.7	1.9	0.0	1.5	0.2	0.9	0.3	0.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.8	39
Rente (AHV/IV u.a.)	17.7	17.9	17.8	14.6	20.2	16.1	7.6	14.6	9.3	2.9	2.6	2.9	20.4	12.3	14.1	14.0	14.9	14.3	678
Sozialhilfe/Fürsorge	14.1	13.7	14.0	38.1	36.8	37.8	11.5	27.1	15.1	6.2	15.4	7.9	3.5	2.1	2.4	14.1	11.4	13.2	624
Arbeitslosenversicherung	7.1	5.9	6.7	7.6	7.0	7.5	3.8	6.3	4.4	3.1	2.6	3.0	2.8	0.8	1.2	6.0	4.0	5.3	250
durch PartnerIn	0.9	14.0	4.8	1.3	0.9	1.2	0.6	4.2	1.5	0.4	0.9	0.5	0.7	21.4	16.9	0.9	13.6	5.4	255
durch Eltern/Angehörige	2.3	3.2	2.5	2.2	2.6	2.3	2.5	12.5	4.9	63.5	51.3	61.3	3.5	3.9	3.8	14.1	8.1	12.0	570
dealen/mischeln	0.1	0.0	0.0	1.3	2.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	9
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.1	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	1.5	2.3	1.8	3.2	2.6	3.0	1.3	2.1	1.5	1.1	3.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.6	2.2	1.8	86
N**	1'708	728	2'436	315	114	429	157	48	205	545	117	662	142	519	661	3'068	1'676	4'744	4'744
fehlende Angaben	599	279	878	173	67	240	86	28	114	172	28	200	61	199	260	1'158	638	1'796	1'796
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	52.0	29.1	45.2	28.4	14.9	24.9	63.2	23.3	55.8	17.8	14.9	17.3	61.0	42.3	46.4	44.2	32.1	40.0	1'638
Teilzeitarbeit	5.0	18.1	8.9	4.4	8.0	5.3	8.3	6.7	8.0	2.8	4.4	3.1	4.2	27.0	22.1	4.6	18.0	9.3	380
Gelegenheitsarbeit	1.2	1.4	1.3	2.4	2.3	2.4	0.8	3.3	1.2	0.6	2.6	1.0	0.8	1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	51
in Ausbildung	2.2	3.0	2.5	2.4	3.4	2.7	4.5	13.3	6.1	63.0	56.1	61.7	4.2	4.7	4.6	14.9	9.6	13.0	534
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	22.2	30.8	24.8	20.4	31.0	23.1	10.5	23.3	12.9	4.0	7.9	4.8	20.3	20.5	20.4	17.3	24.4	19.8	810
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	11.3	11.6	11.4	20.4	19.5	20.2	7.5	16.7	9.2	6.3	5.3	6.1	4.2	1.6	2.2	10.5	8.3	9.7	398
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.3	0.3	0.3	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	14
anderes	5.8	5.6	5.7	20.0	20.7	20.2	5.3	13.3	6.7	5.5	8.8	6.1	5.1	2.6	3.1	6.9	5.8	6.5	267
N**	1'486	623	2'109	250	87	337	133	30	163	494	114	608	118	430	548	2'667	1'425	4'092	4'092
fehlende Angaben	821	384	1'205	238	94	332	110	46	156	223	31	254	85	288	373	1'559	889	2'448	2'448

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	34.3	45.4	37.5	53.2	73.3	57.8	19.4	46.2	24.0	15.3	25.0	16.8	19.6	23.4	22.7	33.0	38.5	34.9	622
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.4	0.7	1.2	4.5	4.4	4.5	1.6	0.0	1.3	35.1	25.0	33.5	4.3	1.5	2.0	6.1	2.8	4.9	88
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.7	4.1	3.8	7.1	2.2	6.0	6.5	7.7	6.7	3.8	8.3	4.5	0.0	2.4	2.0	4.0	3.7	3.9	70
angelernte(r) ArbeiterIn	4.4	5.4	4.7	8.4	4.4	7.5	8.1	7.7	8.0	1.5	4.2	1.9	0.0	3.9	3.2	5.4	4.9	5.2	93
gelernte(r) ArbeiterIn	10.3	3.7	8.4	15.6	4.4	13.1	17.7	0.0	14.7	8.4	4.2	7.7	6.5	11.2	10.4	10.9	6.1	9.3	165
VorarbeiterIn	3.8	0.3	2.8	0.6	0.0	0.5	4.8	0.0	4.0	0.8	0.0	0.6	2.2	0.0	0.4	2.9	0.2	2.0	35
einfache(r) Angestellte(r)	17.3	27.8	20.4	7.1	8.9	7.5	16.1	15.4	16.0	5.3	4.2	5.2	8.7	27.3	23.9	14.2	24.9	17.9	319
mittl. Angestellte(r)/Kader	10.2	4.4	8.5	2.6	2.2	2.5	11.3	7.7	10.7	0.0	4.2	0.6	8.7	12.7	12.0	7.7	7.1	7.5	134
leit. Angestellte(r)/Kader	3.5	1.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.7	0.8	0.0	0.6	8.7	3.4	4.4	2.7	1.6	2.4	42
selbständig	9.4	5.4	8.3	0.6	0.0	0.5	9.7	7.7	9.3	2.3	0.0	1.9	34.8	8.8	13.5	8.2	5.8	7.4	132
SchülerIn/StudentIn	0.7	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	26.0	25.0	25.8	6.5	2.4	3.2	4.1	2.9	3.7	66
andere Stellung	1.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.3	0.8	0.0	0.6	0.0	2.9	2.4	0.7	1.5	1.0	17
N**	709	295	1'004	154	45	199	62	13	75	131	24	155	46	205	251	1'165	618	1'783	1'783
fehlende Angaben	1'598	712	2'310	334	136	470	181	63	244	586	121	707	157	513	670	3'061	1'696	4'757	4'757
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	26.0	38.9	29.4	19.4	14.8	18.4	18.4	25.0	19.6	42.6	41.2	42.4	17.6	11.7	12.8	26.4	29.6	27.3	308
weniger als 1000 Fr.	3.7	6.9	4.6	19.4	22.2	20.0	10.5	25.0	13.0	33.3	35.3	33.6	11.8	7.8	8.5	10.8	9.8	10.5	118
1001 bis 2000 Fr.	6.0	9.7	7.0	17.3	14.8	16.8	13.2	12.5	13.0	7.4	11.8	8.0	0.0	9.1	7.4	7.4	10.7	8.3	94
2001 bis 3000 Fr.	15.4	22.3	17.2	22.4	33.3	24.8	13.2	25.0	15.2	2.8	0.0	2.4	0.0	9.1	7.4	13.8	18.6	15.2	171
3001 bis 4000 Fr.	13.5	8.6	12.2	12.2	7.4	11.2	13.2	0.0	10.9	5.6	0.0	4.8	5.9	22.1	19.1	12.9	12.2	12.7	143
4001 bis 5000 Fr.	12.5	7.4	11.1	6.1	7.4	6.4	21.1	12.5	19.6	8.3	11.8	8.8	23.5	18.2	19.1	12.1	10.1	11.5	130
5001 bis 6000 Fr.	13.1	2.9	10.4	3.1	0.0	2.4	7.9	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	5.9	15.6	13.8	9.4	5.8	8.3	94
6001 bis 8000 Fr.	7.1	3.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	6.5	9.6	5.0	3.4	4.5	51
8001 bis 10 000 Fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	8
10001 bis 15 000 Fr.	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	1.0	0.0	0.7	8
über 15 000 Fr.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.2	2
N**	481	175	656	98	27	125	38	8	46	108	17	125	17	77	94	799	328	1'127	1'127
fehlende Angaben	1'826	832	2'658	390	154	544	205	68	273	609	128	737	186	641	827	3'427	1'986	5'413	5'413

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
planm. Beendigung ohne Übertritt	45.1	46.8	45.6	23.7	23.8	23.7	35.6	23.7	32.7	63.2	58.3	62.4	59.9	68.0	66.2	46.3	52.5	48.5	3'144
planm. Beendigung mit Übertritt	9.0	8.6	8.9	17.0	13.3	16.0	12.6	13.2	12.7	5.5	7.6	5.8	5.4	3.5	3.9	9.4	7.2	8.6	559
Wohnortwechsel	2.9	3.0	2.9	5.4	6.6	5.7	2.1	6.6	3.2	1.4	2.8	1.6	0.5	0.6	0.5	2.6	2.6	2.6	170
Hospitalisierung	0.8	1.0	0.9	1.0	1.7	1.2	0.4	2.6	1.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	46
Inhaftierung	0.3	0.1	0.3	2.3	0.6	1.8	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.7	0.1	0.5	32
Kontaktverlust	26.3	25.1	25.9	32.4	36.5	33.5	31.8	39.5	33.7	16.8	21.5	17.6	22.8	20.0	20.6	25.3	24.4	25.0	1'619
expliziter Abbruch	11.5	11.0	11.4	12.9	11.0	12.4	13.8	9.2	12.7	9.7	6.9	9.2	8.9	5.2	6.0	11.1	8.5	10.2	658
Tod	1.9	2.2	2.0	3.7	4.4	3.9	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.5	98
anderer Grund	2.1	2.1	2.1	1.7	2.2	1.8	1.7	3.9	2.2	2.4	2.1	2.3	2.0	2.7	2.5	2.3	2.5	2.4	155
N**	2'287	989	3'276	482	181	663	239	76	315	714	144	858	202	716	918	4'190	2'291	6'481	6'481
fehlende Angaben	20	18	38	6	0	6	4	0	4	3	1	4	1	2	3	36	23	59	59

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
stationäre Therapie	26.8	30.8	27.8	34.5	28.6	33.3	57.1	12.5	40.9	31.6	20.0	29.2	14.3	11.1	12.5	31.4	24.1	29.4	88
ambulante Behandlung	50.0	53.8	51.0	34.5	28.6	33.3	35.7	50.0	40.9	52.6	40.0	50.0	71.4	55.6	62.5	46.8	50.6	47.8	143
Aussenwohngruppe	5.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	4.5	5.3	20.0	8.3	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	3.0	9
andere Stelle/Institution	17.9	15.4	17.2	30.9	42.9	33.3	7.1	25.0	13.6	10.5	20.0	12.5	14.3	33.3	25.0	18.6	22.8	19.7	59
N**	112	39	151	55	14	69	14	8	22	19	5	24	7	9	16	220	79	299	299
fehlende Angaben	94	46	140	27	10	37	16	2	18	20	6	26	4	16	20	174	86	260	260

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
Suizid	12.5	0.0	8.6	33.3	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	17.1	0.0	11.3	6
Unfall	8.3	9.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	5.7	5.6	5.7	3
Krankheit	70.8	72.7	71.4	11.1	40.0	21.4	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	54.3	61.1	56.6	30
Überdosis bzw. Vergiftung	8.3	18.2	11.4	55.6	40.0	50.0	0.0	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	20.0	27.8	22.6	12
andere Todesursache	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.1	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	2.9	5.6	3.8	2
N**	24	11	35	9	5	14	2	1	3	0	0	0	0	0	0	35	18	53	53
fehlende Angaben	20	11	31	9	3	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	31	14	45	45

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2009)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	4.6	4.6	4.6	1.2	0.6	1.0	0.8	0.0	0.6	4.5	1.4	3.9	7.4	6.8	7.0	4.5	5.2	4.7	308
> 1 Woche bis 1 Monat	3.7	2.3	3.2	3.7	1.7	3.1	1.2	1.3	1.3	11.0	14.5	11.6	4.9	2.2	2.8	4.9	3.0	4.2	274
> 1 Monat bis 2 Monate	3.8	4.1	3.9	5.1	1.7	4.2	0.4	5.3	1.6	9.6	9.7	9.6	5.4	4.0	4.3	5.0	4.2	4.7	307
> 2 bis 3 Monate	3.3	4.8	3.7	2.7	3.4	2.8	4.5	0.0	3.4	4.3	7.6	4.9	4.9	4.7	4.8	3.6	4.7	4.0	260
> 3 bis 6 Monate	11.7	13.7	12.3	8.8	6.1	8.1	7.4	9.2	7.8	14.2	11.7	13.8	16.3	16.3	16.3	12.0	13.8	12.6	824
> 6 Monate bis 1 Jahr	29.2	27.4	28.6	29.7	29.6	29.7	32.9	36.8	33.9	31.5	35.9	32.3	27.6	37.7	35.4	30.2	32.2	30.9	2'015
> 1 Jahr bis 2 Jahre	25.2	25.4	25.2	21.1	26.3	22.5	29.2	26.3	28.5	18.4	13.1	17.5	22.7	18.7	19.6	23.0	21.9	22.6	1'475
> 2 bis 3 Jahre	8.7	8.7	8.7	10.0	7.3	9.3	11.9	14.5	12.5	3.9	2.8	3.7	7.4	5.4	5.9	7.9	7.0	7.6	496
> 3 bis 5 Jahre	6.9	5.6	6.5	12.9	14.0	13.2	8.6	5.3	7.8	2.1	1.4	2.0	3.0	2.5	2.6	6.4	4.9	5.9	384
> 5 bis 10 Jahre	2.4	3.2	2.6	3.9	7.8	4.9	2.9	1.3	2.5	0.4	2.1	0.7	0.5	1.4	1.2	2.1	2.7	2.3	151
mehr als 10 Jahre	0.6	0.3	0.5	0.8	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	24
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	6'518
<i>fehlende Angaben</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	22
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	68.6	66.2	67.9	85.5	110.0	92.0	76.8	70.5	75.3	38.3	40.0	38.6	47.0	47.8	47.6	63.2	60.8	62.3	
Standardabweichung	84.4	76.0	82.0	94.3	142.5	109.8	69.6	71.8	70.1	40.7	58.8	44.2	46.1	59.0	56.4	77.2	78.2	77.6	
1. Quartil	22.3	20.0	21.6	27.6	33.6	29.4	31.6	31.4	31.6	8.0	7.3	8.0	13.0	18.1	16.4	19.1	19.4	19.1	
Medianwert	46.0	42.9	44.9	50.5	61.3	53.4	57.0	49.4	54.4	29.4	26.9	29.0	32.6	32.6	32.6	40.9	37.3	39.9	
3. Quartil	85.3	85.1	85.3	114.2	136.7	118.7	98.0	88.4	96.7	52.0	46.3	51.0	65.7	56.1	58.1	78.0	72.7	76.4	
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	
<i>fehlende Angaben</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	97.4	97.5	97.4	35.8	30.3	34.3	88.1	86.3	87.7	99.3	97.4	99.0	89.8	89.4	89.6	3'730
ja	2.6	2.5	2.6	64.2	69.7	65.7	11.9	13.7	12.3	0.7	2.6	1.0	10.2	10.6	10.4	431
N**	1'721	709	2'430	355	132	487	177	51	228	556	115	671	3'015	1'146	4'161	4'161
<i>fehlende Angaben</i>	584	298	882	133	47	180	65	24	89	157	28	185	1'001	446	1'447	1'447
Typ der Substitution***																
Heroin	2.4	11.8	5.2	2.5	1.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	2.4	8
Methadon	63.4	47.1	58.6	90.7	93.1	91.5	94.4	100.0	95.8	100.0	66.7	83.3	86.7	85.0	86.2	287
andere Opiate	2.4	5.9	3.4	4.9	4.2	4.7	5.6	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	4.2	14
andere Substanzen	31.7	35.3	32.8	1.9	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	6.9	8.0	7.2	24
N**	41	17	58	162	72	234	18	6	24	3	3	6	233	100	333	333
<i>fehlende Angaben</i>	4	1	5	66	20	86	3	1	4	1	0	1	76	22	98	98
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.0	98.3	98.8	64.0	66.3	64.7	96.4	86.1	94.3	100.0	100.0	100.0	95.7	95.3	95.6	3'464
ja	1.0	1.7	1.2	36.0	33.7	35.3	3.6	13.9	5.7	0.0	0.0	0.0	4.3	4.7	4.4	161
N**	1'548	645	2'193	239	92	331	138	36	174	495	113	608	2'605	1'020	3'625	3'625
<i>fehlende Angaben</i>	757	362	1'119	249	87	336	104	39	143	218	30	248	1'411	572	1'983	1'983
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	12.5	36.4	22.2	3.5	6.5	4.3	0.0	40.0	20.0	-	-	-	4.4	16.7	8.1	13
Substitution	87.5	63.6	77.8	96.5	93.5	95.7	100.0	60.0	80.0	-	-	-	95.6	83.3	91.9	148
N**	16	11	27	86	31	117	5	5	10	0	0	0	113	48	161	161
<i>fehlende Angaben</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	87.2	79.5	85.0	76.3	72.7	75.4	84.9	58.8	80.6	85.2	86.1	85.4	85.5	79.4	83.9	1'806
ja	12.8	20.5	15.0	23.7	27.3	24.6	15.1	41.2	19.4	14.8	13.9	14.6	14.5	20.6	16.1	346
N**	1'028	395	1'423	190	66	256	86	17	103	183	36	219	1'590	562	2'152	2'152
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'277</i>	<i>612</i>	<i>1'889</i>	<i>298</i>	<i>113</i>	<i>411</i>	<i>156</i>	<i>58</i>	<i>214</i>	<i>530</i>	<i>107</i>	<i>637</i>	<i>2'426</i>	<i>1'030</i>	<i>3'456</i>	<i>3'456</i>
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.6	2
institutionseigene Nachsorgestelle	8.9	1.4	6.2	0.0	5.6	1.7	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.1	2.9	4.4	14
fremde Aussenwohngruppe	5.6	1.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	6.9	3.7	2.0	3.2	10
fremde Nachsorgestelle	7.3	13.0	9.3	24.4	16.7	22.0	46.2	20.0	38.9	8.3	0.0	6.9	13.1	12.7	13.0	41
Alkoholberatungsstelle	23.4	15.9	20.7	12.2	0.0	8.5	0.0	20.0	5.6	4.2	0.0	3.4	16.4	11.8	14.9	47
Drogenberatungsstelle	6.5	4.3	5.7	29.3	16.7	25.4	23.1	0.0	16.7	8.3	20.0	10.3	13.1	6.9	11.1	35
andere Beratungsstelle	16.9	23.2	19.2	14.6	22.2	16.9	38.5	0.0	27.8	20.8	0.0	17.2	18.2	21.6	19.3	61
Selbsthilfegruppe	5.6	2.9	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.0	2.8	9
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
andere	33.9	43.5	37.3	31.7	38.9	33.9	15.4	20.0	16.7	54.2	60.0	55.2	35.5	43.1	38.0	120
N**	124	69	193	41	18	59	13	5	18	24	5	29	214	102	316	316
<i>fehlende Angaben</i>	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2009)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	54.9	61.1	56.8	20.6	23.5	21.3	21.2	34.4	24.0	8.6	15.7	9.9	37.1	44.1	39.1	1'272
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.1	0.0	0.1	3.6	1.2	3.0	1.7	6.3	2.7	0.2	0.0	0.2	0.6	0.3	0.6	18
Heroin	0.8	0.5	0.7	60.3	56.8	59.5	5.9	18.8	8.7	0.9	1.0	0.9	7.5	6.1	7.1	230
Methadon	0.7	0.9	0.8	18.6	34.6	22.6	4.2	15.6	6.7	0.0	0.0	0.0	2.8	4.1	3.2	103
andere Opiate	0.0	0.3	0.1	2.0	2.5	2.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	10
Kokain	1.9	1.2	1.7	10.1	22.2	13.1	48.3	62.5	51.3	1.1	5.9	2.0	4.9	5.7	5.1	167
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Amphetamine	0.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.5	0.8	0.6	18
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.5	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.3	1.0	0.5	15
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
Barbiturate	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Benzodiazepine	1.7	2.3	1.9	16.2	14.8	15.9	4.2	12.5	6.0	0.2	0.0	0.2	3.3	3.6	3.3	109
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.9	0.4	1.2	1.2	1.2	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.3	0.7	0.4	14
LSD	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	3
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	3.1	0.7	0.2	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	5
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	3
Cannabis	3.2	3.1	3.2	14.2	17.3	14.9	10.2	25.0	13.3	51.2	47.1	50.5	14.1	10.1	13.0	423
Tabak	13.5	11.8	13.0	18.6	12.3	17.1	9.3	21.9	12.0	12.6	16.7	13.3	14.0	15.0	14.3	465
andere Substanzen	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.3	0.5	0.4	13
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	1.3	1.4	45
Essstörungen	0.0	0.3	0.1	0.4	2.5	0.9	0.0	6.3	1.3	0.0	1.0	0.2	0.2	4.3	1.4	45
anderes suchtähnliches Problem	0.1	0.3	0.2	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	20
keine	39.7	35.5	38.4	19.0	18.5	18.9	38.1	15.6	33.3	41.3	47.1	42.3	38.0	33.3	36.7	1'194
N**	1'344	574	1'918	247	81	328	118	32	150	453	102	555	2'335	920	3'255	3'255
fehlende Angaben	961	433	1'394	241	98	339	124	43	167	260	41	301	1'681	672	2'353	2'353

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	61.2	47.5	57.5	33.7	31.6	33.1	49.2	46.7	48.6	76.3	55.6	73.0	59.2	46.0	55.8	754
einmal	9.8	13.1	10.7	7.6	13.2	9.2	10.2	0.0	8.1	5.4	22.2	8.1	9.4	13.4	10.4	141
zweimal	5.3	8.1	6.0	14.1	10.5	13.1	10.2	0.0	8.1	4.3	11.1	5.4	6.0	8.0	6.5	88
drei- oder viermal	12.4	15.4	13.2	15.2	13.2	14.6	8.5	13.3	9.5	6.5	5.6	6.3	12.1	14.8	12.8	173
fünfmal oder mehr	11.3	15.8	12.5	29.3	31.6	30.0	22.0	40.0	25.7	7.5	5.6	7.2	13.3	17.9	14.5	196
N**	701	259	960	92	38	130	59	15	74	93	18	111	1'000	352	1'352	1'352
fehlende Angaben	1'604	748	2'352	396	141	537	183	60	243	620	125	745	3'016	1'240	4'256	4'256
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	95.8	98.5	96.7	27.1	24.0	26.2	28.6	62.5	36.1	20.0	0.0	14.3	72.1	77.3	73.7	424
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.3	2.2	0.9	5
Opiate	5.0	2.3	4.1	84.7	92.0	86.9	32.1	37.5	33.3	5.0	0.0	3.6	19.0	16.2	18.1	104
Kokain und Derivate	4.6	1.5	3.6	23.7	40.0	28.6	89.3	75.0	86.1	5.0	12.5	7.1	13.8	10.8	12.9	74
Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.5	0.5	0.5	3
Medikamente	1.9	2.3	2.0	22.0	16.0	20.2	17.9	37.5	22.2	5.0	0.0	3.6	6.7	6.5	6.6	38
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	2
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
Tabak	5.0	2.3	4.1	22.0	8.0	17.9	21.4	37.5	25.0	80.0	87.5	82.1	12.8	8.1	11.3	65
flüchtige Stoffe	1.1	0.8	1.0	0.0	4.0	1.2	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	1.8	2.2	1.9	11
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.7	10
Essstörungen	0.4	0.8	0.5	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	1.4	8
anderes suchtmähnliches Problem	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	4
N**	262	132	394	59	25	84	28	8	36	20	8	28	390	185	575	575
fehlende Angaben	10	4	14	2	1	3	2	0	2	2	0	2	18	5	23	23
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	24.8	22.6	24.1	40.0	50.0	42.3	45.5	0.0	38.5	25.0	100.0	50.0	29.1	33.8	30.6	70
3-6 Tage	31.9	24.5	29.5	10.0	16.7	11.5	0.0	50.0	7.7	12.5	0.0	8.3	25.9	21.1	24.5	56
7-10 Tage	10.6	15.1	12.0	10.0	0.0	7.7	27.3	0.0	23.1	12.5	0.0	8.3	11.4	11.3	11.4	26
>10 Tage bis 2 Wochen	2.7	7.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.6	3.1	7
>2 bis 4 Wochen	10.6	17.0	12.7	5.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	25.0	10.1	14.1	11.4	26
>4 bis 6 Wochen	13.3	5.7	10.8	10.0	0.0	7.7	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	11.4	4.2	9.2	21
>6 bis 8 Wochen	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.3	3
>2 Monate	3.5	7.5	4.8	25.0	16.7	23.1	18.2	50.0	23.1	12.5	0.0	8.3	8.2	9.9	8.7	20
N**	113	53	166	20	6	26	11	2	13	8	4	12	158	71	229	229
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	26.0	36.2	28.9	1.6	0.0	1.3	25.0	27.3	25.5	14.0	9.1	13.0	21.7	31.7	24.5	297
1 Tag pro Woche oder weniger	0.5	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	7
2 bis 3 Tage pro Woche	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.8	1.1	0.6	1.0	12
4 bis 6 Tage pro Woche	1.0	0.4	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.7	9
einmal täglich	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	4
mehrmals täglich	71.1	60.9	68.2	97.5	100.0	98.1	72.5	72.7	72.5	82.6	90.9	84.3	75.5	65.9	72.9	884
N**	589	235	824	122	38	160	40	11	51	86	22	108	879	334	1'213	1'213
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'716</i>	<i>772</i>	<i>2'488</i>	<i>366</i>	<i>141</i>	<i>507</i>	<i>202</i>	<i>64</i>	<i>266</i>	<i>627</i>	<i>121</i>	<i>748</i>	<i>3'137</i>	<i>1'258</i>	<i>4'395</i>	<i>4'395</i>
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	15.4	13.8	15.0	8.1	4.0	7.2	21.1	0.0	16.7	31.4	33.3	31.7	15.9	13.8	15.4	102
11-20 Zigaretten pro Tag	47.5	56.0	49.6	60.5	72.0	63.1	57.9	60.0	58.3	47.1	33.3	44.4	49.6	56.0	51.1	339
21-30 Zigaretten pro Tag	27.6	22.9	26.5	30.2	24.0	28.8	21.1	20.0	20.8	15.7	33.3	19.0	27.2	23.3	26.2	174
31 und mehr Zigaretten pro Tag	9.5	7.3	9.0	1.2	0.0	0.9	0.0	20.0	4.2	5.9	0.0	4.8	7.3	6.9	7.2	48
N**	337	109	446	86	25	111	19	5	24	51	12	63	504	159	663	663
<i>fehlende Angaben</i>	<i>99</i>	<i>41</i>	<i>140</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>47</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>23</i>	<i>8</i>	<i>31</i>	<i>184</i>	<i>69</i>	<i>253</i>	<i>253</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2009)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	36.0	44.1	38.1	68.3	52.1	64.2	56.5	56.3	56.4	38.4	30.0	36.9	40.8	44.3	41.7	728
zeitlich begrenzte Abstinenz	13.9	10.5	13.0	2.1	6.3	3.1	1.6	0.0	1.3	5.8	10.0	6.5	10.5	8.9	10.1	176
kontrollierter Konsum	35.2	32.6	34.5	9.0	12.5	9.8	27.4	25.0	26.9	29.0	40.0	31.0	31.9	30.3	31.5	550
keine Beschränkung beabsichtigt	5.5	4.5	5.2	6.2	6.3	6.2	3.2	0.0	2.6	13.0	6.7	11.9	6.1	5.1	5.8	102
bis jetzt nicht festgelegt	8.6	7.7	8.4	13.1	20.8	15.0	9.7	18.8	11.5	12.3	13.3	12.5	9.7	10.0	9.8	171
andere	0.8	0.6	0.8	1.4	2.1	1.6	1.6	0.0	1.3	1.4	0.0	1.2	0.9	1.3	1.0	18
N**	870	313	1'183	145	48	193	62	16	78	138	30	168	1'296	449	1'745	1'745
fehlende Angaben	1'435	694	2'129	343	131	474	180	59	239	575	113	688	2'720	1'143	3'863	3'863
Prognose*																
sehr gute Prognose	12.6	10.4	12.0	7.7	3.8	6.7	12.5	12.5	12.5	17.6	11.8	16.6	12.6	10.5	12.0	225
gute Prognose	49.5	51.2	49.9	31.4	40.4	33.7	43.1	6.3	36.4	43.1	58.8	46.0	46.4	49.1	47.1	880
eher ungünstige Prognose	25.5	27.4	26.0	46.8	32.7	43.3	34.7	62.5	39.8	34.0	23.5	32.1	29.5	28.3	29.2	545
ungünstige Prognose	12.5	11.0	12.1	14.1	23.1	16.3	9.7	18.8	11.4	5.2	5.9	5.3	11.6	12.2	11.7	219
N**	922	336	1'258	156	52	208	72	16	88	153	34	187	1'392	477	1'869	1'869
fehlende Angaben	1'383	671	2'054	332	127	459	170	59	229	560	109	669	2'624	1'115	3'739	3'739

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein