

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2010

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@sucht-info.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Sucht Info Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Info Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@sucht-info.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Info Schweiz

Copyright: © Sucht Info Schweiz, Lausanne 2011

Zitierhinweis: Astudillo, M., Notari, L. & Maffli, E. (2011). Ambulante
Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2010.
Lausanne: Sucht Info Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T7	Netto Monateinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
T9	Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T10	Hilfserwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
T12	Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2010)
T13a	Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2010)
T13b	Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2010)
T14	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2010)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer
T15.1b	Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer
T15.2a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2010)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer und Frauen

- T23a Psychische Probleme im Leben (2010), Männer
- T23b Psychische Probleme im Leben (2010), Frauen
- T23c Psychische Probleme im Leben (2010), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2010)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2010)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2010)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2010)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2010)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2010)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2010)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Info Schweiz in Lausanne und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Info Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2010 beteiligten sich 80 der 206 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-*info*-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, Opiate (insbesondere Heroin), Kokain (und Derivate) oder Cannabis als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die Angehörigen, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl *N* der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Bei nicht teilnehmenden Einrichtungen wurde versucht, Datensätze mit Basisdaten zu bekommen (Alter, Geschlecht und Hauptproblem bei Eintritt). Dies gelang bei 17 zusätzlichen Einrichtungen, wobei 12 von ihnen kompatible Daten hinsichtlich des Hauptproblems aufwiesen. Die Daten dieser 12 Einrichtungen wurden getrennt analysiert und die entsprechenden Ergebnisse werden im Anhang dargestellt.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.7			75.6			77.8			85.4			20.9			65.5	4'853
Frauen			29.3			24.4			22.2			14.6			79.0			34.5	2'552
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0	1
N**	2'772	1'148	3'920	476	154	630	224	64	288	879	150	1'029	209	788	998	4'853	2'552	7'406	7'406
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	9.0	10.0	9.1	2.4	1.3	1.5	2.3	1.5	2.0	149
15-19	3.2	2.3	2.9	2.5	9.1	4.1	4.5	14.1	6.6	58.4	50.0	57.1	11.0	4.3	5.7	14.4	7.9	12.2	898
20-24	5.2	3.7	4.8	8.4	21.4	11.6	13.4	37.5	18.8	13.4	14.7	13.6	4.8	4.7	4.7	7.7	7.2	7.5	554
25-29	8.2	5.5	7.4	20.4	16.2	19.4	25.0	25.0	25.0	8.8	9.3	8.8	5.7	6.9	6.6	10.6	7.8	9.6	711
30-34	10.2	7.4	9.4	18.1	11.0	16.4	21.4	7.8	18.4	4.4	4.7	4.5	8.6	9.4	9.3	10.3	8.1	9.6	706
35-39	11.5	9.9	11.0	20.2	12.3	18.3	14.7	3.1	12.2	2.8	1.3	2.6	7.2	9.9	9.4	10.8	9.4	10.3	759
40-44	14.3	16.4	14.9	16.4	18.2	16.9	13.8	3.1	11.5	1.1	5.3	1.7	11.5	13.8	13.3	11.7	14.1	12.5	924
45-49	13.8	16.0	14.4	7.8	7.8	7.8	4.9	4.7	4.9	1.4	2.0	1.5	10.0	19.6	17.6	10.0	14.9	11.7	863
50-54	12.6	16.8	13.8	4.8	2.6	4.3	2.2	1.6	2.1	0.6	1.3	0.7	13.4	12.5	12.7	8.7	12.5	10.0	740
55-59	9.9	9.7	9.9	1.1	0.6	1.0	0.0	1.6	0.3	0.1	1.3	0.3	11.0	9.1	9.5	6.5	7.8	6.9	513
60-64	5.4	5.3	5.3	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	4.5	3.4	4.2	3.7	270
65-69	3.0	4.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.8	2.3	2.0	3.0	2.3	171
70-74	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	1.8	1.2	1.3	1.2	89
75 und mehr	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	1.0	0.6	0.4	0.5	39
N**	2'763	1'144	3'907	475	154	629	224	64	288	879	150	1'029	209	784	993	4'843	2'543	7'386	7'386
fehlende Angaben	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	20
Alter																			
Mittelwert	43.7	45.8	44.3	35.3	32.7	34.6	32.4	26.8	31.2	20.5	22.4	20.8	43.1	43.2	43.2	37.5	41.5	38.8	
Standardabweichung	13.3	12.4	13.1	8.8	10.1	9.2	8.1	8.7	8.5	7.3	9.7	7.7	16.6	13.0	13.9	14.9	14.3	14.8	
1. Quartil	33.8	38.2	35.1	28.3	24.1	27.4	26.9	21.2	24.9	16.1	16.4	16.1	31.1	34.0	33.3	25.3	30.4	26.9	
Medianwert	43.9	46.4	44.8	35.0	31.4	34.5	31.2	24.8	29.6	17.5	18.0	17.5	44.5	44.9	44.9	37.2	43.0	39.4	
3. Quartil	53.1	53.8	53.3	41.7	41.5	41.6	38.41	28.8	37.2	22.6	25.0	22.9	55.1	51.7	52.3	48.5	51.5	49.8	
N**	2'763	1'144	3'907	475	154	629	224	64	288	879	150	1'029	209	784	993	4'843	2'543	7'386	
fehlende Angaben	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	42.1	31.6	39.0	70.4	66.4	69.5	67.3	82.0	70.5	93.1	86.2	92.1	36.5	26.9	28.9	56.1	38.8	50.1	3'496
verheiratet	32.3	30.5	31.8	17.1	11.0	15.6	19.4	8.2	16.9	4.7	4.3	4.6	49.0	51.2	50.7	25.5	33.0	28.1	1'961
getrennt	5.7	6.3	5.9	2.9	6.2	3.7	4.6	4.9	4.7	0.5	2.9	0.8	4.7	4.6	4.6	4.3	5.3	4.6	322
geschieden	17.6	27.2	20.4	8.7	12.3	9.6	8.3	4.9	7.6	1.7	5.8	2.3	8.9	13.0	12.2	12.6	18.9	14.8	1'032
verwitwet	1.6	4.0	2.3	0.0	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	3.5	2.9	1.0	3.4	1.8	126
reg. Partnerschaft	0.6	0.5	0.6	0.9	2.1	1.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	38
N**	2'618	1'100	3'718	450	146	596	217	61	278	815	138	953	192	744	937	4'559	2'415	6'975	6'975
fehlende Angaben	154	48	202	26	8	34	7	3	10	64	12	76	17	44	61	294	137	431	431
Staatsangehörigkeit*																			
CH	80.3	84.9	81.7	70.4	83.5	73.7	63.5	86.5	68.4	85.5	91.7	86.4	85.7	89.0	88.3	79.5	86.5	81.9	5'394
EU	13.3	10.6	12.5	20.8	14.2	19.2	19.8	9.6	17.6	6.8	4.5	6.5	10.1	6.5	7.2	13.1	8.9	11.6	767
andere	6.4	4.5	5.9	8.7	2.4	7.1	16.7	3.8	13.9	7.6	3.8	7.1	4.2	4.5	4.4	7.4	4.6	6.4	424
N**	2'505	1'033	3'538	379	127	506	192	52	244	774	133	907	189	712	901	4'305	2'280	6'585	6'585
fehlende Angaben	267	115	382	97	27	124	32	12	44	105	17	122	20	76	97	548	272	821	821

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	6.3	9.5	7.3	5.1	0.7	4.0	2.3	4.8	2.9	0.7	0.7	0.7	6.5	8.4	8.0	4.6	7.1	5.5	391
Umland der Grossstadtzentren	16.3	16.3	16.3	5.5	9.5	6.5	12.5	12.7	12.5	7.4	6.0	7.2	16.6	12.6	13.4	12.9	13.0	12.9	919
Mittelzentren	15.3	14.5	15.1	22.7	25.7	23.5	20.8	22.2	21.1	25.6	30.7	26.3	18.1	17.4	17.5	18.9	18.4	18.7	1'331
Kleinzentren	33.1	31.5	32.6	40.6	40.5	40.6	42.1	47.6	43.4	34.1	31.3	33.7	33.2	35.5	35.0	35.1	34.5	34.9	2'483
rural	28.9	28.2	28.7	26.0	23.6	25.5	22.2	12.7	20.1	32.2	31.3	32.1	25.6	26.2	26.1	28.6	27.1	28.1	1'998
N**	2'653	1'096	3'749	453	148	601	216	63	279	864	150	1'014	199	753	952	4'670	2'452	7'122	7'122
fehlende Angaben	119	52	171	23	6	29	8	1	9	15	0	15	10	35	46	183	100	284	284
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	37.9	35.0	37.0	36.7	34.1	36.0	28.0	28.3	28.0	10.1	12.9	10.5	15.4	12.4	12.9	30.2	25.5	28.6	1'646
mit Eltern/Elternteil	8.1	3.5	6.7	13.2	18.6	14.5	19.9	32.1	22.6	67.2	47.1	64.1	16.9	7.3	9.1	22.5	11.5	18.7	1'077
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.8	12.2	4.9	2.1	8.5	3.7	1.1	1.9	1.3	0.4	5.7	1.2	6.2	14.5	12.9	1.6	11.4	5.0	288
mit PartnerIn (ohne Kinder)	24.7	26.1	25.1	13.2	20.9	15.1	16.1	11.3	15.1	5.5	10.0	6.2	21.5	23.4	23.0	18.6	23.1	20.1	1'157
mit PartnerIn und Kind(ern)	18.5	16.4	17.8	11.6	3.9	9.7	16.1	0.0	12.6	3.9	5.7	4.2	32.3	40.4	38.8	15.1	21.0	17.1	984
mit anderen Verw./Angeh.	1.4	1.1	1.3	3.4	0.0	2.5	2.7	1.9	2.5	2.6	0.0	2.1	2.3	0.9	1.2	1.9	1.0	1.6	91
mit FreundInnen (WG)	2.4	1.5	2.1	3.6	3.9	3.7	5.4	9.4	6.3	2.8	5.0	3.2	0.0	0.5	0.4	2.7	2.0	2.5	142
anderes	5.3	4.2	5.0	16.3	10.1	14.7	10.8	15.1	11.7	7.5	13.6	8.5	5.4	0.7	1.6	7.4	4.5	6.4	370
N**	2'097	895	2'992	387	129	516	186	53	239	745	140	885	130	565	695	3'773	1'982	5'755	5'755
fehlende Angaben	675	253	928	89	25	114	38	11	49	134	10	144	79	223	303	1'080	570	1'651	1'651
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	93.1	93.2	93.1	83.4	87.2	84.3	89.0	90.5	89.3	91.6	96.0	92.3	93.1	95.6	95.1	91.5	93.9	92.4	4'926
instabile Wohnsituation	4.7	4.7	4.7	13.2	10.1	12.4	5.5	9.5	6.3	5.4	3.2	5.1	6.2	4.4	4.8	5.8	4.8	5.5	291
Institution	2.2	2.2	2.2	3.4	2.8	3.3	5.5	0.0	4.4	3.0	0.8	2.7	0.8	0.0	0.1	2.6	1.4	2.2	117
N**	1'996	834	2'830	319	109	428	163	42	205	667	125	792	130	543	673	3'488	1'846	5'334	5'334
fehlende Angaben	776	314	1090	157	45	202	61	22	83	212	25	237	79	245	325	1365	706	2072	2'072

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	32.0	31.3	31.8	42.7	37.2	41.3	34.3	41.7	35.8	67.4	51.0	64.6	23.8	15.7	17.2	39.2	29.7	35.8	1'565
zeitweilige Beziehung(en)	4.1	5.5	4.5	6.7	9.6	7.5	10.5	22.2	12.8	8.1	8.3	8.1	1.9	1.3	1.4	5.5	4.8	5.3	230
feste Beziehung, getrennt lebend	12.7	15.1	13.4	16.5	25.5	18.8	18.9	22.2	19.6	12.1	22.9	13.9	11.4	11.7	11.6	13.3	14.6	13.8	603
feste Beziehung, zusammen leb.	51.3	48.1	50.3	34.1	27.7	32.4	36.4	13.9	31.8	12.5	17.7	13.3	62.9	71.3	69.8	41.9	50.9	45.2	1'976
N**	1'649	715	2'364	267	94	361	143	36	179	481	96	577	105	471	576	2'801	1'573	4'374	4'374
fehlende Angaben	1'123	433	1'556	209	60	269	81	28	109	398	54	452	104	317	422	2'052	979	3'032	3'032
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	41.3	35.4	39.5	61.3	50.9	58.7	64.4	66.0	64.8	90.2	81.0	88.8	37.8	22.9	25.6	54.3	38.0	48.4	2'654
1 Kind	18.7	23.3	20.1	24.0	26.7	24.7	17.8	22.0	18.8	5.4	8.3	5.9	14.8	19.0	18.2	16.4	20.7	18.0	985
2 Kinder	26.9	28.7	27.5	9.5	18.1	11.7	11.0	6.0	9.9	2.5	6.6	3.1	32.6	36.8	36.1	19.6	27.4	22.5	1'232
3 Kinder oder mehr	13.1	12.6	13.0	5.2	4.3	5.0	6.7	6.0	6.6	1.9	4.1	2.2	14.8	21.3	20.1	9.7	13.9	11.2	616
N**	2'001	902	2'903	346	116	462	163	50	213	646	121	767	135	611	746	3'493	1'994	5'487	5'487
fehlende Angaben	771	246	1'017	130	38	168	61	14	75	233	29	262	74	177	252	1'360	558	1'919	1'919
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	71.8	61.9	68.8	77.6	72.0	76.3	73.3	86.1	76.0	60.4	65.1	61.1	51.3	35.5	38.2	69.1	54.9	63.9	3'005
1 Kind	10.5	18.8	13.1	13.6	15.1	14.0	13.0	13.9	13.2	10.5	11.3	10.6	17.9	22.9	22.0	11.3	18.9	14.1	662
2 Kinder	12.4	15.2	13.2	6.6	9.7	7.4	11.5	0.0	9.0	19.2	17.0	18.9	23.9	29.6	28.6	13.5	19.1	15.5	731
3 Kinder oder mehr	5.3	4.0	4.9	2.1	3.2	2.4	2.3	0.0	1.8	9.9	6.6	9.4	6.8	12.0	11.1	6.1	7.1	6.4	303
N**	1'683	749	2'432	286	93	379	131	36	167	593	106	699	117	550	667	2'992	1'709	4'701	4'701
fehlende Angaben	1'089	399	1'488	190	61	251	93	28	121	286	44	330	92	238	331	1'861	843	2'705	2'705

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	5.0	5.1	5.0	14.4	15.6	14.7	7.6	2.5	6.6	21.8	24.0	22.1	7.6	4.8	5.4	9.5	7.8	9.0	482
obligatorische Schule	12.2	14.6	12.9	26.3	40.6	29.8	19.8	47.5	25.0	48.7	47.0	48.5	16.0	13.8	14.2	21.4	20.1	21.0	1'129
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	3.3	6.1	4.1	2.3	3.9	2.7	1.7	0.0	1.4	3.2	4.0	3.3	0.8	4.6	3.8	3.0	5.3	3.7	201
Berufslehre, Berufsschule	59.6	52.9	57.7	50.1	33.6	46.1	57.6	42.5	54.7	22.4	20.0	22.1	42.9	53.6	51.4	50.6	47.7	49.7	2'673
Maturität, Diplommittelschule	3.7	4.4	3.9	2.5	3.9	2.9	3.5	5.0	3.8	2.4	3.0	2.5	5.0	5.7	5.6	3.4	4.9	3.9	209
Lehrerseminar	0.9	2.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8	3.9	3.3	0.6	2.6	1.2	66
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.7	7.5	6.9	1.8	1.6	1.7	5.2	2.5	4.7	1.1	0.0	1.0	17.6	5.7	8.2	5.4	5.7	5.5	297
höhere Fachschule	1.9	1.1	1.7	1.0	0.8	1.0	3.5	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.0	1.3	69
Fachhochschule	1.9	1.2	1.7	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.2	2.0	0.4	1.7	1.1	1.2	1.3	1.0	1.2	65
Universität, Hochschule	4.8	4.2	4.6	1.3	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.7	5.5	5.7	3.4	3.9	3.5	191
N**	2'090	848	2'938	395	128	523	172	40	212	620	100	720	119	457	576	3'624	1'758	5'382	5'382
<i>fehlende Angaben</i>	682	300	982	81	26	107	52	24	76	259	50	309	90	331	422	1'229	794	2'024	2'024
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	29.8	44.9	34.2	52.1	60.0	54.1	26.4	50.0	29.0	25.5	37.0	26.7	38.1	28.0	29.8	31.3	40.2	34.1	872
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.7	0.2	2.0	2.3	4.0	2.8	1.8	0.0	1.6	29.3	22.2	28.6	4.8	1.6	2.1	6.5	2.5	5.2	134
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	4.2	3.6	4.7	6.7	5.2	6.4	0.0	5.6	3.8	0.0	3.4	0.0	5.2	4.3	3.8	4.3	4.0	102
angelernte(r) ArbeiterIn	4.9	6.3	5.3	9.8	5.3	8.6	6.4	0.0	5.6	0.8	0.0	0.8	4.8	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	133
gelernte(r) ArbeiterIn	16.1	7.0	13.4	14.0	5.3	11.7	20.9	0.0	18.5	7.9	7.4	7.9	0.0	9.8	8.1	14.8	7.9	12.6	323
VorarbeiterIn	3.0	0.2	2.2	2.3	0.0	1.7	3.6	0.0	3.2	0.4	0.0	0.4	4.8	0.5	1.3	2.6	0.4	1.9	49
einfache(r) Angestellte(r)	14.3	21.4	16.4	4.7	13.3	6.9	13.6	35.7	16.1	3.3	3.7	3.4	4.8	27.5	23.4	11.2	20.7	14.2	363
mittl. Angestellte(r)/ Kader	9.5	6.3	8.6	3.3	1.3	2.8	10.0	0.0	8.9	2.1	0.0	1.9	19.0	10.9	12.3	7.7	6.5	7.3	187
leit. Angestellte(r)/Kader	3.0	1.4	2.6	0.9	1.3	1.0	2.7	0.0	2.4	0.4	0.0	0.4	7.1	4.1	4.7	2.4	2.0	2.3	58
selbständig	10.5	5.8	9.1	3.7	1.3	3.1	4.5	0.0	4.0	2.1	0.0	1.9	14.3	5.2	6.8	8.0	4.8	7.0	178
SchülerIn/StudentIn	1.7	1.4	1.6	1.9	0.0	1.4	1.8	14.3	3.2	23.8	29.6	24.4	2.4	1.6	1.7	5.4	4.4	5.1	131
andere Stellung	1.1	0.9	1.1	0.5	1.3	0.7	1.8	0.0	1.6	0.4	0.0	0.4	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	25
N**	1'050	430	1'480	215	75	290	110	14	124	239	27	266	42	193	235	1'745	810	2'555	2'555
<i>fehlende Angaben</i>	1'722	718	2'440	261	79	340	114	50	164	640	123	763	167	595	763	3'108	1'742	4'851	4'851

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	55.5	38.5	50.4	32.5	19.5	29.3	59.5	28.3	52.9	25.4	25.9	25.5	66.7	60.8	62.0	47.6	42.3	45.8	3'021
Ersparnisse	1.4	1.8	1.5	1.3	0.0	1.0	1.4	3.3	1.8	1.0	0.0	0.8	0.6	0.5	0.5	1.3	1.1	1.2	79
Rente (AHV/IV u.a.)	14.0	20.8	16.0	15.8	20.8	17.1	4.5	11.7	6.1	2.1	4.9	2.5	10.5	9.1	9.4	11.1	15.7	12.7	837
Sozialhilfe/Fürsorge	14.1	13.2	13.8	34.5	38.9	35.6	15.9	31.7	19.3	9.4	11.2	9.6	4.9	2.5	3.0	14.7	11.7	13.7	903
Arbeitslosenversicherung	9.2	6.7	8.5	8.7	6.7	8.2	9.1	8.3	8.9	2.7	2.8	2.7	4.3	1.7	2.3	7.6	4.7	6.6	436
durch PartnerIn	1.5	14.0	5.2	1.6	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	1.1	1.2	20.6	16.7	1.3	13.9	5.5	366
durch Eltern/Angehörige	3.3	2.8	3.2	3.3	6.0	4.0	6.4	15.0	8.2	57.7	49.7	56.5	11.1	4.1	5.5	15.1	9.0	13.0	859
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	9
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	7
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	1.0	2.2	1.3	0.9	3.4	1.5	2.3	1.7	2.1	0.7	1.4	0.8	0.6	0.5	0.5	1.0	1.6	1.2	81
N**	2'434	1'019	3'453	449	149	598	220	60	280	823	143	966	162	636	798	4'357	2'241	6'598	6'598
fehlende Angaben	338	129	467	27	5	32	4	4	8	56	7	63	47	152	200	496	311	808	808
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.6	26.6	43.5	28.2	13.0	24.4	53.0	21.3	46.0	19.0	13.5	18.2	62.6	37.3	42.6	42.4	27.0	37.3	2'371
Teilzeitarbeit	4.6	17.6	8.4	3.6	8.2	4.7	6.5	6.6	6.5	1.5	7.1	2.3	2.0	29.4	23.7	3.8	18.6	8.8	557
Gelegenheitsarbeit	0.9	1.2	1.0	2.3	0.7	1.9	0.9	0.0	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	1.8	1.4	1.1	1.1	1.1	69
in Ausbildung	3.6	1.9	3.1	2.7	4.1	3.1	3.7	9.8	5.0	57.0	50.4	56.0	10.2	4.6	5.8	14.9	8.9	12.9	821
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	17.3	31.6	21.5	26.4	36.3	28.8	12.9	14.8	13.3	4.7	11.3	5.7	10.9	21.8	19.5	15.1	26.9	19.0	1'211
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	15.3	14.4	15.0	21.6	19.2	21.0	16.6	26.2	18.7	10.6	6.4	9.9	9.5	3.4	4.6	14.7	10.8	13.4	852
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.4	0.6	0.5	0.5	1.4	0.7	0.9	0.0	0.7	0.6	2.1	0.8	0.7	0.0	0.1	0.5	0.6	0.5	32
anderes	7.3	6.1	7.0	14.9	17.1	15.4	5.5	21.3	9.0	5.7	9.2	6.2	4.1	1.8	2.2	7.5	6.1	7.0	445
N**	2'347	982	3'329	444	146	590	217	61	278	814	141	955	147	565	712	4'231	2'127	6'358	6'358
fehlende Angaben	425	166	591	32	8	40	7	3	10	65	9	74	62	223	286	622	425	1'048	1'048

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem									Angehörige			alle Eintritte						
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	24.8	36.4	27.9	27.3	30.0	27.9	12.1	37.5	14.9	48.9	56.3	50.0	44.4	20.2	24.5	29.3	33.9	30.6	484
weniger als 1000 Fr.	4.3	5.0	4.5	9.7	14.0	10.7	12.1	0.0	10.8	24.7	25.0	24.8	5.6	7.1	6.9	9.0	8.1	8.7	138
1001 bis 2000 Fr.	6.7	10.9	7.8	21.8	32.0	24.2	9.1	12.5	9.5	5.3	6.3	5.4	0.0	11.9	9.8	8.3	12.6	9.5	151
2001 bis 3000 Fr.	9.6	17.6	11.8	14.5	20.0	15.8	12.1	25.0	13.5	4.7	6.3	5.0	5.6	16.7	14.7	9.8	17.1	11.9	188
3001 bis 4000 Fr.	12.4	10.9	12.0	10.3	4.0	8.8	22.7	12.5	21.6	8.4	0.0	7.2	5.6	13.1	11.8	12.0	10.1	11.5	182
4001 bis 5000 Fr.	17.5	6.7	14.6	8.5	0.0	6.5	16.7	12.5	16.2	5.3	0.0	4.5	22.2	6.0	8.8	14.0	4.9	11.4	181
5001 bis 6000 Fr.	11.3	7.9	10.4	4.8	0.0	3.7	10.6	0.0	9.5	1.6	6.3	2.3	5.6	14.3	12.7	8.4	8.1	8.3	132
6001 bis 8000 Fr.	9.3	3.8	7.8	1.2	0.0	0.9	3.0	0.0	2.7	1.1	0.0	0.9	11.1	9.5	9.8	6.2	4.0	5.6	89
8001 bis 10 000 Fr.	2.0	0.4	1.6	1.2	0.0	0.9	1.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.6	0.7	1.3	21
10001 bis 15 000 Fr.	1.4	0.4	1.1	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.7	11
über 15 000 Fr.	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	6
N**	646	239	885	165	50	215	66	8	74	190	32	222	18	84	102	1'138	445	1'583	1'583
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'126</i>	<i>909</i>	<i>3'035</i>	<i>311</i>	<i>104</i>	<i>415</i>	<i>158</i>	<i>56</i>	<i>214</i>	<i>689</i>	<i>118</i>	<i>807</i>	<i>191</i>	<i>704</i>	<i>896</i>	<i>3'715</i>	<i>2'107</i>	<i>5'823</i>	<i>5'823</i>
Schulden*																			
keine Schulden	64.0	81.8	69.1	34.9	50.0	38.7	49.6	51.4	50.0	85.2	84.3	85.1	79.2	90.4	88.3	65.5	79.6	69.7	2'082
bis 5000 Fr.	5.3	2.7	4.6	11.1	8.8	10.5	7.0	14.3	8.5	4.9	5.6	5.0	0.0	1.4	1.2	6.0	3.8	5.4	160
5001 bis 10 000 Fr.	6.2	4.0	5.6	10.2	15.0	11.4	13.2	8.6	12.2	2.8	4.5	3.1	6.3	3.8	4.3	6.2	5.3	5.9	177
10 001 bis 25 000 Fr.	8.6	5.5	7.7	20.0	11.3	17.8	15.5	11.4	14.6	3.2	3.4	3.2	6.3	1.9	2.7	8.8	5.1	7.7	230
25 001 bis 50 000 Fr.	6.4	3.0	5.4	11.5	10.0	11.1	8.5	11.4	9.1	2.7	1.1	2.4	4.2	1.0	1.6	6.0	3.5	5.3	157
50 001 bis 100 000 Fr.	4.3	1.2	3.4	6.8	5.0	6.3	4.7	2.9	4.3	0.9	1.1	1.0	4.2	0.5	1.2	3.9	1.6	3.2	95
über 100 000 Fr.	5.2	1.7	4.2	5.5	0.0	4.1	1.6	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	1.0	0.8	3.5	1.2	2.8	85
N**	1'020	402	1'422	235	80	315	129	35	164	527	89	616	48	209	257	2'091	895	2'986	2'986
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'752</i>	<i>746</i>	<i>2'498</i>	<i>241</i>	<i>74</i>	<i>315</i>	<i>95</i>	<i>29</i>	<i>124</i>	<i>352</i>	<i>61</i>	<i>413</i>	<i>161</i>	<i>579</i>	<i>741</i>	<i>2'762</i>	<i>1'657</i>	<i>4'420</i>	<i>4'420</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	86.3	97.2	89.5	48.2	72.7	54.3	53.9	100.0	59.3	87.8	90.5	88.1	80.0	94.4	83.8	1'538
Strafhaft	6.4	1.4	5.0	23.2	16.4	21.5	19.7	0.0	17.4	5.3	9.5	5.7	9.0	3.3	7.5	138
Untersuchungshaft	4.8	0.8	3.7	12.2	9.1	11.4	15.8	0.0	14.0	3.2	0.0	2.9	6.0	1.7	4.9	90
Straf- und Untersuchungshaft	2.4	0.6	1.9	16.5	1.8	12.8	10.5	0.0	9.3	3.7	0.0	3.3	4.9	0.6	3.8	70
N**	869	355	1'224	164	55	219	76	10	86	189	21	210	1'358	478	1'836	1'836
fehlende Angaben	1'903	793	2'696	312	99	411	148	54	202	690	129	819	3'286	1'286	4'572	4'572
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	25.9	25.0	25.8	29.0	33.3	29.6	16.0	.	16.0	50.0	50.0	50.0	28.1	31.8	28.4	62
1 bis 2 Monate	18.5	25.0	19.1	8.7	16.7	9.9	4.0	.	4.0	6.3	50.0	11.1	11.7	22.7	12.8	28
>2 bis 6 Monate	33.3	12.5	31.5	26.1	25.0	25.9	28.0	.	28.0	25.0	0.0	22.2	29.1	18.2	28.0	60
>6 bis 12 Monate	7.4	12.5	7.9	10.1	16.7	11.1	16.0	.	16.0	6.3	0.0	5.6	9.2	13.6	9.6	21
mehr als 1 Jahr	14.8	25.0	15.7	26.1	8.3	23.5	36.0	.	36.0	12.5	0.0	11.1	21.9	13.6	21.1	46
N**	80	8	88	69	12	81	25	0	25	16	2	18	195	22	217	217
fehlende Angaben	39	2	41	16	3	19	10	0	10	7	0	7	76	5	81	81

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	31.5	39.2	33.8	45.0	44.3	44.8	36.2	34.9	35.9	18.3	28.7	19.8	62.4	73.6	71.3	32.5	49.8	38.5	2'685
PartnerIn	4.7	2.8	4.1	3.4	3.4	3.4	2.7	1.6	2.5	1.8	1.4	1.7	4.3	2.1	2.5	4.0	2.5	3.5	245
Familie	3.7	4.3	3.9	2.4	5.4	3.1	8.1	14.3	9.5	10.0	7.7	9.7	9.1	4.0	5.1	5.6	5.2	5.5	381
FreundInnen/Bekannte	1.5	3.0	1.9	1.7	5.4	2.6	5.4	7.9	6.0	0.8	1.4	0.9	1.1	5.1	4.3	1.5	3.8	2.3	163
spez. ambulante Institution	1.5	3.3	2.1	4.1	4.7	4.2	0.9	4.8	1.8	0.8	2.1	1.0	4.3	1.7	2.2	1.7	2.6	2.0	142
spez. stationäre Institution	5.7	5.6	5.6	6.2	2.7	5.4	4.1	4.8	4.2	0.7	2.1	0.9	1.1	0.3	0.4	4.3	3.1	3.9	271
Arztpraxis	8.5	11.2	9.3	9.4	10.1	9.6	3.6	6.3	4.2	2.1	2.8	2.2	1.6	4.4	3.9	6.6	8.0	7.1	494
Spital/Klinik	13.3	15.2	13.9	3.9	8.1	4.9	6.3	6.3	6.3	1.9	4.2	2.2	0.0	1.4	1.1	8.8	9.0	8.9	618
Sozialdienste	5.9	5.5	5.8	6.4	6.7	6.5	3.2	6.3	3.9	4.0	3.5	3.9	6.5	4.0	4.5	5.4	5.0	5.3	368
Justiz/adm. Massnahme	16.0	4.3	12.5	13.3	6.0	11.5	22.2	3.2	18.0	50.4	32.9	47.9	2.7	0.7	1.1	21.3	4.9	15.7	1'096
ArbeitgeberIn	4.3	2.0	3.7	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	3.2	0.6	1.1	3.2	1.4	2.6	181
LehrerIn	0.0	0.2	0.1	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9	2.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	62
anderes	3.4	3.6	3.5	2.4	2.0	2.3	7.2	9.5	7.7	4.9	6.3	5.1	3.2	1.7	2.0	4.1	3.4	3.9	272
N**	2'575	1'081	3'656	467	149	616	221	63	284	851	143	994	186	723	909	4'582	2'396	6'978	6'978
fehlende Angaben	197	67	264	9	5	14	3	1	4	28	7	35	23	65	89	271	156	428	428
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	25.4	23.3	24.9	21.3	18.3	20.6	26.8	26.1	26.7	13.4	24.4	14.9	6.5	10.9	10.0	22.3	19.6	21.5	658
PartnerIn	10.6	5.6	9.2	7.4	5.6	7.0	6.3	0.0	5.2	4.7	4.4	4.7	11.3	3.4	4.9	8.9	4.8	7.6	234
Familie	3.9	8.0	5.0	6.6	11.3	7.6	8.9	8.7	8.9	8.3	8.9	8.4	11.3	4.1	5.5	5.5	7.1	6.0	183
FreundInnen/Bekannte	1.9	1.8	1.8	2.9	4.2	3.2	2.7	13.0	4.4	0.4	6.7	1.2	3.2	4.9	4.6	1.8	3.3	2.3	70
spez. ambulante Institution	1.5	1.6	1.5	2.9	4.2	3.2	1.8	0.0	1.5	0.4	0.0	0.3	1.6	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	46
spez. stationäre Institution	1.9	3.0	2.2	2.5	7.0	3.5	0.0	4.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	1.7	52
Arztpraxis	4.1	5.2	4.4	9.8	9.9	9.8	8.0	4.3	7.4	1.8	4.4	2.2	6.5	1.5	2.4	4.7	4.5	4.6	142
Spital/Klinik	3.6	6.4	4.4	3.3	1.4	2.9	3.6	4.3	3.7	1.1	0.0	0.9	3.2	0.4	0.9	3.2	3.8	3.4	104
Sozialdienste	2.3	2.0	2.2	2.9	2.8	2.9	3.6	0.0	3.0	2.2	0.0	1.9	1.6	1.1	1.2	2.5	1.8	2.3	70
Justiz/adm. Massnahme	3.6	1.8	3.1	3.3	1.4	2.9	6.3	4.3	5.9	1.4	0.0	1.2	1.6	0.4	0.6	3.2	1.2	2.6	79
ArbeitgeberIn	2.8	1.2	2.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.8	0.8	1.5	46
LehrerIn	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	4.3	0.7	0.7	0.0	0.6	1.6	1.1	1.2	0.3	0.7	0.5	14
anderes	2.4	2.6	2.5	4.1	4.2	4.1	2.7	0.0	2.2	5.4	4.4	5.3	4.8	1.5	2.1	3.3	2.7	3.1	94
keine	43.7	44.3	43.8	41.4	36.6	40.3	45.5	34.8	43.7	63.5	48.9	61.5	51.6	70.8	67.2	47.0	50.9	48.3	48.3
N**	1'289	497	1'786	244	71	315	112	23	135	277	45	322	62	267	329	2'090	973	3'063	3'063
fehlende Angaben	1'483	651	2'134	232	83	315	112	41	153	602	105	707	147	521	669	2'763	1'579	4'343	4'343

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hilferwartungen für...*																			
Suchtprobleme	83.4	88.8	84.9	92.3	82.1	89.9	85.4	85.0	85.3	69.9	67.4	69.6	58.0	57.3	57.5	81.0	77.6	79.9	2'635
somatische Probleme	2.3	3.9	2.7	3.9	5.1	4.2	0.8	5.0	1.4	1.4	0.0	1.2	0.0	1.0	0.8	2.1	3.0	2.4	78
psychische Probleme	12.3	25.1	16.1	12.0	21.8	14.2	14.6	25.0	16.1	6.1	17.4	7.6	10.1	16.1	14.9	11.5	21.4	14.7	485
Beziehungsprobleme	11.3	20.0	13.8	7.7	15.4	9.5	15.4	10.0	14.7	6.4	10.9	7.0	24.6	39.2	36.3	10.8	23.1	14.8	487
Familienprobleme	7.2	11.2	8.4	7.7	12.8	8.9	8.1	15.0	9.1	11.5	15.2	12.0	47.8	47.9	47.9	9.2	21.3	13.1	433
finanzielle Probleme	5.8	6.4	6.0	14.7	25.6	17.2	11.4	5.0	10.5	6.4	4.3	6.1	8.7	6.3	6.8	7.8	8.1	7.9	259
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	12.5	14.6	13.1	15.1	16.7	15.4	7.3	10.0	7.7	11.1	13.0	11.4	2.9	7.0	6.2	11.8	11.7	11.8	389
Wohnprobleme	3.4	4.1	3.6	7.7	14.1	9.2	5.7	10.0	6.3	3.4	4.3	3.5	8.7	3.8	4.8	4.2	4.9	4.4	145
Gewaltprobleme	1.2	1.6	1.3	0.4	2.6	0.9	1.6	0.0	1.4	0.7	4.3	1.2	2.9	3.5	3.4	1.2	2.2	1.5	50
rechtliche Probleme	9.7	3.7	8.0	10.8	9.0	10.4	10.6	15.0	11.2	12.8	6.5	12.0	8.7	2.8	3.9	10.0	3.9	8.0	265
andere(s)	2.0	1.1	1.8	1.9	1.3	1.8	1.6	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.0	1.4	1.1	2.4	1.7	2.2	71
keine Erwartung	9.3	6.4	8.4	1.9	6.4	3.0	8.9	5.0	8.4	21.3	19.6	21.1	1.4	0.7	0.8	9.8	5.5	8.4	278
N**	1'370	561	1'931	259	78	337	123	20	143	296	46	342	69	286	355	2'231	1'068	3'299	3'299
fehlende Angaben	1'402	587	1'989	217	76	293	101	44	145	583	104	687	140	502	643	2'622	1'484	4'107	4'107
Rechtsgrundlage der Behandlung																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.6	0.0	0.4	1.4	0.0	1.0	1.9	0.0	1.6	6.0	5.0	5.8	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	1.0	30
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	2.3	0.6	1.8	1.4	1.5	1.4	3.8	0.0	3.3	1.6	0.0	1.4	1.8	0.0	0.4	2.0	0.4	1.5	44
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	6.7	2.5	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	24
anderes	13.0	5.7	10.9	6.3	1.5	5.2	19.2	0.0	16.3	21.8	15.0	20.9	0.0	0.0	0.0	13.2	4.3	10.4	298
keine (freiwillige Behandlung)	83.5	93.5	86.4	90.0	97.0	91.7	74.0	100.0	78.0	63.9	77.5	65.8	98.2	100.0	99.6	81.9	94.8	86.0	2'457
N**	1'214	489	1'703	221	67	288	104	19	123	252	40	292	57	228	285	1'955	903	2'858	2'858
fehlende Angaben	1'558	659	2'217	255	87	342	120	45	165	627	110	737	152	560	713	2'898	1'649	4'548	4'548

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	46.5	38.5	44.1	16.1	19.8	17.0	51.8	55.7	52.8	78.6	71.2	77.5	69.9	67.3	67.8	51.7	50.4	51.3	3'147
ja	53.5	61.5	55.9	83.9	80.2	83.0	48.2	44.3	47.2	21.4	28.8	22.5	30.1	32.7	32.2	48.3	49.6	48.7	2'992
N**	2'275	957	3'232	403	131	534	193	61	254	758	139	897	156	620	776	4'032	2'107	6'139	6'139
fehlende Angaben	497	191	688	73	23	96	31	3	34	121	11	132	53	168	222	821	445	1'267	1'267
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.9	1.7	1.2	4.8	7.4	5.5	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	1.6	36
Substitution (Methadon, Subutex®)	3.7	4.6	4.0	69.1	79.0	71.7	17.5	0.0	14.9	3.1	4.3	3.3	6.3	0.9	2.0	14.7	11.7	13.7	309
weitere medikamentöse Suchtbeh.	10.6	9.1	10.2	7.4	17.3	10.0	7.0	10.0	7.5	3.1	8.7	4.1	0.0	0.9	0.7	9.1	8.6	8.9	201
ambulante Beratung	68.4	70.1	68.9	62.6	64.2	63.0	66.7	60.0	65.7	84.7	78.3	83.5	78.1	84.5	83.1	68.9	72.4	70.1	1'583
stationäre Therapie	51.7	57.6	53.6	39.6	50.6	42.4	40.4	70.0	44.8	18.4	30.4	20.7	31.3	10.3	14.9	45.6	47.2	46.2	1'043
Entzug	45.0	50.5	46.8	54.8	54.3	54.7	40.4	60.0	43.3	10.2	17.4	11.6	12.5	4.3	6.1	41.8	40.2	41.3	932
Selbsthilfegruppe	5.9	9.4	7.0	4.8	4.9	4.8	1.8	0.0	1.5	1.0	4.3	1.7	3.1	4.3	4.1	5.2	7.7	6.1	137
andere	2.5	2.1	2.4	2.2	6.2	3.2	5.3	0.0	4.5	3.1	4.3	3.3	0.0	4.3	3.4	2.6	3.3	2.9	65
N**	996	481	1'477	230	81	311	57	10	67	98	23	121	32	116	148	1'480	779	2'259	2'259
fehlende Angaben	220	106	326	89	22	111	21	11	32	47	6	53	15	85	100	411	241	652	652

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung*																
nein	98.6	97.8	98.4	56.9	50.5	55.3	93.1	95.3	93.6	99.5	99.2	99.5	94.2	93.8	94.1	4'180
ja	1.4	2.2	1.6	43.1	49.5	44.7	6.9	4.7	6.4	0.5	0.8	0.5	5.8	6.2	5.9	263
N**	1'866	789	2'655	318	105	423	159	43	202	664	124	788	3'209	1'234	4'443	4'443
fehlende Angaben	906	359	1'265	158	49	207	65	21	86	215	26	241	1'435	530	1'965	1'965
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	8.0	0.0	4.8	3.0	7.7	4.3	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	5.3	4.2	11
Methadon	72.0	82.4	76.2	91.1	86.5	89.8	54.5	100.0	61.5	100.0	100.0	100.0	86.3	85.5	86.1	223
andere Opiate	16.0	11.8	14.3	5.9	5.8	5.9	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	7.7	20
andere Substanzen	4.0	5.9	4.8	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	1.9	5
N**	25	17	42	135	52	187	11	2	13	3	1	4	183	76	259	259
fehlende Angaben	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Andere parallele Behandlung*																
nein	90.3	84.0	88.5	80.2	76.5	79.3	82.9	68.4	80.8	94.8	95.1	94.8	89.3	83.9	87.9	2'351
ja	9.7	16.0	11.5	19.8	23.5	20.7	17.1	31.6	19.2	5.2	4.9	5.2	10.7	16.1	12.1	325
N**	1'267	514	1'781	222	68	290	111	19	130	268	41	309	1'975	701	2'676	2'676
fehlende Angaben	1'505	634	2'139	254	86	340	113	45	158	611	109	720	2'669	1'063	3'732	3'732
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	61.3	69.6	64.6	77.3	68.8	75.0	41.2	40.0	40.9	71.4	50.0	68.8	64.4	67.9	65.6	206
stationäre Therapie	5.9	5.1	5.6	15.9	18.8	16.7	23.5	40.0	27.3	0.0	0.0	0.0	9.3	9.2	9.2	29
Selbsthilfegruppe	5.0	6.3	5.6	2.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.6	3.8	12
anderes	28.6	22.8	26.3	11.4	12.5	11.7	35.3	20.0	31.8	28.6	50.0	31.3	24.9	21.1	23.6	74
N**	119	79	198	44	16	60	17	5	22	14	2	16	205	109	314	314
fehlende Angaben	4	3	7	0	0	0	2	1	3	0	0	0	7	4	11	11

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	79.3	72.5	77.3	87.1	83.6	86.3	90.5	90.0	90.4	97.3	97.5	97.3	84.2	77.3	82.4	2'100
Entzug in der gleichen Institution	1.2	1.6	1.3	0.4	1.5	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	1.0	25
Entzug in einer anderen Institution	19.5	25.9	21.4	12.5	14.9	13.1	8.6	10.0	8.8	2.7	2.5	2.7	15.0	21.4	16.7	425
N**	1'191	495	1'686	224	67	291	105	20	125	257	40	297	1'871	679	2'550	2'550
fehlende Angaben	1'581	653	2'234	252	87	339	119	44	163	622	110	732	2'773	1'085	3'858	3'858

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2010)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
nie	63.6	52.0	60.3	19.4	18.4	19.1	57.1	62.5	57.7	72.3	80.0	72.9	59.1	49.4	56.6	785
einmal	8.0	6.7	7.6	10.5	12.2	11.0	7.1	25.0	9.0	12.9	6.7	12.4	9.0	8.7	8.9	124
zwei oder dreimal	9.3	14.7	10.8	16.9	20.4	17.9	11.4	0.0	10.3	5.2	0.0	4.7	9.8	14.0	10.9	151
mehr als dreimal	19.2	26.6	21.3	53.2	49.0	52.0	24.3	12.5	23.1	9.7	13.3	10.0	22.1	27.8	23.6	327
N**	637	252	889	124	49	173	70	8	78	155	15	170	1'031	356	1'387	1'387
fehlende Angaben	2'135	896	3'031	352	105	457	154	56	210	724	135	859	3'613	1'408	5'021	5'021

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2010)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	59.7	65.1	61.2	3'920	Alkohol	59.7	65.1	61.2	3'920
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.3	0.3	19	Cocktail	0.3	0.3	0.3	19
Heroin	8.5	6.6	8.0	512	Opiate	10.0	8.4	9.5	611
Methadon	1.1	1.1	1.1	70					
andere Opiate	0.4	0.6	0.5	29					
Kokain	4.7	3.6	4.4	283	Kokain und Derivate	4.8	3.6	4.5	288
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.1	5					
Amphetamine	0.4	0.5	0.4	26	Stimulantien	0.5	1.1	0.7	43
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.5	0.2	15					
andere Stimulantien	0.0	0.1	0.0	2					
Barbiturate	0.0	0.1	0.0	2	Medikamente	0.5	1.9	0.9	58
Benzodiazepine	0.5	1.4	0.7	47					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.4	0.1	9					
LSD	0.0	0.1	0.0	3	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	6
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	3					
Cannabis	18.9	8.5	16.1	1'029	Cannabis	18.9	8.5	16.1	1'029
Tabak	1.4	3.5	2.0	125	Tabak	1.4	3.5	2.0	125
flüchtige Stoffe	0.0	0.1	0.0	2	andere Substanzen	0.5	0.9	0.6	40
andere Substanz	0.5	0.8	0.6	38					
pathologisches Spielen	1.9	1.6	1.8	118	suchtähnliche Verhaltensweisen	3.3	6.6	4.2	268
Essstörungen	0.1	3.3	1.0	64					
anderes suchtähnliches Problem	1.2	1.7	1.3	86					
N**	4'644	1'763	6'407	6'407	4'644	1'763	6'407	6'407	6'407
fehlende Angaben	0	1	1	1	0	1	1	1	1

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	28.1	37.5	30.3	40.1	37.5	6.7	.	29.7	9.1	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.4	12.5	8.5	20.4	6.3	6.7	.	18.9	1.8	25.0
2-3 Tage pro Woche	14.0	12.5	11.1	17.4	31.3	13.3	.	16.3	5.5	0.0
4-6 Tage pro Woche	10.2	12.5	6.7	10.8	18.8	6.7	.	9.0	7.3	25.0
einmal täglich	12.0	0.0	26.8	3.6	0.0	20.0	.	9.4	1.8	50.0
mehrmals täglich	27.3	25.0	16.6	7.8	6.3	46.7	.	16.7	74.5	0.0
N**	1'891	8	343	167	16	15	0	700	55	4
<i>fehlende Angaben</i>	881	5	120	57	8	10	5	179	8	21
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.9	0.0	14.9	21.5	12.5	7.1	.	7.3	1.8	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.2	12.5	11.6	29.7	31.3	7.1	.	27.6	3.6	22.2
2-3 Tage pro Woche	16.8	12.5	9.5	20.3	18.8	7.1	.	18.9	7.3	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.9	25.0	8.5	11.0	18.8	0.0	.	10.1	7.3	22.2
einmal täglich	13.9	0.0	30.2	5.2	6.3	21.4	.	11.6	1.8	33.3
mehrmals täglich	40.3	50.0	25.3	12.2	12.5	57.1	.	24.4	78.2	22.2
N**	1'877	8	328	172	16	14	0	671	55	9
<i>fehlende Angaben</i>	895	5	135	52	8	11	5	208	8	16

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer

Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	44.6	0.0	20.0
1 Tag pro Woche oder weniger	23.2	0.0	15.0
2-3 Tage pro Woche	5.4	0.0	12.5
4-6 Tage pro Woche	7.1	0.0	7.5
einmal täglich	5.4	0.0	12.5
mehrmals täglich	14.3	100.0	32.5
N**	56	3	40
<i>fehlende Angaben</i>	34	2	16
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	12.2	0.0	5.6
1 Tag pro Woche oder weniger	36.6	0.0	5.6
2-3 Tage pro Woche	14.6	0.0	16.7
4-6 Tage pro Woche	9.8	0.0	13.9
einmal täglich	7.3	0.0	11.1
mehrmals täglich	19.5	100.0	47.2
N**	41	3	36
<i>fehlende Angaben</i>	49	2	20

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	21.2	33.3	20.5	26.1	45.5	26.9	.	21.7	8.9	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	11.5	33.3	14.3	21.7	27.3	7.7	.	19.4	0.0	40.0
2-3 Tage pro Woche	14.8	33.3	8.0	13.0	18.2	0.0	.	15.5	3.6	0.0
4-6 Tage pro Woche	11.4	0.0	5.4	13.0	9.1	3.8	.	7.8	1.8	0.0
einmal täglich	10.5	0.0	29.5	10.9	0.0	30.8	.	11.6	1.8	20.0
mehrmals täglich	30.7	0.0	22.3	15.2	0.0	30.8	.	24.0	83.9	40.0
N**	784	3	112	46	11	26	0	129	56	5
fehlende Angaben	364	3	36	18	8	7	1	21	6	10
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	6.6	0.0	15.0	8.7	9.1	12.5	.	3.1	1.8	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.1	66.7	15.0	23.9	45.5	8.3	.	22.0	0.0	14.3
2-3 Tage pro Woche	16.7	0.0	10.3	23.9	18.2	4.2	.	15.7	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.7	0.0	8.4	13.0	0.0	0.0	.	7.9	5.5	0.0
einmal täglich	13.5	0.0	27.1	10.9	9.1	29.2	.	15.7	1.8	14.3
mehrmals täglich	41.4	33.3	24.3	19.6	18.2	45.8	.	35.4	90.9	71.4
N**	778	3	107	46	11	24	0	127	55	7
fehlende Angaben	370	3	41	18	8	9	1	23	7	8

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Frauen

Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	85.7	6.7	5.3
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	3.3	26.3
2-3 Tage pro Woche	7.1	10.0	15.8
4-6 Tage pro Woche	0.0	6.7	10.5
einmal täglich	7.1	10.0	5.3
mehrmals täglich	0.0	63.3	36.8
N**	14	30	19
fehlende Angaben	14	29	11
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	66.7	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	11.1	6.9	31.6
2-3 Tage pro Woche	11.1	13.8	15.8
4-6 Tage pro Woche	11.1	3.4	5.3
einmal täglich	0.0	6.9	10.5
mehrmals täglich	0.0	69.0	36.8
N**	9	29	19
fehlende Angaben	19	30	11

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	26.1	36.4	27.9	37.1	40.7	19.5	.	28.5	9.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.3	18.2	9.9	20.7	14.8	7.3	.	18.9	0.9	33.3
2-3 Tage pro Woche	14.2	18.2	10.3	16.4	25.9	4.9	.	16.2	4.5	0.0
4-6 Tage pro Woche	10.5	9.1	6.4	11.3	14.8	4.9	.	8.8	4.5	11.1
einmal täglich	11.5	0.0	27.5	5.2	0.0	26.8	.	9.8	1.8	33.3
mehrmals täglich	28.3	18.2	18.0	9.4	3.7	36.6	.	17.9	79.3	22.2
N**	2'675	11	455	213	27	41	0	829	111	9
<i>fehlende Angaben</i>	1'245	8	156	75	16	17	6	200	14	31
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.5	0.0	14.9	18.8	11.1	10.5	.	6.6	1.8	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.4	27.3	12.4	28.4	37.0	7.9	.	26.7	1.8	18.8
2-3 Tage pro Woche	16.8	9.1	9.7	21.1	18.5	5.3	.	18.4	3.6	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.9	18.2	8.5	11.5	11.1	0.0	.	9.8	6.4	12.5
einmal täglich	13.7	0.0	29.4	6.4	7.4	26.3	.	12.3	1.8	25.0
mehrmals täglich	40.6	45.5	25.1	13.8	14.8	50.0	.	26.2	84.5	43.8
N**	2'655	11	435	218	27	38	0	798	110	16
<i>fehlende Angaben</i>	1'265	8	176	70	16	20	6	231	15	24

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2010), Männer und Frauen

Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	52.9	6.1	15.3
1 Tag pro Woche oder weniger	18.6	3.0	18.6
2-3 Tage pro Woche	5.7	9.1	13.6
4-6 Tage pro Woche	5.7	6.1	8.5
einmal täglich	5.7	9.1	10.2
mehrmals täglich	11.4	66.7	33.9
N**	70	33	59
<i>fehlende Angaben</i>	48	31	27
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	22.0	0.0	3.6
1 Tag pro Woche oder weniger	32.0	6.3	14.5
2-3 Tage pro Woche	14.0	12.5	16.4
4-6 Tage pro Woche	10.0	3.1	10.9
einmal täglich	6.0	6.3	10.9
mehrmals täglich	16.0	71.9	43.6
N**	50	32	55
<i>fehlende Angaben</i>	68	32	31

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.2	18.9	21.5	22.2	19.7	26.7	.	14.8	15.7	14.0
Standardabweichung	4.0	5.3	6.3	7.0	4.3	8.1	.	2.5	7.7	0.0
1. Quartil	14.0	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	.	14.0	13.0	14.0
Medianwert	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	.	15.0	15.0	14.0
3. Quartil	17.0	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	.	16.0	17.0	14.0
N*	1'216	7	307	151	15	9	0	654	34	4
fehlende Angaben	1'556	6	156	73	9	16	5	225	29	21
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	21.9	20.1	22.9	24.7	20.9	25.1	.	15.9	15.8	.
Standardabweichung	7.7	7.4	6.5	7.7	3.9	5.4	.	3.0	3.3	.
1. Quartil	17.0	15.0	18.0	19.0	18.0	19.0	.	14.0	14.0	.
Medianwert	20.0	16.0	21.0	23.0	20.0	26.0	.	15.0	15.0	.
3. Quartil	24.0	27.0	27.0	29.5	25.0	30.0	.	16.0	17.0	.
N*	1'114	7	236	124	15	7	0	514	32	0
fehlende Angaben	1'658	6	227	100	9	18	5	365	31	25
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.0	21.1	24.4	26.3	21.1	28.8	.	16.6	18.1	15.5
Standardabweichung	12.3	8.3	7.6	7.7	4.4	9.5	.	3.9	7.6	2.1
1. Quartil	21.0	16.0	19.0	20.0	18.5	20.0	.	15.0	15.0	14.0
Medianwert	29.0	17.5	23.0	25.0	19.5	28.0	.	16.0	15.5	15.5
3. Quartil	40.0	27.0	28.0	31.0	24.5	33.0	.	17.0	18.0	17.0
N*	1'076	8	249	136	12	11	0	481	30	2
fehlende Angaben	1'696	5	214	88	12	14	5	398	33	23
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.0	.	7.2	8.6	5.7	5.9	.	4.6	10.6	7.0
Standardabweichung	13.8	.	7.2	6.1	4.2	2.9	.	5.8	12.0	7.9
1. Quartil	13.0	.	2.3	3.5	2.8	3.8	.	1.3	1.3	2.1
Medianwert	22.9	.	4.6	7.6	4.0	5.9	.	2.2	4.0	4.6
3. Quartil	33.9	.	10.0	11.6	9.0	7.9	.	5.5	21.2	11.9
N*	560	0	51	76	8	2	0	507	25	4
fehlende Angaben	498	0	14	24	3	2	1	89	20	7

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	18.2	16.5	20.7	19.5	20.6	28.5	.	14.6	16.2	23.0
Standardabweichung	6.0	0.7	6.2	6.2	11.6	11.3	.	2.5	4.0	8.3
1. Quartil	15.0	16.0	16.0	16.0	14.0	18.0	.	13.0	14.0	17.0
Medianwert	17.0	16.5	19.0	18.0	16.0	30.0	.	14.0	15.0	24.0
3. Quartil	20.0	17.0	23.0	20.0	26.0	38.0	.	16.0	17.0	27.0
N*	459	2	93	41	11	12	0	120	31	5
fehlende Angaben	689	4	55	23	8	21	1	30	31	10
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	27.7	17.5	22.4	20.8	24.4	32.3	.	16.0	18.1	24.3
Standardabweichung	11.5	0.7	6.9	5.4	13.4	12.1	.	4.3	5.1	10.6
1. Quartil	19.0	17.0	18.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	15.0	13.0
Medianwert	25.0	17.5	21.0	19.0	17.0	38.5	.	16.0	17.0	26.0
3. Quartil	35.0	18.0	25.0	22.0	26.0	41.0	.	16.0	20.0	34.0
N*	440	2	71	33	7	10	0	91	38	3
fehlende Angaben	708	4	77	31	12	23	1	59	24	12
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	35.0	17.0	22.7	21.5	21.4	30.5	.	17.1	19.9	28.5
Standardabweichung	12.4	.	7.0	6.9	11.3	13.7	.	5.1	8.1	4.4
1. Quartil	25.0	17.0	18.0	18.0	16.0	17.0	.	14.0	15.0	25.0
Medianwert	34.0	17.0	21.0	20.0	17.0	30.0	.	16.0	17.0	28.0
3. Quartil	43.0	17.0	26.0	24.0	26.0	41.0	.	18.0	20.0	32.0
N*	481	1	81	40	11	13	0	95	34	4
fehlende Angaben	667	5	67	24	8	20	1	55	28	11
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.2	6.0	5.8	5.1	2.2	27.1	.	6.7	17.3	5.0
Standardabweichung	12.0	.	7.2	5.3	1.3	37.2	.	9.3	14.1	5.6
1. Quartil	15.7	6.0	1.6	1.6	0.9	0.8	.	1.1	2.1	1.0
Medianwert	26.3	6.0	3.6	2.9	2.1	27.1	.	2.7	18.8	5.0
3. Quartil	33.4	6.0	6.1	6.8	2.9	53.4	.	7.7	28.7	8.9
N*	181	1	23	25	8	2	0	86	24	2
fehlende Angaben	187	1	1	9	4	7	0	13	16	1

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2010), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.7	18.3	21.4	21.6	20.1	27.7	.	14.7	15.9	19.0
Standardabweichung	4.7	4.7	6.3	6.9	8.0	9.9	.	2.5	6.2	7.5
1. Quartil	15.0	16.0	17.0	17.0	16.0	19.0	.	14.0	13.0	14.0
Medianwert	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	28.0	.	15.0	15.0	14.0
3. Quartil	18.0	20.0	24.0	24.5	25.0	35.0	.	16.0	17.0	24.0
N*	1'675	9	400	192	26	21	0	774	65	9
fehlende Angaben	2'245	10	211	96	17	37	6	255	60	31
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.5	19.6	22.8	23.9	22.0	29.4	.	15.9	17.0	24.3
Standardabweichung	9.3	6.5	6.6	7.4	8.0	10.3	.	3.2	4.5	10.6
1. Quartil	18.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	14.0	14.0	13.0
Medianwert	20.0	17.0	21.0	21.0	19.5	30.0	.	15.0	16.0	26.0
3. Quartil	26.0	21.0	26.0	28.0	26.0	39.0	.	16.0	18.0	34.0
N*	1'554	9	307	157	22	17	0	605	70	3
fehlende Angaben	2'366	10	304	131	21	41	6	424	55	37
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.3	20.7	24.0	25.2	21.2	29.7	.	16.6	19.0	24.2
Standardabweichung	12.5	7.9	7.5	7.8	8.3	11.7	.	4.1	7.9	7.6
1. Quartil	22.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	15.0	15.0	17.0
Medianwert	30.0	17.0	22.0	24.0	19.0	28.0	.	16.0	16.5	25.0
3. Quartil	40.0	21.0	28.0	30.0	25.0	40.5	.	17.0	20.0	30.0
N*	1'557	9	330	176	23	24	0	576	64	6
fehlende Angaben	2'363	10	281	112	20	34	6	453	61	34
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.3	6.0	6.8	7.7	4.0	16.5	.	4.9	13.8	6.3
Standardabweichung	13.4	.	7.2	6.1	3.5	24.8	.	6.5	13.4	6.7
1. Quartil	13.7	6.0	2.1	2.8	1.7	2.3	.	1.3	1.4	1.0
Medianwert	24.2	6.0	3.8	6.4	2.8	5.9	.	2.3	7.0	4.6
3. Quartil	33.8	6.0	8.7	10.7	4.7	30.7	.	5.8	26.1	8.9
N*	741	1	74	101	16	4	0	593	49	6
fehlende Angaben	685	1	15	33	7	9	1	102	36	8

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	22.3	14.0	15.4
Standardabweichung	12.6	5.7	5.3
1. Quartil	16.0	10.0	14.0
Medianwert	20.0	14.0	14.0
3. Quartil	25.0	18.0	16.0
N*	23	2	17
fehlende Angaben	67	3	39
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	25.7	19.0	19.5
Standardabweichung	12.5	1.4	10.1
1. Quartil	20.0	18.0	15.0
Medianwert	22.0	19.0	17.0
3. Quartil	27.0	20.0	18.0
N*	25	2	22
fehlende Angaben	65	3	34
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	29.8	33.3	22.2
Standardabweichung	12.4	17.2	10.7
1. Quartil	21.0	18.0	17.0
Medianwert	26.0	30.0	18.0
3. Quartil	36.0	52.0	24.0
N*	31	3	21
fehlende Angaben	59	2	35
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	15.0	23.6	12.0
Standardabweichung	12.2	32.1	8.8
1. Quartil	4.0	0.9	5.0
Medianwert	13.3	23.6	10.3
3. Quartil	24.4	46.2	15.4
N*	23	2	17
fehlende Angaben	67	3	39

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	42.0	17.3	19.0
Standardabweichung	21.3	5.7	9.1
1. Quartil	23.0	14.0	15.0
Medianwert	38.0	16.0	18.0
3. Quartil	65.0	19.0	20.0
N*	3	25	11
fehlende Angaben	25	34	19
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	42.4	18.6	25.6
Standardabweichung	15.5	6.4	13.9
1. Quartil	38.0	15.0	17.0
Medianwert	40.0	17.0	19.5
3. Quartil	45.0	21.0	37.5
N*	5	26	12
fehlende Angaben	23	33	18
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	42.3	20.3	30.0
Standardabweichung	16.3	9.2	14.9
1. Quartil	30.0	15.0	19.0
Medianwert	40.0	17.0	24.0
3. Quartil	55.0	21.0	45.0
N*	6	27	15
fehlende Angaben	22	32	15
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	13.0	7.5	11.6
Standardabweichung	15.0	8.5	10.7
1. Quartil	2.4	1.8	2.7
Medianwert	6.5	3.9	8.1
3. Quartil	30.1	11.3	22.5
N*	3	25	11
fehlende Angaben	25	34	19

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2010), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	24.5	17.0	16.8
Standardabweichung	14.8	5.6	7.1
1. Quartil	16.0	14.0	14.0
Medianwert	20.0	16.0	16.0
3. Quartil	25.0	19.0	18.0
N*	26	27	28
fehlende Angaben	92	37	58
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	28.5	18.6	21.6
Standardabweichung	14.3	6.2	11.8
1. Quartil	20.0	15.0	16.0
Medianwert	23.5	17.0	18.0
3. Quartil	38.0	20.5	24.0
N*	30	28	34
fehlende Angaben	88	36	52
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	31.9	21.6	25.4
Standardabweichung	13.6	10.6	13.0
1. Quartil	23.0	15.0	17.0
Medianwert	28.0	17.5	20.0
3. Quartil	38.0	22.0	30.0
N*	37	30	36
fehlende Angaben	81	34	50
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	14.8	8.7	11.8
Standardabweichung	12.2	11.2	9.4
1. Quartil	4.0	1.6	4.7
Medianwert	13.0	3.9	8.4
3. Quartil	24.4	12.7	17.5
N*	26	27	28
fehlende Angaben	92	37	58

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2010)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	23.5	23.3	23.5	5.6	3.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	9.1	0.0	4.0
rauchen/inhalieren	47.5	43.3	46.5	16.7	17.2	16.8	16.7	0.0	12.5	98.8	100.0	98.9	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	0.5	0.0	0.4	1.9	0.0	1.5	50.0	0.0	37.5	0.7	0.0	0.6	72.7	92.9	84.0
sniffen	27.9	33.3	29.2	75.9	79.3	76.6	33.3	100.0	50.0	0.2	0.0	0.2	18.2	7.1	12.0
anderes	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	183	60	243	108	29	137	6	2	8	561	101	662	11	14	25
fehlende Angaben	212	57	269	111	35	146	11	7	18	318	49	367	11	11	22

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	4.2	5.5	4.6	56.3	69.1	59.5	13.1	12.2	12.9	4.4	7.9	4.9	10.5	11.7	10.8	455
nie	95.8	94.5	95.4	43.7	30.9	40.5	86.9	87.8	87.1	95.6	92.1	95.1	89.5	88.3	89.2	3'740
N**	1'711	721	2'432	334	110	444	145	41	186	688	127	815	3'046	1'149	4'195	4'195
fehlende Angaben	1'061	427	1'488	142	44	186	79	23	102	191	23	214	1'598	615	2'213	2'213
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	0.3	0.8	0.5	35.9	38.7	36.5	7.5	7.3	7.5	2.8	1.6	2.6	5.0	4.3	4.8	199
nein	99.7	99.2	99.5	64.1	61.3	63.5	92.5	92.7	92.5	97.2	98.4	97.4	95.0	95.7	95.2	3'957
N**	1'713	730	2'443	301	93	394	146	41	187	687	127	814	3'014	1'142	4'156	4'156
fehlende Angaben	1'059	418	1'477	175	61	236	78	23	101	192	23	215	1'630	622	2'252	2'252
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.1	0.1	0.1	27.5	29.2	27.9	6.3	7.3	6.5	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	2.8	123
nein	99.9	99.9	99.9	72.5	70.8	72.1	93.8	92.7	93.5	100.0	100.0	100.0	97.0	97.5	97.2	4'203
N**	1'821	771	2'592	287	89	376	144	41	185	692	125	817	3'131	1'195	4'326	4'326
fehlende Angaben	951	377	1'328	189	65	254	80	23	103	187	25	212	1'513	569	2'082	2'082
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	0.0	0.0	0.0	10.2	12.5	10.7	14.3	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	13.0	9.3	10
nein	100.0	100.0	100.0	89.8	87.5	89.3	85.7	0.0	75.0	100.0	100.0	100.0	91.7	87.0	90.7	97
N**	1	3	4	59	16	75	7	1	8	16	1	17	84	23	107	107
fehlende Angaben	4	3	7	42	19	61	2	2	4	3	1	4	56	25	81	81
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	3.4	5.6	4.3	2.9	9.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.9	4.0	9
15-16	10.3	22.2	14.9	6.9	2.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	12.5	6.5	12.5	8.4	19
17-18	10.3	27.8	17.0	21.6	22.0	21.7	50.0	0.0	40.0	0.0	42.9	18.8	20.6	23.6	21.6	49
19-20	24.1	11.1	19.1	23.5	19.5	22.4	16.7	0.0	13.3	33.3	14.3	25.0	23.9	15.3	21.1	48
21-25	41.4	11.1	29.8	23.5	26.8	24.5	16.7	33.3	20.0	11.1	0.0	6.3	25.8	19.4	23.8	54
26-30	3.4	16.7	8.5	12.7	14.6	13.3	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	25.0	11.0	13.9	11.9	27
30-39	3.4	5.6	4.3	7.8	2.4	6.3	8.3	66.7	20.0	22.2	0.0	12.5	7.7	6.9	7.5	17
ab 40	3.4	0.0	2.1	1.0	2.4	1.4	8.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4	1.8	4
N**	29	18	47	102	41	143	12	3	15	9	7	16	155	72	227	227
fehlende Angaben	43	22	65	86	35	121	7	2	9	21	3	24	165	63	228	228

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		62.5	29.9	38.0	38.5	50.0	.	20.0	5.3	31.3
Cocktail	0.3		6.3	1.3	0.0	7.1	.	0.4	0.0	0.0
Heroin	2.1	12.5	6.0	12.0	0.0	42.9	.	1.6	0.0	25.0
Methadon	0.9	37.5	23.3	1.3	0.0	21.4	.	0.5	0.0	12.5
andere Opiate	0.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
Kokain	6.1	12.5	29.3	0.7	38.5	35.7	.	7.2	0.0	31.3
Crack, Freebase	0.0	0.0	2.1	2.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	0.0	6.3	8.7	0.0	0.0	.	2.3	0.0	12.5
MDMA und verwandte Stoffe	1.1	12.5	6.3	11.3	15.4	0.0	.	2.5	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	12.5	0.9	0.0	7.7	0.0	.	0.2	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.8	37.5	21.8	4.7	7.7	0.0	.	0.7	2.6	12.5
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.5	25.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	6.3
LSD	0.4	25.0	5.4	6.7	23.1	0.0	.	1.4	0.0	6.3
andere Halluzinogene	0.1	0.0	3.0	2.0	7.7	0.0	.	0.9	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Cannabis	10.3	37.5	39.0	31.3	46.2	28.6	.		13.2	25.0
Tabak	30.3	37.5	39.6	34.0	30.8	35.7	.	28.1		25.0
andere Substanz	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	.	0.9	0.0	0.0
Essstörungen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.9	0.0	21.8	31.3	15.4	7.1	.	56.7	78.9	43.8
N**	1'751	8	331	150	13	14	0	570	38	16
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'016</i>	<i>4</i>	<i>106</i>	<i>53</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>205</i>	<i>24</i>	<i>9</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		0.0	28.3	34.2	33.3	36.4	.	21.2	7.8	14.3
Cocktail	0.3		5.7	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.8	33.3	4.7	15.8	0.0	4.5	.	3.0	0.0	0.0
Methadon	2.1	0.0	26.4	5.3	0.0	0.0	.	0.0	2.0	0.0
andere Opiate	0.6	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	.	1.0	0.0	0.0
Kokain	5.4	33.3	38.7	0.0	33.3	4.5	.	10.1	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	5.7	21.1	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.8	33.3	5.7	23.7	25.0	0.0	.	3.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	5.1	0.0	32.1	10.5	8.3	0.0	.	1.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.4	0.0	2.8	2.6	0.0	4.5	.	3.0	2.0	14.3
LSD	0.7	0.0	2.8	5.3	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	1.9	5.3	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Cannabis	8.6	33.3	35.8	52.6	58.3	18.2	.		9.8	0.0
Tabak	28.9	66.7	37.7	34.2	25.0	31.8	.	32.3		42.9
andere Substanz	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	4.1	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	1.0	7.8	0.0
anderes suchtähnliches Problem	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.5	0.0	21.7	26.3	33.3	31.8	.	48.5	72.5	42.9
N**	724	3	106	38	12	22	0	99	51	7
<i>fehlende Angaben</i>	421	3	35	16	6	11	1	24	11	8

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		45.5	29.5	37.2	36.0	41.7	.	20.2	6.7	26.1
Cocktail	0.3		6.2	1.1	0.0	5.6	.	0.3	0.0	0.0
Heroin	2.3	18.2	5.7	12.8	0.0	19.4	.	1.8	0.0	17.4
Methadon	1.3	27.3	24.0	2.1	0.0	8.3	.	0.4	1.1	8.7
andere Opiate	0.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
Kokain	5.9	18.2	31.6	0.5	36.0	16.7	.	7.6	0.0	21.7
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.8	2.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
Amphetamine	0.9	0.0	6.2	11.2	4.0	0.0	.	2.5	0.0	8.7
MDMA und verwandte Stoffe	1.0	18.2	6.2	13.8	20.0	0.0	.	2.5	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	9.1	1.1	0.0	4.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.5	27.3	24.3	5.9	8.0	0.0	.	0.7	1.1	8.7
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.7	18.2	1.8	0.5	0.0	2.8	.	0.6	1.1	8.7
LSD	0.5	18.2	4.8	6.4	16.0	0.0	.	1.8	0.0	4.3
andere Halluzinogene	0.1	0.0	2.7	2.7	4.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Cannabis	9.8	36.4	38.2	35.6	52.0	22.2	.		11.2	17.4
Tabak	29.9	45.5	39.1	34.0	28.0	33.3	.	28.7		30.4
andere Substanz	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.2	2.1	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
Essstörungen	1.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	.	0.1	4.5	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.8	0.0	21.7	30.3	24.0	22.2	.	55.5	75.3	43.5
N**	2'475	11	437	188	25	36	0	669	89	23
fehlende Angaben	1'437	7	141	69	15	20	6	229	35	17

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	3.6	0.0	2.8
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	2.8
Tabak	7.3	0.0	16.7
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	1.8		2.8
anderes suchtähnliches Problem	1.8	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	87.3	100.0	75.0
N**	55	3	36
<i>fehlende Angaben</i>	35	2	19

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten		
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	0.0	2.9	5.6
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	5.6
Tabak	20.0	8.8	16.7
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	5.6
Essstörungen	0.0		5.6
anderes suchtähnliches Problem	0.0	5.9	
kein weiteres Suchtproblem	80.0	85.3	77.8
N**	15	34	18
<i>fehlende Angaben</i>	13	25	12

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2010), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	2.9	2.7	3.7
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	3.7
Tabak	10.0	8.1	16.7
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	1.9
Essstörungen	1.4		3.7
anderes suchtähnliches Problem	1.4	5.4	
kein weiteres Suchtproblem	85.7	86.5	75.9
N**	70	37	54
<i>fehlende Angaben</i>	<i>48</i>	<i>27</i>	<i>31</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	12.0	10.0	11.4	16.5	18.5	16.9	7.9	12.5	8.9	14.9	15.4	14.9	13.5	13.4	13.5	505
1-mal pro Monat oder weniger	3.1	4.5	3.5	12.2	20.0	13.9	13.5	18.8	14.6	27.0	36.3	28.3	10.0	10.3	10.1	378
2-4-mal pro Monat	8.2	7.4	8.0	22.2	21.5	22.0	30.2	31.3	30.4	38.4	33.0	37.6	17.0	12.9	15.9	596
2-3-mal pro Woche	17.7	16.6	17.4	23.0	24.6	23.4	27.0	21.9	25.9	13.4	11.0	13.1	17.5	16.3	17.2	644
4-mal oder mehr pro Woche	59.0	61.6	59.8	26.1	15.4	23.7	21.4	15.6	20.3	6.3	4.4	6.1	42.1	47.1	43.4	1'629
N**	1'730	719	2'449	230	65	295	126	32	158	552	91	643	2'752	1'000	3'752	3'752
fehlende Angaben	1'042	429	1'471	246	89	335	98	32	130	327	59	386	1'892	764	2'656	2'656
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	8.2	8.3	8.2	44.6	50.9	46.1	48.2	50.0	48.5	55.2	65.7	56.7	23.8	21.1	23.1	711
3 oder 4	20.2	16.5	19.1	29.9	30.2	30.0	33.6	26.9	32.4	29.5	21.4	28.3	23.7	18.3	22.2	686
5 oder 6	24.7	24.5	24.7	11.3	3.8	9.6	6.4	11.5	7.4	9.3	5.7	8.8	19.2	19.9	19.4	598
7 bis 9	19.6	26.9	21.8	6.2	3.8	5.7	5.5	0.0	4.4	2.6	2.9	2.6	14.0	21.3	16.0	492
10 oder mehr	27.3	23.8	26.2	7.9	11.3	8.7	6.4	11.5	7.4	3.5	4.3	3.6	19.3	19.4	19.4	597
N**	1'460	625	2'085	177	53	230	110	26	136	431	70	501	2'254	830	3'084	3'084
fehlende Angaben	1'312	523	1'835	299	101	400	114	38	152	448	80	528	2'390	934	3'324	3'324
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	14.2	15.1	14.5	39.5	43.6	40.4	34.7	43.3	36.5	55.6	58.2	55.9	27.5	27.3	27.5	924
weniger als 1-mal pro Monat	10.8	12.2	11.2	25.6	34.5	27.6	28.0	23.3	27.0	25.4	29.1	25.9	16.0	15.2	15.8	531
1-mal pro Monat	11.2	12.0	11.5	10.3	5.5	9.2	16.9	6.7	14.9	8.9	7.6	8.7	10.7	10.5	10.7	359
1-mal pro Woche	27.4	22.2	25.9	10.3	5.5	9.2	13.6	20.0	14.9	7.5	5.1	7.2	20.5	17.9	19.8	667
fast jeden Tag	36.4	38.4	37.0	14.4	10.9	13.6	6.8	6.7	6.8	2.6	0.0	2.3	25.2	29.1	26.2	883
N**	1'568	648	2'216	195	55	250	118	30	148	493	79	572	2'470	894	3'364	3'364
fehlende Angaben	1'204	500	1'704	281	99	380	106	34	140	386	71	457	2'174	870	3'044	3'044

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	32.3	38.0	34.0	4.4	7.9	5.3	9.7	23.1	12.2	22.2	14.3	21.0	25.8	30.2	27.0	771
1 Tag pro Woche oder weniger	1.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	4.2	6.6	4.6	1.8	1.4	1.7	48
2-3 Tage pro Woche	0.8	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	5.0	3.3	4.8	1.9	1.0	1.6	47
4-6 Tage pro Woche	0.6	1.1	0.8	0.5	2.6	1.1	0.9	3.8	1.4	1.3	2.2	1.5	0.9	1.4	1.0	30
einmal täglich	1.9	1.7	1.8	1.0	1.3	1.1	0.9	0.0	0.7	2.9	2.2	2.8	2.1	1.7	2.0	56
mehrmals täglich	63.4	58.0	61.8	94.1	88.2	92.5	85.8	73.1	83.5	64.4	71.4	65.4	67.6	64.3	66.7	1'906
N**	1'112	476	1'588	205	76	281	113	26	139	519	91	610	2'082	776	2'858	2'858
<i>fehlende Angaben</i>	1'660	672	2'332	271	78	349	111	38	149	360	59	419	2'562	988	3'550	3'550
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	16.0	19.8	17.1	11.0	15.0	12.0	17.2	20.0	17.7	54.6	54.1	54.5	26.2	25.9	26.2	486
11 bis 20	40.7	46.4	42.3	57.2	48.3	54.9	57.0	55.0	56.6	37.1	36.5	37.0	43.0	44.4	43.4	806
21 bis 30	29.8	27.0	29.0	20.8	25.0	21.9	20.4	15.0	19.5	6.9	6.8	6.9	21.6	22.8	21.9	407
31 und mehr	13.5	6.7	11.6	11.0	11.7	11.2	5.4	10.0	6.2	1.4	2.7	1.6	9.1	6.9	8.6	159
N**	668	252	920	173	60	233	93	20	113	361	74	435	1'380	478	1'858	1'858
<i>fehlende Angaben</i>	85	43	128	23	10	33	9	0	9	43	4	47	165	64	229	229

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	33.4	75.0	77.9	85.1	91.7	50.0	.	54.7	46.2	33.3
zeitlich begrenzte Abstinenz	25.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	.	8.4	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	27.4	0.0	10.8	2.0	8.3	25.0	.	20.6	23.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.3	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	.	2.3	7.7	66.7
bis jetzt nicht festgelegt	12.4	25.0	7.8	6.9	0.0	25.0	.	13.6	23.1	0.0
anderes	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	.	0.5	0.0	0.0
N**	1'123	4	204	101	12	4	0	214	13	3
<i>fehlende Angaben</i>	1'649	9	259	123	12	21	5	665	50	22

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	36.3	100.0	69.5	64.7	75.0	30.0	.	50.0	77.8	80.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	16.1	0.0	1.7	5.9	0.0	0.0	.	3.6	11.1	0.0
kontrollierter Konsum	28.5	0.0	11.9	11.8	25.0	10.0	.	25.0	11.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	2.5	0.0	1.7	0.0	0.0	10.0	.	0.0	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	16.4	0.0	10.2	17.6	0.0	50.0	.	21.4	0.0	20.0
anderes	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
N**	446	3	59	17	4	10	0	28	9	5
<i>fehlende Angaben</i>	702	3	89	47	15	23	1	122	53	10

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2010), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	34.2	85.7	76.0	82.2	87.5	35.7	.	54.1	59.1	62.5
zeitlich begrenzte Abstinenz	22.5	0.0	1.1	4.2	0.0	0.0	.	7.9	4.5	0.0
kontrollierter Konsum	27.7	0.0	11.0	3.4	12.5	14.3	.	21.1	18.2	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.7	0.0	1.9	1.7	0.0	7.1	.	2.1	4.5	25.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.5	14.3	8.4	8.5	0.0	42.9	.	14.5	13.6	12.5
anderes	0.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
N**	1'569	7	263	118	16	14	0	242	22	8
<i>fehlende Angaben</i>	2'351	12	348	170	27	44	6	787	103	32

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23a Psychische Probleme im Leben (2010), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	30.4	100.0	36.0	23.1	44.4	33.3	.	20.5	20.0	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	23.2	0.0	35.4	33.3	11.1	66.7	.	24.6	0.0	50.0
Schw. mit Verständnis/Gedächtn./Konzentr.	11.8	0.0	16.5	17.9	44.4	0.0	.	22.1	20.0	50.0
Halluzinationen	2.8	0.0	4.9	7.7	22.2	0.0	.	5.6	0.0	16.7
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	11.8	0.0	15.2	14.1	11.1	0.0	.	20.5	0.0	66.7
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	11.1	50.0	23.8	16.7	0.0	33.3	.	8.7	20.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	12.7	50.0	18.3	16.7	11.1	33.3	.	12.3	0.0	33.3
Selbstmordversuche	6.4	50.0	11.6	6.4	0.0	33.3	.	4.1	0.0	16.7
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.4	0.0	2.4	3.8	11.1	0.0	.	4.1	0.0	0.0
keine	43.7	0.0	34.8	41.0	22.2	0.0	.	46.7	60.0	16.7
N**	865	2	164	78	9	3	0	195	5	6
<i>fehlende Angaben</i>	1'907	11	299	146	15	22	5	684	58	19

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23b Psychische Probleme im Leben (2010), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	46.0	33.3	45.8	53.3	16.7	55.6	.	20.7	28.6	75.0
schwere Angst- und Spannungszustände	39.0	0.0	43.8	26.7	0.0	77.8	.	34.5	0.0	50.0
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	11.7	66.7	22.9	13.3	0.0	22.2	.	13.8	0.0	50.0
Halluzinationen	2.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	.	3.4	0.0	25.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	7.4	0.0	12.5	13.3	0.0	0.0	.	31.0	0.0	25.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	26.2	33.3	33.3	20.0	50.0	33.3	.	17.2	14.3	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	20.4	33.3	29.2	33.3	16.7	44.4	.	41.4	0.0	75.0
Selbstmordversuche	12.3	0.0	22.9	26.7	0.0	44.4	.	24.1	0.0	25.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	7.6	0.0	2.1	0.0	16.7	0.0	.	0.0	0.0	0.0
keine	21.3	0.0	22.9	33.3	16.7	0.0	.	24.1	57.1	0.0
N**	367	3	48	15	6	9	0	29	7	4
fehlende Angaben	781	3	100	49	13	24	1	121	55	11

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23c Psychische Probleme im Leben (2010), Männer & Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	35.1	60.0	38.2	28.0	33.3	50.0	.	20.5	25.0	50.0
schwere Angst- und Spannungszustände	27.9	0.0	37.3	32.3	6.7	75.0	.	25.9	0.0	50.0
Schw. mit Verständnis/Gedächtn./Konzentr.	11.8	40.0	17.9	17.2	26.7	16.7	.	21.0	8.3	50.0
Halluzinationen	2.8	0.0	3.8	7.5	13.3	0.0	.	5.4	0.0	20.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	10.5	0.0	14.6	14.0	6.7	0.0	.	21.9	0.0	50.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	15.6	40.0	25.9	17.2	20.0	33.3	.	9.8	16.7	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	15.0	40.0	20.8	19.4	13.3	41.7	.	16.1	0.0	50.0
Selbstmordversuche	8.1	20.0	14.2	9.7	0.0	41.7	.	6.7	0.0	20.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.6	0.0	2.4	3.2	13.3	0.0	.	3.6	0.0	0.0
keine	37.0	0.0	32.1	39.8	20.0	0.0	.	43.8	58.3	10.0
N**	1'232	5	212	93	15	12	0	224	12	10
<i>fehlende Angaben</i>	2'688	14	399	195	28	46	6	805	113	30

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2010)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	26.4	30.9	29.9	284
Tochter/Sohn	21.8	13.7	15.4	146
Schwester/Bruder	3.6	4.0	3.9	37
Ehe-/LebenspartnerIn	27.4	45.6	41.8	397
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.0	0.8	0.8	8
KollegIn/FreundIn	4.1	2.0	2.5	24
ArbeitgeberIn/LehrerIn	5.6	0.8	1.8	17
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	10.2	2.3	3.9	37
N**	197	752	950	950
<i>fehlende Angaben</i>	12	36	48	48

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2010)

Angehörige					
Hauptproblem der Drittperson*			Weitere Probleme der Drittperson***		
	Total		Total		
	%	N	%		N
Alkohol	66.6	641	Alkohol	27.6	98
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.6	6	Cocktail (Heroin und Kokain)	1.1	4
Heroin	4.1	39	Heroin	3.7	13
Methadon	0.6	6	Methadon	3.4	12
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.3	3	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.3	1
Kokain	3.6	35	Kokain	7.0	25
Crack, Freebase	0.1	1	Crack, Freebase	0.0	0
Amphetamine	0.3	3	Amphetamine	0.6	2
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.1	1	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.4	5
andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0	andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0
Barbiturate	1.1	11	Barbiturate	0.8	3
Benzodiazepine	0.4	4	Benzodiazepine	3.1	11
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2.5	9
LSD	0.1	1	LSD	0.0	0
andere Halluzinogene	0.8	8	andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0
Cannabis	11.7	113	Cannabis	18.3	65
Tabak	1.1	11	Tabak	20.0	71
andere Substanz	0.6	6	andere Substanz	0.0	0
pathologisches Spielen	1.6	15	pathologisches Spielen	3.9	14
Essstörungen	1.8	17	Essstörungen	2.5	9
anderes suchtähnliches Problem	4.2	40	anderes suchtähnliches Problem	6.8	24
			keine	26.8	95
N**	962	962	N**	355	355
<i>fehlende Angaben</i>	36	36	<i>fehlende Angaben</i>	638	638

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2010)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
Eigene Probleme*				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	8.8	8.1	8.3	27
eigene suchtähnliche Probleme	1.8	1.1	1.2	4
eigene somatische Probleme	0.0	7.8	6.4	21
eigene psychische Probleme	22.8	34.1	32.1	105
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	33.3	44.1	42.2	138
Familienprobleme	56.1	59.6	59.0	193
finanzielle Probleme	8.8	9.6	9.5	31
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	8.8	4.4	5.2	17
Wohnprobleme	7.0	4.4	4.9	16
Gewaltprobleme (als Opfer)	10.5	10.0	10.1	33
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	0.0	0.7	0.6	2
rechtliche Probleme	8.8	4.1	4.9	16
anderes	1.8	0.7	0.9	3
keine	15.8	13.0	13.5	44
N**	57	270	327	327
<i>fehlende Angaben</i>	152	517	670	670

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.3			72.8			75.2			81.0			20.5			63.5	4'268
Frauen			28.3			23.3			22.0			16.9			79.5			34.7	2'333
Geschlecht nicht bekannt			1.4			3.8			2.8			2.1			0.0			1.7	116
N**	2'479	997	3'527	418	134	574	212	62	282	703	147	868	196	762	958	4'268	2'333	6'717	6'717
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4.8	6.1	5.1	2.1	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	76
15-19	2.7	1.7	2.4	1.9	8.2	3.4	3.3	8.1	4.4	62.2	52.4	60.5	6.2	3.4	4.0	13.5	7.4	11.4	748
20-24	4.5	3.4	4.2	9.4	26.1	13.4	12.7	19.4	14.2	13.1	12.2	12.9	3.6	4.0	3.9	6.9	6.7	6.8	450
25-29	7.8	4.3	6.8	14.9	24.6	17.2	25.5	22.6	24.8	9.0	11.6	9.4	4.1	7.1	6.5	9.7	7.9	9.1	598
30-34	8.8	9.2	8.9	19.7	9.7	17.2	19.3	25.8	20.8	6.4	7.5	6.6	8.2	8.7	8.6	10.2	9.5	10.0	656
35-39	10.9	8.4	10.2	22.1	6.0	18.1	17.5	6.5	15.0	2.4	2.0	2.4	9.2	9.9	9.8	11.0	8.5	10.1	665
40-44	13.4	14.3	13.6	18.7	16.4	18.1	13.7	11.3	13.1	1.3	4.8	1.9	12.8	14.6	14.3	11.7	13.5	12.3	812
45-49	14.5	16.3	15.0	9.4	6.0	8.5	4.2	6.5	4.7	0.7	1.4	0.8	11.8	18.3	17.0	10.7	14.3	12.0	788
50-54	13.7	16.1	14.3	2.9	1.5	2.5	2.8	0.0	2.2	0.0	2.0	0.4	13.8	14.8	14.6	9.3	12.7	10.5	693
55-59	10.0	11.1	10.3	1.0	1.5	1.1	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	12.8	7.3	8.4	6.8	7.7	7.1	468
60-64	7.8	7.4	7.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.1	4.8	4.9	5.3	5.1	333
65-69	3.3	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.6	3.1	2.3	3.3	2.6	172
70 -74	1.8	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.6	1.2	1.7	1.4	91
75 und mehr	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	1.4	0.6	0.6	0.6	40
N**	2'475	996	3'471	417	134	551	212	62	274	703	147	850	195	758	953	4'262	2'328	6'590	6'590
fehlende Angaben	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	127
Alter																			
Mittelwert	45.0	46.9	45.5	35.8	31.2	34.7	32.9	30.7	32.4	20.7	22.9	21.0	45.7	44.4	44.6	38.9	42.2	40.0	
Standardabweichung	13.3	12.5	13.1	8.4	9.7	8.9	8.2	7.8	8.2	6.5	9.0	7.0	15.7	13.1	13.7	15.0	14.4	14.9	
1. Quartil	35.5	38.6	36.4	29.7	23.3	27.6	27.2	24.5	26.5	16.6	16.9	16.7	35.6	35.7	35.7	26.8	31.0	28.2	
Medianwert	45.6	47.3	46.1	36.3	28.9	34.4	31.9	30.0	31.2	18.0	18.5	18.1	47.6	45.4	45.6	38.9	43.4	40.6	
3. Quartil	54.4	55.6	54.7	41.7	40.3	41.2	39.1	34.8	38.9	22.6	26.6	23.7	56.1	52.3	52.9	50.0	52.2	51.0	
N**	2'475	996	3'471	417	134	551	212	62	274	703	147	850	195	758	953	4'262	2'328	6'590	
fehlende Angaben	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	42.3	32.3	39.4	68.3	71.7	69.2	73.5	75.4	74.0	95.0	90.0	94.2	29.4	22.8	24.1	55.4	38.3	49.3	2'938
verheiratet	31.7	28.5	30.8	16.0	11.7	14.9	15.3	7.0	13.4	3.3	3.1	3.2	58.8	54.7	55.5	25.7	33.5	28.4	1'696
getrennt	5.4	5.1	5.4	2.2	2.5	2.3	2.1	3.5	2.4	0.3	3.1	0.8	4.1	4.2	4.2	4.0	4.4	4.1	246
geschieden	18.1	28.3	21.0	11.5	10.0	11.1	8.5	10.5	8.9	1.1	3.1	1.4	6.5	14.4	12.9	13.1	19.5	15.4	916
verwitwet	2.0	5.3	2.9	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.7	2.4	1.3	3.4	2.1	123
reg. Partnerschaft	0.5	0.4	0.5	1.7	3.3	2.1	0.5	3.5	1.2	0.3	0.8	0.4	0.0	1.1	0.9	0.6	0.9	0.7	43
N**	2'241	898	3'139	357	120	477	189	57	246	641	130	771	170	707	877	3'837	2'125	5'962	5'962
fehlende Angaben	238	99	388	61	14	97	23	5	36	62	17	97	26	55	81	431	208	755	755
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	7.6	10.7	8.4	3.1	0.0	2.4	1.5	0.0	1.1	0.4	1.4	0.6	9.9	8.3	8.7	5.3	7.4	6.0	388
Umland der Grossstadtzentren	16.1	15.9	16.9	2.6	1.6	4.8	7.4	5.1	8.5	5.6	4.9	7.4	15.1	13.6	13.9	11.9	12.4	13.1	849
Mittelzentren	14.4	13.4	13.9	26.8	30.6	26.8	24.5	20.3	22.9	28.9	33.1	29.0	19.8	17.9	18.3	19.4	18.9	18.9	1'223
Kleinzentren	34.3	33.1	33.6	43.4	34.7	40.0	41.7	54.2	43.2	35.8	31.7	34.5	33.9	33.5	33.5	36.2	34.2	35.0	2'263
rural	27.7	26.9	27.2	24.2	33.1	26.0	25.0	20.3	24.4	29.2	28.9	28.5	21.4	26.7	25.6	27.3	27.1	27.0	1'747
N**	2'378	943	3'371	392	124	538	204	59	271	695	142	855	192	744	936	4'118	2'237	6'470	6'470
fehlende Angaben	101	54	156	26	10	36	8	3	11	8	5	13	4	18	22	150	96	247	247

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	42.6	41.5	42.3	42.5	28.6	39.3	41.1	38.5	40.6	12.2	10.0	11.9	17.5	15.8	16.1	35.0	29.3	33.0	1'402
mit Eltern/Elternteil	6.8	2.0	5.5	12.3	12.9	12.4	9.9	17.9	11.7	70.9	49.0	67.4	9.3	5.6	6.2	20.8	9.3	16.7	712
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.8	11.3	4.5	0.0	11.4	2.7	1.4	10.3	3.3	0.2	6.0	1.1	3.1	16.6	14.4	1.3	12.3	5.2	220
mit PartnerIn (ohne Kinder)	24.3	25.1	24.5	14.9	20.0	16.1	14.2	25.6	16.7	3.6	11.0	4.8	29.9	23.5	24.6	18.9	23.3	20.4	869
mit PartnerIn und Kind(ern)	17.2	12.5	15.9	13.2	8.6	12.1	16.3	0.0	12.8	2.9	3.0	2.9	37.1	35.6	35.8	15.0	18.6	16.3	692
mit anderen Verw./Angeh.	1.1	1.6	1.3	1.8	1.4	1.7	1.4	2.6	1.7	1.9	1.0	1.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	57
mit FreundInnen (WG)	1.8	1.6	1.7	2.6	2.9	2.7	7.8	2.6	6.7	1.9	3.0	2.1	0.0	1.0	0.9	2.2	1.6	2.0	84
anderes	4.3	4.4	4.3	12.7	14.3	13.1	7.8	2.6	6.7	6.3	17.0	8.0	2.1	0.8	1.0	5.6	4.2	5.1	218
N**	1'582	638	2'220	228	70	298	141	39	180	523	100	623	97	481	578	2'757	1'497	4'254	4'254
fehlende Angaben	897	359	1'307	190	64	276	71	23	102	180	47	245	99	281	380	1'511	836	2'463	2'463
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	92.9	92.7	92.8	78.2	79.7	79.5	89.7	85.7	89.2	92.9	90.0	92.0	98.3	97.0	97.2	91.8	93.6	92.4	4'341
instabile Wohnsituation	4.5	5.8	4.8	13.5	16.5	13.4	8.2	11.9	8.7	4.0	6.4	4.6	1.7	2.8	2.6	5.1	5.2	5.1	239
Institution	2.7	1.6	2.4	8.3	3.8	7.1	2.1	2.4	2.1	3.1	3.6	3.4	0.0	0.2	0.2	3.1	1.3	2.5	118
N**	1'707	695	2'448	252	79	351	146	42	195	552	110	679	115	530	645	2'965	1'630	4'698	4'698
fehlende Angaben	772	302	1'079	166	55	223	66	20	87	151	37	189	81	232	313	1'303	703	2'019	2'019
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	32.2	37.3	33.7	41.0	21.1	36.1	34.9	37.5	35.4	68.6	45.6	64.5	17.4	21.6	20.9	38.9	31.3	36.2	1'217
zeitweilige Beziehung(en)	6.0	4.4	5.5	6.9	7.0	7.0	4.8	12.5	6.3	8.0	11.4	8.6	1.2	1.7	1.6	5.9	4.1	5.2	176
feste Beziehung, getrennt lebend	10.4	12.8	11.1	11.6	33.3	17.0	22.2	18.8	21.5	12.9	25.3	15.2	8.1	8.7	8.6	11.4	13.7	12.2	411
feste Beziehung, zus. lebend	51.4	45.5	49.7	40.5	38.6	40.0	38.1	31.3	36.7	10.5	17.7	11.8	73.3	68.0	68.9	43.8	50.9	46.4	1'562
N**	1'264	523	1'787	173	57	230	126	32	158	363	79	442	86	416	502	2'139	1'227	3'366	3'366
fehlende Angaben	1'215	474	1'740	245	77	344	86	30	124	340	68	426	110	346	456	2'129	1'106	3'351	3'351

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	7.0	6.5	6.9	6.8	9.9	7.6	6.1	7.1	6.3	23.3	23.8	23.4	15.5	3.2	5.5	11.0	8.1	10.0	403
obligatorische Schule	14.4	17.6	15.3	33.2	40.7	35.0	19.0	35.7	22.8	50.4	56.2	51.3	10.3	15.4	14.4	24.4	22.4	23.7	952
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	3.4	6.3	4.2	4.0	7.4	4.8	2.7	4.8	3.2	3.9	2.9	3.7	0.0	4.6	3.8	3.4	5.7	4.2	168
Berufslehre, Berufsschule	54.9	52.9	54.3	50.0	33.3	45.9	58.5	45.2	55.6	18.7	15.2	18.1	40.2	48.9	47.2	45.8	45.3	45.6	1'832
Maturität-, Diplommittelschule	4.2	4.5	4.3	1.2	6.2	2.4	2.0	2.4	2.1	2.4	0.0	2.0	1.0	6.1	5.1	3.4	5.0	3.9	158
Lehrerseminar	1.2	2.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	1.0	3.9	3.4	0.8	2.5	1.4	55
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.4	4.7	6.0	2.0	2.5	2.1	7.5	2.4	6.3	0.7	0.0	0.6	9.3	7.8	8.1	5.0	5.0	5.0	199
höhere Fachschule	2.0	1.6	1.9	0.4	0.0	0.3	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1	2.2	2.6	1.3	1.7	1.5	59
Fachhochschule	2.0	1.1	1.8	1.2	0.0	0.9	1.4	0.0	1.1	0.2	1.0	0.3	4.1	1.7	2.2	1.6	1.1	1.4	56
Universität, Hochschule	4.4	2.4	3.9	1.2	0.0	0.9	2.7	0.0	2.1	0.2	0.0	0.2	14.4	6.1	7.7	3.4	3.3	3.4	135
N**	1'491	552	2'043	250	81	331	147	42	189	540	105	645	97	409	506	2'685	1'332	4'017	4'017
fehlende Angaben	988	445	1'484	168	53	243	65	20	93	163	42	223	99	353	452	1'583	1'001	2'700	2'700
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	56.7	39.5	51.8	29.8	22.1	27.7	62.3	38.3	56.5	26.0	25.6	25.9	68.2	64.1	64.9	49.6	45.9	48.2	2'392
Ersparnisse	0.6	1.5	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	2.1	0.5	0.5	0.0	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.9	0.6	31
Rente (AHV/IV u.a.)	17.8	25.2	20.0	13.6	16.3	14.8	6.3	14.9	7.9	1.9	4.3	2.6	13.6	10.5	11.1	13.6	17.5	15.0	747
Sozialhilfe/Fürsorge	11.6	13.2	12.0	37.9	48.8	39.8	18.9	21.3	20.1	6.0	16.2	7.8	2.3	2.4	2.4	12.4	11.2	12.0	598
Arbeitslosenversicherung	6.7	4.8	6.1	8.1	3.5	6.9	6.3	10.6	7.0	3.0	1.7	2.7	3.0	2.0	2.2	5.9	3.4	5.0	248
durch PartnerIn	1.3	11.3	4.2	1.8	2.3	2.1	0.0	2.1	0.5	0.2	3.4	0.7	0.8	13.8	11.3	1.0	10.7	4.4	219
durch Eltern/Angehörige	3.0	2.9	3.0	2.2	3.5	2.6	4.4	10.6	6.1	60.7	43.6	57.5	9.8	4.6	5.6	14.5	8.4	12.3	612
dealen/mischeln	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	2.1	1.5	2.0	5.1	3.5	5.0	1.3	0.0	0.9	1.6	4.3	2.0	1.5	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	108
N**	1'818	726	2'591	272	86	379	159	47	214	570	117	702	132	543	675	3'151	1'707	4'964	4'964
fehlende Angaben	661	271	936	146	48	195	53	15	68	133	30	166	64	219	283	1'117	626	1'753	1'753
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	53.7	27.2	46.2	29.3	11.0	24.9	55.2	33.3	50.3	19.5	14.7	18.7	54.9	40.7	43.3	45.1	30.5	40.0	1'705
Teilzeitarbeit	4.1	20.6	8.8	3.0	15.1	5.9	6.3	9.5	7.0	1.3	9.2	2.6	6.9	29.3	25.2	3.7	20.9	9.6	410
Gelegenheitsarbeit	1.6	1.3	1.5	4.3	1.4	3.6	0.7	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.0	1.5	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4
in Ausbildung	2.8	2.2	2.7	1.3	4.1	2.0	2.1	7.1	3.2	62.5	58.7	61.8	13.7	4.4	6.1	15.5	9.7	13.5	574
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	20.9	33.9	24.5	22.8	26.0	23.6	15.4	19.0	16.2	3.2	4.6	3.4	14.7	17.0	16.5	16.7	24.5	19.4	826
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	9.5	8.2	9.1	20.7	19.2	20.3	10.5	16.7	11.9	4.7	3.7	4.5	2.9	3.1	3.1	9.1	6.4	8.2	349
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.3	0.8	0.5	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.6	2.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	18
anderes	7.2	5.8	6.8	18.5	21.9	19.3	9.8	14.3	10.8	7.3	7.3	7.3	4.9	3.7	4.0	8.0	6.2	7.4	315
N**	1'587	625	2'212	232	73	305	143	42	185	533	109	642	102	454	556	2'784	1'474	4'258	4'258
fehlende Angaben	892	372	1'315	186	61	269	69	20	97	170	38	226	94	308	402	1'484	859	2'459	2'459

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	30.4	39.9	33.1	58.3	65.8	60.3	23.1	58.8	29.5	11.7	15.4	12.2	18.6	23.1	22.3	28.6	34.8	30.7	542
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.3	1.0	1.2	1.0	5.3	2.1	2.6	0.0	2.1	36.8	38.5	37.0	7.0	1.5	2.5	6.7	3.5	5.6	99
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.8	6.9	4.7	7.8	10.5	8.5	7.7	0.0	6.3	1.2	3.8	1.6	2.3	3.6	3.4	4.1	5.6	4.6	82
angelernte(r) ArbeiterIn	5.5	7.2	6.0	5.8	2.6	5.0	7.7	0.0	6.3	3.7	3.8	3.7	0.0	4.6	3.8	5.7	5.6	5.7	100
gelernte(r) ArbeiterIn	12.0	2.7	9.4	13.6	2.6	10.6	16.7	11.8	15.8	8.6	3.8	7.9	7.0	9.2	8.8	11.6	5.1	9.4	166
VorarbeiterIn	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.7	6.4	5.9	6.3	2.5	0.0	2.1	0.0	2.1	1.7	2.2	0.8	1.7	30
einfache(r) Angestellte(r)	19.7	24.4	21.1	7.8	10.5	8.5	17.9	17.6	17.9	1.8	11.5	3.2	23.3	27.2	26.5	15.9	23.1	18.4	324
mittl. Angestellte(r)/ Kader	11.2	8.9	10.5	1.9	0.0	1.4	10.3	0.0	8.4	3.1	7.7	3.7	9.3	14.9	13.9	9.4	9.6	9.5	167
leit. Angestellte(r)/Kader	3.1	1.0	2.5	1.0	2.6	1.4	2.6	0.0	2.1	1.8	0.0	1.6	9.3	2.1	3.4	2.8	1.5	2.4	42
selbständig	9.1	6.5	8.4	1.9	0.0	1.4	2.6	0.0	2.1	1.2	0.0	1.1	9.3	8.7	8.8	6.5	6.3	6.5	114
SchülerIn/StudentIn	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.1	26.4	15.4	24.9	11.6	2.6	4.2	5.6	3.5	4.9	86
andere Stellung	0.8	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.2	0.0	1.1	2.3	0.5	0.8	0.9	0.5	0.7	13
N**	714	291	1'005	103	38	141	78	17	95	163	26	189	43	195	238	1'162	603	1'765	1'765
fehlende Angaben	1'765	706	2'522	315	96	433	134	45	187	540	121	679	153	567	720	3'106	1'730	4'952	4'952
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	26.0	34.6	28.1	28.6	26.7	28.1	17.5	27.3	19.6	48.8	27.3	45.7	41.2	21.1	25.0	30.4	30.5	30.4	340
weniger als 1000 Fr.	6.2	6.5	6.3	16.7	16.7	16.7	2.5	0.0	2.0	28.7	36.4	29.8	5.9	9.9	9.1	10.9	10.1	10.6	119
1001 bis 2000 Fr.	4.9	11.1	6.4	19.0	30.0	21.9	17.5	18.2	17.6	8.5	13.6	9.3	0.0	8.5	6.8	7.3	12.9	8.9	99
2001 bis 3000 Fr.	10.2	15.7	11.6	13.1	23.3	15.8	10.0	27.3	13.7	0.8	4.5	1.3	0.0	15.5	12.5	8.4	16.4	10.6	119
3001 bis 4000 Fr.	13.4	11.1	12.9	10.7	3.3	8.8	15.0	9.1	13.7	2.3	13.6	4.0	11.8	11.3	11.4	11.5	10.1	11.1	124
4001 bis 5000 Fr.	16.0	12.4	15.1	8.3	0.0	6.1	20.0	18.2	19.6	7.8	0.0	6.6	17.6	14.1	14.8	14.1	10.1	13.0	145
5001 bis 6000 Fr.	11.3	5.9	10.0	2.4	0.0	1.8	15.0	0.0	11.8	1.6	4.5	2.0	0.0	5.6	4.5	9.1	4.7	7.9	88
6001 bis 8000 Fr.	7.9	2.0	6.4	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	23.5	11.3	13.6	5.5	3.8	5.0	56
8001 bis 10 000 Fr.	2.1	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	2.8	2.3	1.8	1.3	1.6	18
10001 bis 15 000 Fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	5
über 15 000 Fr.	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	5
N**	469	153	622	84	30	114	40	11	51	129	22	151	17	71	88	800	318	1'118	1'118
fehlende Angaben	2'010	844	2'905	334	104	460	172	51	231	574	125	717	179	691	870	3'468	2'015	5'599	5'599

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
planm. Beendigung ohne Übertritt	49.4	47.7	48.8	21.4	22.1	21.5	34.4	25.8	32.6	65.8	62.7	64.7	65.3	67.0	66.7	50.1	53.7	51.1	3'410
planm. Beendigung mit Übertritt	5.4	7.8	6.1	14.8	14.5	15.4	5.7	25.8	10.3	3.0	4.2	3.6	2.0	2.6	2.5	5.8	6.9	6.4	424
Wohnortwechsel	2.9	3.3	3.0	4.9	9.9	6.7	8.0	3.2	6.7	1.9	2.8	2.0	0.0	0.9	0.7	2.9	2.6	2.9	192
Hospitalisierung	0.6	1.0	0.8	0.5	0.8	0.5	1.9	1.6	1.8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	38
Inhaftierung	0.1	0.1	0.1	2.2	0.8	1.8	1.4	1.6	1.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	20
Kontaktverlust	26.8	24.9	26.3	35.5	32.1	33.9	32.1	27.4	31.6	17.2	18.3	17.9	20.9	19.9	20.1	25.7	22.3	24.6	1'641
expliziter Abbruch	10.1	11.1	10.6	15.3	15.3	15.1	10.8	11.3	10.6	7.9	9.9	8.1	6.1	5.1	5.3	10.0	9.5	9.9	661
Tod	1.9	1.5	1.8	1.9	0.8	1.8	3.3	0.0	2.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.5	0.9	1.3	88
anderer Grund	2.7	2.6	2.6	3.4	3.8	3.4	2.4	3.2	2.5	3.0	2.1	2.8	5.6	4.1	4.4	2.9	3.3	3.0	200
N**	2'469	992	3'512	411	131	564	212	62	282	696	142	856	196	758	954	4'243	2'315	6'674	6'674
fehlende Angaben	10	5	15	7	3	10	0	0	0	7	5	12	0	4	4	25	18	43	43

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
stationäre Therapie	34.2	42.0	36.5	25.6	43.8	27.3	28.6	23.1	28.6	27.3	0.0	21.1	0.0	15.4	13.3	28.8	35.1	30.3	83
ambulante Behandlung	42.5	42.0	42.1	41.9	43.8	40.9	42.9	76.9	61.9	45.5	100.0	52.6	50.0	69.2	66.7	44.5	54.1	47.4	130
Aussenwohngruppe	2.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.1	3
andere Stelle/Institution	20.5	16.0	19.8	32.6	12.5	31.8	28.6	0.0	9.5	18.2	0.0	21.1	50.0	15.4	20.0	24.7	10.8	21.2	58
N**	73	50	126	43	16	66	7	13	21	11	4	19	2	13	15	146	111	274	274
fehlende Angaben	61	27	88	18	3	21	5	3	8	10	2	12	2	7	9	102	48	150	150

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
Suizid	12.5	42.9	20.0	20.0	0.0	14.3	0.0	.	0.0	100.0	.	100.0	0.0	0.0	0.0	14.0	27.3	17.5	10
Unfall	15.6	14.3	15.0	0.0	0.0	0.0	20.0	.	20.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	9.1	12.3	7
Krankheit	50.0	14.3	42.5	20.0	100.0	42.9	20.0	.	20.0	0.0	.	0.0	0.0	100.0	100.0	41.9	45.5	43.9	25
Überdosis bzw. Vergiftung	9.4	14.3	10.0	60.0	0.0	42.9	40.0	.	40.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	9.1	15.8	9
andere Todesursache	12.5	14.3	12.5	0.0	0.0	0.0	20.0	.	20.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	9.1	10.5	10.5
N**	32	7	40	5	1	7	5	0	5	1	0	1	0	1	1	43	11	57	57
fehlende Angaben	15	8	23	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	22	9	31	31

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2010)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	4.5	4.1	4.3	3.8	2.2	3.3	1.9	1.6	1.8	4.7	6.1	4.8	12.2	8.1	9.0	4.8	5.3	4.9	326
> 1 Woche bis 1 Monat	3.4	2.8	3.2	3.4	3.0	3.1	1.9	4.8	2.5	8.3	7.5	8.0	4.6	4.6	4.6	4.2	3.8	4.0	268
> 1 Monat bis 2 Monate	3.8	4.5	4.0	3.8	3.0	3.5	2.4	0.0	1.8	9.8	9.5	9.6	3.6	2.9	3.0	4.8	4.0	4.5	300
> 2 bis 3 Monate	4.1	4.4	4.3	2.9	0.0	2.1	3.8	9.7	5.0	6.8	6.1	6.6	5.1	3.9	4.2	4.6	4.3	4.5	298
> 3 bis 6 Monate	12.2	10.8	11.6	10.3	13.4	10.7	7.5	4.8	6.7	16.4	16.3	16.0	15.8	16.3	16.2	12.8	13.5	12.8	858
> 6 Monate bis 1 Jahr	28.0	28.3	27.8	30.8	29.9	29.4	34.0	25.8	31.2	33.5	29.9	32.2	31.6	37.0	35.9	30.2	31.7	30.3	2'028
> 1 Jahr bis 2 Jahre	23.0	24.5	23.8	22.8	23.9	22.6	25.5	25.8	24.8	15.1	17.7	15.7	19.9	16.8	17.4	21.6	21.6	21.7	1'453
> 2 bis 3 Jahre	9.1	9.3	9.3	9.4	11.2	9.4	11.3	9.7	12.4	3.6	5.4	4.4	4.6	5.8	5.5	7.8	7.8	8.0	539
> 3 bis 5 Jahre	8.1	7.4	7.8	9.1	9.7	9.8	8.0	12.9	9.2	1.6	0.7	1.8	2.6	4.2	3.9	6.5	5.8	6.4	426
> 5 bis 10 Jahre	3.4	3.3	3.3	3.4	2.2	4.7	2.8	4.8	3.9	0.3	0.7	0.6	0.0	0.4	0.3	2.5	1.9	2.5	168
mehr als 10 Jahre	0.4	0.5	0.4	0.2	1.5	1.4	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	32
N**	2'466	992	3'509	416	134	572	212	62	282	702	147	867	196	762	958	4'252	2'328	6'696	6'696
fehlende Angaben	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	21
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	71.5	71.8	71.8	75.4	82.3	89.3	78.5	88.9	84.2	35.3	38.7	40.4	39.4	46.0	44.6	63.1	60.1	64.8	
Standardabweichung	83.7	83.4	83.9	89.0	105.0	118.1	90.0	88.1	92.8	39.0	44.8	58.0	38.9	48.7	46.9	76.9	71.5	82.3	
1. Quartil	20.9	22.5	21.4	24.7	26.1	26.1	28.5	26.7	28.1	9.0	9.1	9.4	11.6	15.0	14.6	18.0	18.4	18.4	
Medianwert	44.2	46.7	45.9	46.9	50.1	49.1	50.7	55.5	53.1	26.7	26.4	27.6	29.9	31.9	31.4	39.0	38.6	39.7	
3. Quartil	90.9	88.9	90.9	94.1	104.0	106.3	90.3	130.4	107.7	46.0	51.4	49.0	53.5	54.9	54.7	77.8	73.0	78.3	
N**	2'466	992	3'509	416	134	572	212	62	282	702	147	867	196	762	958	4'252	2'328	6'696	
fehlende Angaben	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

^{*} Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

^{**} Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution während der Behandlung*																
nein	97.3	98.3	97.6	35.7	36.2	34.4	90.9	81.8	89.4	99.1	99.1	99.2	91.4	92.6	91.2	3'931
ja	2.7	1.7	2.4	64.3	63.8	65.6	9.1	18.2	10.6	0.9	0.9	0.8	8.6	7.4	8.8	377
N**	1'802	710	2'563	294	94	410	165	44	217	580	111	709	3'044	1'148	4'308	4'308
fehlende Angaben	677	286	963	124	40	164	47	18	65	123	36	159	1'028	422	1'450	1'450
Typ der Substitution***																
Heroin	2.3	0.0	1.9	1.9	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3	1.6	5
Methadon	58.1	27.3	51.9	86.2	92.9	87.9	84.6	75.0	81.0	60.0	100.0	66.7	80.0	81.3	80.3	244
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	8.8	3.6	7.4	15.4	12.5	14.3	20.0	0.0	16.7	8.0	3.8	6.9	21
andere Substanzen	39.5	72.7	46.3	3.1	1.8	2.8	0.0	12.5	4.8	20.0	0.0	16.7	10.2	13.8	11.1	34
N**	43	11	54	159	56	215	13	8	21	5	1	6	225	79	304	304
fehlende Angaben	6	1	7	30	4	54	2	0	2	0	0	0	38	6	73	73
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.0	99.5	99.2	61.3	62.2	61.5	94.6	87.2	93.0	99.6	99.0	99.5	95.7	96.3	95.8	3'623
ja	1.0	0.5	0.8	38.7	37.8	38.5	5.4	12.8	7.0	0.4	1.0	0.5	4.3	3.7	4.2	157
N**	1'641	645	2'286	225	74	299	148	39	187	535	105	640	2'739	1'041	3'780	3'780
fehlende Angaben	838	351	1'240	193	60	275	64	23	95	168	42	228	1'333	529	1'978	1'978
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	12.5	0.0	10.5	8.0	10.7	8.7	0.0	20.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.6	10.3	8.3	13
Substitution	87.5	100.0	89.5	92.0	89.3	91.3	100.0	80.0	92.3	100.0	100.0	100.0	92.4	89.7	91.7	144
N**	16	3	19	87	28	115	8	5	13	2	1	3	118	39	157	157
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	86.9	82.3	85.6	76.9	60.0	72.6	89.9	61.9	84.5	96.2	82.9	94.2	87.4	79.1	85.2	1'877
ja	13.1	17.7	14.4	23.1	40.0	27.4	10.1	38.1	15.5	3.8	17.1	5.8	12.6	20.9	14.8	325
N**	1'045	401	1'446	160	55	215	89	21	110	234	41	275	1'623	579	2'202	2'202
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'434</i>	<i>595</i>	<i>2'080</i>	<i>258</i>	<i>79</i>	<i>359</i>	<i>123</i>	<i>41</i>	<i>172</i>	<i>469</i>	<i>106</i>	<i>593</i>	<i>2'449</i>	<i>991</i>	<i>3'556</i>	<i>3'556</i>
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
institutionseigene Nachsorgestelle	4.0	1.8	3.3	18.9	14.3	17.2	0.0	28.6	13.3	0.0	0.0	0.0	6.3	6.7	6.4	19
fremde Aussenwohngruppe	4.0	1.8	3.3	2.7	4.8	3.4	12.5	0.0	6.7	11.1	0.0	6.3	4.2	1.9	3.4	10
fremde Nachsorgestelle	8.0	12.5	9.4	5.4	9.5	6.9	25.0	14.3	20.0	11.1	14.3	12.5	8.4	12.5	9.8	29
Alkoholberatungsstelle	18.4	26.8	21.0	10.8	4.8	8.6	12.5	0.0	6.7	22.2	28.6	25.0	16.2	17.3	16.6	49
Drogenberatungsstelle	2.4	1.8	2.2	8.1	23.8	13.8	37.5	14.3	26.7	0.0	0.0	0.0	5.2	7.7	6.1	18
andere Beratungsstelle	12.0	16.1	13.3	21.6	14.3	19.0	12.5	42.9	26.7	22.2	28.6	25.0	16.2	18.3	16.9	50
Selbsthilfegruppe	7.2	7.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.1	15
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	1.6	7.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.8	2.0	6
andere	46.4	32.1	42.0	37.8	28.6	34.5	0.0	14.3	6.7	33.3	28.6	31.3	40.8	32.7	38.0	112
N**	125	56	181	37	21	58	8	7	15	9	7	16	191	104	295	295
<i>fehlende Angaben</i>	<i>12</i>	<i>15</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>17</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2010)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	55.2	63.1	57.5	25.9	13.0	22.6	27.4	26.3	27.2	9.2	17.8	10.7	38.8	43.8	40.2	1'360
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.2	0.2	4.5	5.8	4.8	3.0	0.0	2.3	0.2	0.0	0.2	0.8	0.5	0.7	24
Heroin	0.8	0.9	0.8	61.7	52.2	59.3	9.6	5.3	8.7	0.4	0.0	0.3	6.4	4.5	5.9	198
Methadon	0.9	0.5	0.8	25.4	26.1	25.6	3.0	7.9	4.0	0.2	0.0	0.2	2.9	2.6	2.8	96
andere Opiate	0.2	0.0	0.1	4.0	5.8	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	15
Kokain	1.9	1.5	1.8	10.0	11.6	10.4	40.7	47.4	42.2	1.5	6.9	2.4	4.7	4.5	4.6	157
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Amphetamine	0.1	0.2	0.1	0.5	1.4	0.7	0.0	5.3	1.2	0.8	2.0	1.0	0.4	0.9	0.5	18
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	1.5	7.9	2.9	0.0	3.0	0.5	0.2	0.7	0.4	13
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
Barbiturate	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
Benzodiazepine	0.8	2.2	1.2	19.9	17.4	19.3	3.0	7.9	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.5	2.8	96
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.3	0.2	1.0	1.4	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	13
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.1	4
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	3.6	2.1	3.1	12.4	10.1	11.9	9.6	10.5	9.8	48.5	57.4	50.1	13.4	9.1	12.2	413
Tabak	12.7	10.6	12.1	16.9	24.6	18.9	17.8	13.2	16.8	16.8	22.8	17.9	15.6	15.5	15.6	526
andere Substanzen	0.5	0.0	0.3	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	0.4	15
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	0.7	1.2	42
Essstörungen	0.1	0.7	0.3	0.5	2.9	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	1.0	0.2	0.2	5.7	1.8	60
anderes suchtähnliches Problem	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.6	19
keine	39.2	34.2	37.8	17.9	26.1	20.0	35.6	34.2	35.3	43.9	34.7	42.3	37.9	32.5	36.3	1'229
N**	1'452	585	2'037	201	69	270	135	38	173	476	101	577	2'430	952	3'382	3'382
fehlende Angaben	1'027	411	1'489	216	65	303	77	24	109	227	46	291	1'641	617	2'374	2'374

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	53.8	41.6	50.4	22.7	28.1	24.3	53.1	42.1	50.6	76.6	60.0	74.1	55.0	43.2	51.9	741
einmal	10.8	10.4	10.7	6.7	12.5	8.4	10.9	21.1	13.3	5.5	12.0	6.5	9.6	10.7	9.9	141
zweimal	6.4	10.0	7.4	8.0	6.3	7.5	9.4	5.3	8.4	6.2	0.0	5.3	6.5	8.6	7.1	101
drei- oder viermal	14.0	16.5	14.7	25.3	21.9	24.3	7.8	15.8	9.6	5.5	20.0	7.6	13.5	17.2	14.5	207
fünfmal oder mehr	15.0	21.5	16.9	37.3	31.3	35.5	18.8	15.8	18.1	6.2	8.0	6.5	15.4	20.3	16.7	239
N**	706	279	985	75	32	107	64	19	83	145	25	170	1'045	384	1'429	1'429
fehlende Angaben	1'773	717	2'541	343	102	467	148	43	199	558	122	698	3'027	1'186	4'329	4'329
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	97.7	97.5	97.6	29.3	9.5	24.1	37.9	20.0	33.3	12.5	33.3	17.1	75.4	78.8	76.5	502
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.6	0.0	0.4	1.7	4.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
Opiate	4.2	0.6	3.0	81.0	95.2	84.8	27.6	30.0	28.2	6.3	0.0	4.9	15.8	12.0	14.6	96
Kokain und Derivate	4.9	2.5	4.1	24.1	23.8	24.1	75.9	90.0	79.5	9.4	0.0	7.3	12.3	8.7	11.1	73
Stimulantien	1.0	0.0	0.6	1.7	0.0	1.3	3.4	0.0	2.6	3.1	0.0	2.4	1.3	0.0	0.9	6
Medikamente	1.9	2.5	2.1	31.0	33.3	31.6	3.4	30.0	10.3	0.0	0.0	0.0	6.0	8.2	6.7	44
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
Tabak	5.2	1.3	3.9	22.4	19.0	21.5	13.8	10.0	12.8	81.3	77.8	80.5	14.1	6.7	11.7	77
flüchtige Stoffe	2.3	0.6	1.7	5.2	9.5	6.3	3.4	10.0	5.1	9.4	0.0	7.3	4.0	2.4	3.5	23
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.7	11
Essstörungen	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.8	5
anderes suchtähnliches Problem	0.3	0.0	0.2	0.0	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
N**	308	159	467	58	21	79	29	10	39	32	9	41	448	208	656	656
fehlende Angaben	18	4	22	0	2	2	1	1	2	2	1	3	22	10	32	32
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	30.2	21.2	27.3	7.7	22.2	13.6	35.3	71.4	45.8	45.0	50.0	45.5	31.3	25.3	29.5	84
3-6 Tage	23.7	30.3	25.9	23.1	22.2	22.7	17.6	0.0	12.5	20.0	50.0	22.7	21.7	28.7	23.9	68
7-10 Tage	10.1	6.1	8.8	15.4	11.1	13.6	17.6	0.0	12.5	15.0	0.0	13.6	12.1	5.7	10.2	29
>10 Tage bis 2 Wochen	0.7	6.1	2.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	1.5	4.6	2.5	7
>2 bis 4 Wochen	12.9	9.1	11.7	7.7	11.1	9.1	0.0	14.3	4.2	10.0	0.0	9.1	11.6	10.3	11.2	32
>4 bis 6 Wochen	5.8	16.7	9.3	0.0	11.1	4.5	11.8	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	5.6	13.8	8.1	23
>6 bis 8 Wochen	4.3	1.5	3.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	5.0	0.0	4.5	4.5	1.1	3.5	10
>2 Monate	12.2	9.1	11.2	30.8	22.2	27.3	5.9	14.3	8.3	5.0	0.0	4.5	11.6	10.3	11.2	32
N**	139	66	205	13	9	22	17	7	24	20	2	22	198	87	285	285
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	34.9	41.7	37.0	6.1	9.4	7.0	9.8	35.7	14.7	17.5	18.2	17.6	28.4	37.6	31.0	390
1 Tag pro Woche oder weniger	1.0	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.2	1.5	1.4	1.5	19
2 bis 3 Tage pro Woche	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	4.2	0.0	3.5	0.9	0.9	0.9	11
4 bis 6 Tage pro Woche	0.7	1.6	0.9	1.2	0.0	0.9	1.6	0.0	1.3	0.8	4.5	1.4	1.0	1.4	1.1	14
einmal täglich	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	1.0	0.3	0.8	10
mehrmals täglich	62.2	53.9	59.8	92.7	90.6	92.1	86.9	64.3	82.7	70.0	72.7	70.4	67.2	58.3	64.8	816
N**	601	254	855	82	32	114	61	14	75	120	22	142	912	348	1'260	1'260
fehlende Angaben	1'878	742	2'671	336	102	460	151	48	207	583	125	726	3'160	1'222	4'498	4'498
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	20.2	24.3	21.3	6.7	14.3	9.1	15.0	14.3	14.9	55.7	38.5	53.0	24.2	23.8	24.1	145
11-20 Zigaretten pro Tag	41.1	44.7	42.1	57.8	33.3	50.0	40.0	57.1	42.6	27.1	46.2	30.1	40.7	42.9	41.3	248
21-30 Zigaretten pro Tag	28.4	21.4	26.5	31.1	47.6	36.4	35.0	28.6	34.0	15.7	15.4	15.7	26.4	25.9	26.3	158
31 und mehr Zigaretten pro Tag	10.3	9.7	10.1	4.4	4.8	4.5	10.0	0.0	8.5	1.4	0.0	1.2	8.6	7.5	8.3	50
N**	282	103	385	45	21	66	40	7	47	70	13	83	454	147	601	601
fehlende Angaben	109	45	154	32	8	40	15	2	17	29	5	34	199	70	269	269

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz ¹ (nur Selbstbetroffene) (2010)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	36.4	39.1	37.2	57.5	65.0	59.4	67.5	71.4	68.4	47.4	47.1	47.3	41.4	44.2	42.1	773
zeitlich begrenzte Abstinenz	15.7	11.7	14.6	4.2	2.5	3.8	6.5	0.0	5.1	10.5	2.9	9.4	12.6	9.2	11.7	214
kontrollierter Konsum	33.3	32.6	33.1	14.2	12.5	13.8	11.7	14.3	12.2	16.8	32.4	19.2	29.1	29.3	29.2	535
keine Beschränkung beabsichtigt	4.5	2.9	4.0	5.0	7.5	5.6	2.6	0.0	2.0	7.4	0.0	6.3	4.9	2.9	4.4	80
bis jetzt nicht festgelegt	9.4	13.4	10.5	16.7	10.0	15.0	9.1	9.5	9.2	17.9	17.6	17.9	11.1	13.4	11.7	215
andere	0.7	0.3	0.6	2.5	2.5	2.5	2.6	4.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.9	17
N**	873	350	1'223	120	40	160	77	21	98	190	34	224	1'343	491	1'834	1'834
fehlende Angaben	1'606	646	2'303	298	94	414	135	41	184	513	113	644	2'729	1'079	3'924	3'924
Prognose*																
sehr gute Prognose	13.2	14.2	13.5	7.9	7.8	7.9	11.8	8.7	11.1	20.1	21.9	20.4	13.4	14.3	13.6	259
gute Prognose	48.1	40.2	45.9	17.3	41.2	23.7	44.7	65.2	49.5	54.0	56.3	54.3	46.3	42.8	45.3	861
eher ungünstige Prognose	29.1	36.6	31.2	51.1	25.5	44.2	26.3	21.7	25.3	21.7	18.8	21.3	29.8	32.6	30.6	581
ungünstige Prognose	9.6	8.9	9.4	23.7	25.5	24.2	17.1	4.3	14.1	4.2	3.1	4.1	10.5	10.4	10.5	199
N**	912	358	1'270	139	51	190	76	23	99	189	32	221	1'388	512	1'900	1'900
fehlende Angaben	1'567	638	2'256	279	83	384	136	39	183	514	115	647	2'684	1'058	3'858	3'858

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2010)

Selbstbetroffene: Hauptproblem													alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																
Männer			66.1			68.6			82.1			72.9			68.1	1419.0
Frauen			33.9			31.4			17.9			27.1			31.9	664.0
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0.0
N**	676	346	1'022	205	94	299	78	17	95	218	81	299	1'419	664	2'083	2'083
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	3.3	0.5	0.8	0.6	12.0
15-19	1.9	2.3	2.1	3.4	3.3	3.4	2.6	0.0	2.1	40.4	46.9	42.1	8.9	9.0	8.9	185.0
20-24	3.7	5.5	4.3	14.7	27.2	18.6	15.6	23.5	17.0	14.2	14.8	14.4	8.8	10.5	9.4	194.0
25-29	8.6	5.0	7.4	10.8	13.0	11.5	20.8	35.3	23.4	13.8	11.1	13.0	11.0	8.8	10.3	213.0
30-34	10.5	8.7	9.9	18.6	19.6	18.9	24.7	17.6	23.4	14.2	2.5	11.0	13.0	10.0	12.1	250.0
35-39	11.9	11.4	11.7	21.1	19.6	20.6	13.0	5.9	11.7	6.9	6.2	6.7	12.0	11.2	11.7	243.0
40-44	15.6	15.2	15.4	18.6	7.6	15.2	14.3	17.6	14.9	4.6	3.7	4.3	14.1	13.1	13.7	285.0
45-49	14.1	10.8	13.0	9.3	8.7	9.1	9.1	0.0	7.4	0.9	4.9	2.0	10.6	10.5	10.6	219.0
50-54	11.3	13.1	11.9	3.4	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	4.9	2.7	7.9	9.6	8.4	174.0
55-59	11.9	9.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.9	6.6	136.0
60-64	5.6	7.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	3.3	4.4	3.7	76.0
65-69	2.4	6.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	2.2	46.0
70-74	1.8	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.2	24.0
75 und mehr	0.7	2.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.8	16.0
N**	674	343	1'017	204	92	296	77	17	94	218	81	299	1'414	659	2'073	2'073
<i>fehlende Angaben</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	10
Alter																
Mittelwert	44.3	46.1	44.9	34.9	31.8	33.9	32.8	30.7	32.4	25.0	24.6	24.9	38.6	40.0	39.0	
Standardabweichung	12.5	14.1	13.1	8.6	8.9	8.8	7.9	7.3	7.8	9.3	10.9	9.8	13.6	15.0	14.1	
1. Quartil	35.0	36.7	35.2	27.8	23.9	26.4	26.7	26.0	26.0	17.4	17.0	17.2	28.1	27.3	28.0	
Medianwert	44.0	45.7	44.4	35.4	31.2	34.3	31.0	28.0	30.8	22.0	19.6	21.0	38.0	39.9	38.5	
3. Quartil	53.6	56.0	54.1	41.4	38.3	40.6	38.94	34.5	38.9	30.9	28.6	30.7	48.0	50.2	48.9	
N**	674	343	1'017	204	92	296	77	17	94	218	81	299	1'414	659	2'073	
<i>fehlende Angaben</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2010)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	56.0	58.9	56.9	1'186
Opiate	16.6	17.0	16.8	349
Kokain	6.1	3.3	5.2	109
Stimulantien	0.5	0.5	0.5	10
Hypnotika/Sedativa	0.9	4.1	1.9	40
Halluzinogene	0.0	0.2	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	13.7	13.1	13.5	282
Tabak	0.3	0.2	0.2	5
andere Substanz	4.3	2.0	3.6	74
suchtähnliche Verhaltensweisen	1.5	0.9	1.3	27
N**	1'419	664	2'083	2'083
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein