

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2011

Statistischer Tabellenband

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo,
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2012

Zitierhinweis: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2012). Ambulante
Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2011.
Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
T9	Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T10	Hilfserwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
T12	Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2011)
T13a	Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2011)
T13b	Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2011)
T14	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2011)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer
T15.1b	Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer
T15.2a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2011)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer und Frauen

- T23a Psychische Probleme im Leben (2011), Männer
- T23b Psychische Probleme im Leben (2011), Frauen
- T23c Psychische Probleme im Leben (2011), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2011)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2011)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2011)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2011)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2011)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2011)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2011)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik *act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2011 beteiligten sich 79 der 198 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer	69.9			72.2			80.1			82.2			20.1			64.3 4'599			
Frauen	30.1			27.8			19.9			17.8			79.9			35.7 2'548			
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0 0			
N**	2'612	1'125	3'737	346	133	479	241	60	301	834	181	1'015	201	801	1'002	4'599	2'548	7'147	7'147
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.7	7.4	4.5	1.0	1.7	2.0	1.4	1.8	127
15-19	2.6	2.0	2.4	1.7	8.3	3.6	4.1	20.0	7.3	56.9	58.6	57.2	5.6	3.6	4.0	13.6	8.6	11.8	840
20-24	4.1	2.7	3.7	11.0	19.5	13.4	9.5	31.7	14.0	13.0	14.4	13.2	4.0	4.7	4.6	7.1	6.9	7.0	501
25-29	9.1	5.3	7.9	20.6	21.8	20.9	31.5	23.3	29.9	10.4	8.3	10.1	3.5	7.5	6.7	11.4	8.2	10.3	729
30-34	9.3	6.5	8.4	15.1	19.5	16.3	23.2	13.3	21.3	6.0	4.4	5.7	6.6	8.1	7.8	10.1	7.9	9.3	663
35-39	10.3	8.8	9.9	21.4	9.8	18.2	12.9	6.7	11.6	2.6	2.2	2.6	8.6	8.6	8.6	9.9	8.5	9.4	668
40-44	15.3	15.8	15.4	16.8	11.3	15.3	13.3	3.3	11.3	1.6	2.8	1.8	15.2	15.5	15.4	12.2	13.5	12.7	901
45-49	14.5	18.2	15.6	7.2	5.3	6.7	3.3	0.0	2.7	1.6	0.6	1.4	15.2	17.9	17.4	10.5	14.8	12.0	854
50-54	13.1	13.8	13.3	4.6	3.8	4.4	0.8	1.7	1.0	0.1	1.1	0.3	11.1	14.6	13.9	8.9	11.8	9.9	705
55-59	9.8	10.7	10.0	1.4	0.8	1.3	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	8.1	6.7	7.0	6.4	7.3	6.7	476
60-64	5.7	8.2	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.5	5.5	3.6	5.5	4.3	303
65-69	3.7	4.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	6.6	2.9	3.7	2.6	3.0	2.8	196
70-74	1.6	2.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.9	2.0	1.2	1.7	1.3	95
75 und mehr	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.0	1.4	1.7	0.6	0.9	0.7	50
N**	2'600	1'122	3'722	345	133	478	241	60	301	833	181	1'014	198	787	985	4'579	2'529	7'108	7'108
fehlende Angaben	12	3	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	14	17	20	19	39	39
Alter																			
Mittelwert	44.5	47.2	45.3	35.2	31.6	34.2	32.4	26.4	31.2	21.2	20.8	21.2	44.9	44.2	44.3	38.1	41.8	39.4	
Standardabweichung	13.0	12.7	13.0	8.7	9.3	9.0	7.8	7.5	8.1	8.0	7.5	7.9	16.1	13.5	14.0	15.0	14.8	15.0	
1. Quartil	34.9	39.7	36.4	28.3	24.2	27.3	27.0	20.8	25.6	16.5	16.5	16.5	35.6	35.0	35.1	26.1	30.0	27.2	
Medianwert	44.6	47.4	45.7	35.6	30.0	33.3	31.3	24.7	29.7	17.7	17.7	17.7	45.4	45.2	45.3	37.9	43.4	40.2	
3. Quartil	53.6	55.6	54.3	41.3	37.5	40.9	37.16	29.6	36.2	23.8	22.8	23.7	56.0	52.1	52.8	49.2	51.7	50.3	
N**	2'600	1'122	3'722	345	133	478	241	60	301	833	181	1'014	198	787	985	4'579	2'529	7'108	
fehlende Angaben	12	3	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	14	17	20	19	39	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	42.8	30.4	39.1	72.4	77.6	73.8	69.5	82.8	72.1	93.6	93.6	93.6	25.9	24.1	24.5	56.4	39.8	50.5	3'433
verheiratet	31.0	27.1	29.8	13.1	11.2	12.6	19.1	6.9	16.7	4.2	2.9	3.9	60.5	53.6	55.0	25.2	31.4	27.4	1'864
getrennt	5.3	6.2	5.6	3.0	2.4	2.8	5.9	5.2	5.8	0.6	0.0	0.5	1.1	3.2	2.8	3.8	4.3	4.0	272
geschieden	18.7	30.5	22.2	9.2	8.0	8.9	4.7	3.4	4.4	1.5	2.9	1.8	9.2	15.3	14.1	12.8	20.4	15.5	1'052
verwitwet	1.9	5.3	2.9	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	1.6	3.1	2.8	1.2	3.5	2.0	137
reg. Partnerschaft	0.4	0.5	0.4	1.8	0.8	1.5	0.8	1.7	1.0	0.1	0.0	0.1	1.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	38
N**	2'491	1'078	3'569	337	125	462	236	58	294	791	173	964	185	750	935	4'376	2'420	6'796	6'796
fehlende Angaben	121	47	168	9	8	17	5	2	7	43	8	51	16	51	67	223	128	351	351
Staatsangehörigkeit*																			
CH	79.2	85.6	81.2	66.9	86.3	72.5	69.2	85.4	72.3	86.2	88.5	86.6	86.6	87.9	87.6	79.5	86.2	81.9	5'297
EU	14.1	10.5	13.0	21.4	12.0	18.7	16.3	4.2	14.1	7.3	5.5	7.0	10.2	7.8	8.3	13.1	9.1	11.7	754
andere	6.6	3.9	5.8	11.7	1.7	8.8	14.4	10.4	13.7	6.5	6.1	6.4	3.2	4.3	4.1	7.4	4.7	6.4	416
N**	2'390	1'037	3'427	290	117	407	208	48	256	739	165	904	186	718	904	4'149	2'318	6'467	6'467
fehlende Angaben	222	88	310	56	16	72	33	12	45	95	16	111	15	83	98	450	230	680	680

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	8.2	9.7	8.6	4.2	3.8	4.1	1.3	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	11.1	8.4	8.9	5.5	7.2	6.1	414
Umland der Grossstadtzentren	14.4	14.1	14.3	7.2	4.6	6.5	14.2	13.6	14.0	8.8	6.2	8.4	15.3	14.6	14.7	11.9	12.1	12.0	814
Mittelzentren	13.5	15.2	14.0	17.4	24.6	19.4	23.8	16.9	22.4	24.1	31.5	25.5	15.8	15.2	15.3	16.9	17.9	17.3	1'173
Kleinzentren	34.2	33.8	34.1	44.1	35.4	41.7	39.2	49.2	41.1	34.8	41.0	35.9	28.9	34.4	33.3	36.1	35.4	35.8	2'432
rural	29.7	27.3	29.0	27.0	31.5	28.3	21.7	20.3	21.4	32.1	21.3	30.2	28.9	27.5	27.8	29.6	27.4	28.8	1'955
N**	2'445	1'060	3'505	333	130	463	240	59	299	816	178	994	190	742	932	4'378	2'410	6'788	6'788
fehlende Angaben	167	65	232	13	3	16	1	1	2	18	3	21	11	59	70	221	138	359	359
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	36.8	33.8	35.9	30.9	27.4	29.9	35.7	29.4	34.4	13.0	12.0	12.8	7.7	11.5	10.8	29.2	24.0	27.4	1'515
mit Eltern/Elternteil	7.6	3.9	6.5	15.8	17.9	16.5	13.1	31.4	16.8	63.9	56.3	62.6	13.8	7.3	8.5	21.8	12.4	18.5	1'022
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.6	13.4	5.2	0.7	8.5	3.0	0.0	2.0	0.4	0.3	1.9	0.6	3.8	11.9	10.4	1.3	11.2	4.8	265
mit PartnerIn (ohne Kinder)	24.2	23.6	24.0	15.8	22.2	17.7	17.1	19.6	17.6	4.2	8.9	5.0	26.9	27.0	27.0	18.5	22.8	20.0	1'108
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.3	15.6	18.2	11.5	7.7	10.4	18.1	2.0	14.8	3.8	3.2	3.7	46.9	39.6	41.0	16.6	20.2	17.9	989
mit anderen Verw./Angeh.	1.3	1.1	1.2	4.0	4.3	4.1	4.5	2.0	4.0	1.8	0.0	1.5	0.8	0.9	0.9	1.8	1.2	1.6	87
mit FreundInnen (WG)	3.1	2.0	2.8	3.6	2.6	3.3	6.0	7.8	6.4	3.1	0.6	2.6	0.0	1.2	1.0	3.2	2.2	2.9	158
anderes	6.1	6.8	6.3	17.6	9.4	15.2	5.5	5.9	5.6	10.0	17.1	11.3	0.0	0.5	0.4	7.7	6.0	7.1	392
N**	1'944	853	2'797	278	117	395	199	51	250	718	158	876	130	563	693	3'576	1'960	5'536	5'536
fehlende Angaben	668	272	940	68	16	84	42	9	51	116	23	139	71	238	309	1'023	588	1'611	1'611
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	93.5	93.4	93.5	82.6	78.8	81.5	90.1	75.0	87.3	90.7	85.6	89.8	97.9	97.8	97.8	92.3	92.8	92.5	4'808
instabile Wohnsituation	4.2	3.5	4.0	12.4	19.2	14.5	8.1	20.0	10.4	4.4	9.6	5.4	2.1	2.2	2.2	4.9	5.1	5.0	259
Institution	2.3	3.1	2.6	5.0	1.9	4.0	1.7	5.0	2.4	4.9	4.8	4.9	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0	2.6	133
N**	1'857	809	2'666	242	104	346	172	40	212	636	146	782	140	547	687	3'342	1'858	5'200	5'200
fehlende Angaben	755	316	1071	104	29	133	69	20	89	198	35	233	61	254	315	1257	690	1947	1'947

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst. zeitweilige Beziehung(en)	34.7	36.5	35.2	40.5	27.1	36.1	35.4	34.3	35.2	68.2	49.2	64.3	12.1	15.5	14.9	39.7	30.6	36.4	1'641
feste Beziehung, getrennt lebend	3.7	4.8	4.0	3.0	10.4	5.4	8.1	14.3	9.2	4.5	9.3	5.4	0.9	1.4	1.3	3.9	4.8	4.3	192
fehlende Angaben	12.2	15.4	13.2	19.5	25.0	21.3	19.3	25.7	20.4	16.3	22.9	17.7	7.8	8.5	8.4	13.6	14.7	14.0	634
fehlende Angaben	49.5	43.3	47.6	37.0	37.5	37.2	37.3	25.7	35.2	11.0	18.6	12.6	79.3	74.6	75.4	42.7	49.9	45.3	2'047
N**	1'664	748	2'412	200	96	296	161	35	196	471	118	589	116	503	619	2'838	1'676	4'514	4'514
fehlende Angaben	948	377	1'325	146	37	183	80	25	105	363	63	426	85	298	383	1'761	872	2'633	2'633
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	44.2	34.7	41.2	62.2	50.9	59.0	59.1	78.3	63.1	89.7	90.8	89.9	32.1	24.0	25.5	55.0	40.0	49.5	2'599
1 Kind	17.1	22.3	18.7	20.6	29.2	23.1	26.3	13.0	23.5	6.3	5.3	6.1	20.9	16.5	17.3	16.1	19.1	17.2	901
2 Kinder	26.8	28.8	27.4	13.7	16.0	14.4	12.3	6.5	11.1	3.0	3.1	3.0	31.3	38.8	37.4	20.2	27.1	22.7	1'193
3 Kinder oder mehr	11.9	14.2	12.6	3.4	3.8	3.5	2.3	2.2	2.3	1.0	0.8	1.0	15.7	20.7	19.8	8.7	13.8	10.6	557
N**	1'905	873	2'778	262	106	368	171	46	217	575	131	706	134	588	722	3'314	1'936	5'250	5'250
fehlende Angaben	707	252	959	84	27	111	70	14	84	259	50	309	67	213	280	1'285	612	1'897	1'897
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	72.4	64.3	69.8	76.6	69.8	74.7	75.4	75.8	75.4	58.6	65.8	59.9	42.4	39.2	39.8	68.5	57.4	64.3	2'923
1 Kind	12.0	18.0	13.9	13.8	18.6	15.1	14.2	9.1	13.2	11.5	8.1	10.9	22.4	21.3	21.5	12.9	18.2	14.9	676
2 Kinder	11.2	13.5	11.9	6.9	9.3	7.6	8.2	12.1	9.0	18.6	16.2	18.2	21.6	28.8	27.4	12.7	17.9	14.6	665
3 Kinder oder mehr	4.5	4.1	4.4	2.8	2.3	2.6	2.2	3.0	2.4	11.3	9.9	11.0	13.6	10.7	11.3	6.0	6.4	6.2	280
N**	1'630	754	2'384	218	86	304	134	33	167	505	111	616	125	531	656	2'850	1'694	4'544	4'544
fehlende Angaben	982	371	1'353	128	47	175	107	27	134	329	70	399	76	270	346	1'749	854	2'603	2'603

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																				
keine Ausbildung abgeschl.	3.4	5.3	4.0	8.1	5.9	7.5	3.8	7.0	4.4	21.3	18.5	20.8	9.3	4.2	5.2	8.4	6.8	7.9	390	
obligatorische Schule	12.7	14.9	13.4	32.6	38.2	34.2	18.1	44.2	23.1	54.9	59.9	55.8	5.6	12.8	11.3	24.4	21.9	23.6	1'170	
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	3.1	5.6	3.9	3.1	9.8	5.0	4.9	2.3	4.4	2.7	5.1	3.2	1.9	3.5	3.2	3.2	5.3	3.9	194	
Berufslehre, Berufsschule	59.1	54.8	57.8	47.7	37.3	44.7	67.6	39.5	62.2	17.5	12.7	16.6	40.7	54.0	51.3	47.7	47.2	47.5	2'358	
Maturität, Diplommittelschule	5.1	3.9	4.7	3.1	7.8	4.4	3.3	7.0	4.0	1.7	3.2	2.0	7.4	5.1	5.6	4.3	5.2	4.6	228	
Lehrerseminar	0.6	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.7	3.3	3.3	0.6	1.9	1.0	50	
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.4	6.4	6.4	1.2	1.0	1.1	1.1	0.0	0.9	1.0	0.0	0.8	13.9	7.2	8.6	4.6	5.1	4.7	235	
höhere Fachschule	1.9	1.5	1.8	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9	1.4	1.3	1.3	1.1	1.3	63	
Fachhochschule	2.0	1.2	1.8	1.9	0.0	1.4	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	1.9	3.5	3.2	1.5	1.7	1.6	77	
Universität, Hochschule	5.6	4.5	5.3	1.2	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.4	0.6	0.5	14.8	5.1	7.1	4.0	3.8	4.0	197	
N**	1'778	752	2'530	258	102	360	182	43	225	696	157	853	108	430	538	3'293	1'669	4'962	4'962	
<i>fehlende Angaben</i>	834	373	1'207	88	31	119	59	17	76	138	24	162	93	371	464	1'306	879	2'185	2'185	
Berufliche Stellung*																				
nicht erwerbstätig	31.3	44.1	35.3	58.2	76.4	63.0	26.7	72.2	33.3	19.4	20.0	19.5	22.4	29.2	27.9	30.6	40.9	34.0	817	
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.9	1.2	1.7	0.7	1.8	1.0	2.9	5.6	3.3	27.5	22.2	26.7	4.1	1.5	2.0	7.0	3.0	5.7	137	
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.6	3.1	3.4	4.6	5.5	4.8	2.9	0.0	2.4	3.5	4.4	3.6	0.0	2.5	2.0	3.4	3.3	3.4	81	
angelernte(r) ArbeiterIn	6.1	5.5	6.0	8.5	7.3	8.2	10.5	0.0	8.9	5.3	6.7	5.5	2.0	3.0	2.8	6.6	5.3	6.2	149	
gelernte(r) ArbeiterIn	15.3	8.2	13.1	15.0	5.5	12.5	23.8	0.0	20.3	8.1	6.7	7.9	8.2	7.4	7.6	14.2	7.7	12.1	290	
VorarbeiterIn	3.1	0.7	2.4	2.0	0.0	1.4	3.8	0.0	3.3	0.7	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	2.5	0.5	1.8	44	
einfache(r) Angestellte(r)	14.9	17.8	15.8	5.2	1.8	4.3	16.2	5.6	14.6	5.6	11.1	6.4	18.4	29.7	27.5	12.5	18.8	14.6	351	
mittl. Angestellte(r)/ Kader	8.7	9.9	9.1	2.6	0.0	1.9	3.8	0.0	3.3	2.5	2.2	2.4	16.3	9.4	10.8	6.9	7.7	7.2	172	
leit. Angestellte(r)/Kader	3.6	1.2	2.8	1.3	0.0	1.0	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	8.2	2.0	3.2	2.6	1.1	2.1	51	
selbständig	8.8	6.3	8.0	0.0	1.8	0.5	5.7	0.0	4.9	1.1	0.0	0.9	10.2	7.4	8.0	6.0	5.3	5.8	139	
SchülerIn/StudentIn	1.9	1.2	1.7	0.7	0.0	0.5	1.0	16.7	3.3	24.6	26.7	24.9	10.2	7.4	8.0	6.5	5.9	6.3	151	
andere Stellung	0.8	0.7	0.7	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.8	20	
N**	929	415	1'344	153	55	208	105	18	123	284	45	329	49	202	251	1'610	792	2'402	2'402	
<i>fehlende Angaben</i>	1'683	710	2'393	193	78	271	136	42	178	550	136	686	152	599	751	2'989	1'756	4'745	4'745	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	54.1	37.9	49.2	30.4	19.0	27.2	62.4	31.6	56.3	30.1	24.9	29.1	68.8	60.1	61.8	48.1	42.2	46.0	2'878
Ersparnisse	1.6	1.6	1.6	0.6	3.2	1.3	3.1	1.8	2.8	0.5	1.2	0.6	0.6	0.3	0.4	1.4	1.3	1.4	86
Rente (AHV/IV u.a.)	16.7	22.8	18.6	12.7	13.5	12.9	7.9	17.5	9.8	4.0	6.4	4.4	15.3	11.4	12.2	13.1	17.0	14.4	903
Sozialhilfe/Fürsorge	15.4	15.4	15.4	37.9	38.1	37.9	11.8	22.8	14.0	8.4	13.9	9.4	3.2	2.6	2.7	15.0	12.5	14.1	882
Arbeitslosenversicherung	6.6	4.9	6.1	8.7	6.3	8.0	4.8	1.8	4.2	2.3	1.7	2.2	0.6	1.6	1.4	5.4	3.5	4.7	295
durch PartnerIn	0.9	13.1	4.6	2.2	5.6	3.1	0.0	5.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.9	17.9	14.6	1.0	12.3	4.9	308
durch Eltern/Angehörige	2.8	1.9	2.6	5.0	11.9	6.9	5.7	19.3	8.4	52.8	49.1	52.1	8.9	4.7	5.6	14.4	9.3	12.6	788
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.7	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	9
andere illegale Einkünfte	0.2	0.0	0.1	0.6	0.8	0.7	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	10
Prostitution	0.0	0.2	0.1	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3
anderes	1.5	2.0	1.7	1.2	0.0	0.9	2.2	0.0	1.7	1.0	2.3	1.3	0.6	1.5	1.3	1.3	1.6	1.4	89
N**	2'251	976	3'227	322	126	448	229	57	286	775	173	948	157	616	773	4'073	2'178	6'251	6'251
fehlende Angaben	361	149	510	24	7	31	12	3	15	59	8	67	44	185	229	526	370	896	896
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	48.5	24.1	41.2	24.6	12.3	21.2	54.9	26.3	49.1	20.7	12.9	19.3	68.7	34.0	40.8	41.6	25.8	36.2	2'188
Teilzeitarbeit	5.7	17.8	9.3	5.0	6.6	5.4	4.4	3.5	4.2	2.1	5.9	2.8	3.0	29.8	24.5	4.8	18.5	9.5	572
Gelegenheitsarbeit	1.1	1.6	1.2	0.9	0.8	0.9	0.4	1.8	0.7	0.9	0.6	0.8	1.5	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0	63
in Ausbildung	2.5	2.1	2.4	1.6	4.9	2.5	4.4	14.0	6.4	54.1	57.6	54.7	10.4	7.1	7.8	14.1	10.6	12.9	779
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	19.9	33.2	23.9	25.9	31.1	27.3	12.8	28.1	15.9	6.6	7.6	6.8	14.2	21.8	20.3	16.9	26.7	20.3	1'225
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	14.3	12.3	13.7	25.9	27.0	26.2	13.7	14.0	13.8	8.8	7.6	8.6	1.5	3.5	3.1	13.2	9.6	12.0	725
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.6	0.3	0.5	0.3	0.0	0.2	1.3	0.0	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	29
anderes	7.5	8.5	7.8	15.9	17.2	16.3	8.0	12.3	8.8	6.7	7.1	6.8	0.7	2.6	2.2	7.9	7.2	7.6	461
N**	2'201	933	3'134	321	122	443	226	57	283	773	170	943	134	547	681	3'978	2'064	6'042	6'042
fehlende Angaben	411	192	603	25	11	36	15	3	18	61	11	72	67	254	321	621	484	1'105	1'105

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																				
kein Einkommen	22.1	34.7	25.4	33.1	38.6	34.5	17.8	60.0	28.3	44.0	59.4	46.1	27.8	30.2	29.8	28.6	37.8	31.2	484	
weniger als 1000 Fr.	4.8	4.5	4.8	11.5	15.9	12.6	6.7	6.7	6.7	22.0	18.8	21.6	11.1	9.4	9.6	9.6	8.4	9.2	143	
1001 bis 2000 Fr.	6.1	14.4	8.3	14.6	11.4	13.8	13.3	20.0	15.0	10.0	9.4	10.0	11.1	20.8	19.3	8.0	14.9	10.0	155	
2001 bis 3000 Fr.	8.7	16.7	10.8	13.1	15.9	13.8	11.1	6.7	10.0	4.8	6.3	5.0	0.0	4.2	3.5	8.3	12.4	9.5	147	
3001 bis 4000 Fr.	13.4	14.0	13.5	14.6	11.4	13.8	17.8	0.0	13.3	8.1	6.3	7.9	11.1	15.6	14.9	12.3	13.1	12.5	194	
4001 bis 5000 Fr.	19.4	4.5	15.4	9.2	4.5	8.0	22.2	6.7	18.3	6.7	0.0	5.8	5.6	7.3	7.0	15.4	4.8	12.4	192	
5001 bis 6000 Fr.	13.4	5.9	11.4	1.5	2.3	1.7	4.4	0.0	3.3	2.9	0.0	2.5	16.7	6.3	7.9	9.4	4.5	8.0	124	
6001 bis 8000 Fr.	7.7	4.5	6.9	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	1.7	1.0	0.0	0.8	11.1	5.2	6.1	5.4	3.4	4.8	75	
8001 bis 10 000 Fr.	3.2	0.9	2.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.9	2.1	0.5	1.6	25	
10001 bis 15 000 Fr.	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	0.5	0.0	0.4	0.0	1.0	0.9	0.7	0.2	0.6	9	
über 15 000 Fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1	
N**	620	222	842	130	44	174	45	15	60	209	32	241	18	96	114	1'107	442	1'549	1'549	
<i>fehlende Angaben</i>	1'992	903	2'895	216	89	305	196	45	241	625	149	774	183	705	888	3'492	2'106	5'598	5'598	
Schulden*																				
keine Schulden	69.1	81.6	72.7	39.5	35.8	38.6	45.8	56.0	47.6	83.9	89.7	84.8	93.6	92.4	92.6	68.5	81.2	72.4	1'976	
bis 5000 Fr.	4.8	5.6	5.0	11.5	18.9	13.3	10.0	28.0	13.1	6.9	6.2	6.8	0.0	2.0	1.6	6.1	6.4	6.2	170	
5001 bis 10 000 Fr.	7.0	5.3	6.5	12.1	7.5	11.0	12.5	4.0	11.0	3.4	2.1	3.1	4.3	1.5	2.0	6.6	4.0	5.8	159	
10 001 bis 25 000 Fr.	6.2	4.0	5.5	15.9	17.0	16.2	10.8	0.0	9.0	3.1	0.0	2.6	0.0	1.5	1.2	6.6	4.0	5.8	159	
25 001 bis 50 000 Fr.	6.2	1.6	4.8	13.4	11.3	12.9	10.0	4.0	9.0	1.0	2.1	1.2	0.0	0.5	0.4	5.8	2.1	4.7	128	
50 001 bis 100 000 Fr.	2.1	0.5	1.6	4.5	3.8	4.3	5.8	4.0	5.5	1.3	0.0	1.0	0.0	0.5	0.4	2.9	0.7	2.2	60	
über 100 000 Fr.	4.8	1.3	3.8	3.2	5.7	3.8	5.0	4.0	4.8	0.4	0.0	0.3	2.1	1.5	1.6	3.4	1.4	2.8	77	
N**	926	376	1'302	157	53	210	120	25	145	477	97	574	47	197	244	1'889	840	2'729	2'729	
<i>fehlende Angaben</i>	1'686	749	2'435	189	80	269	121	35	156	357	84	441	154	604	758	2'710	1'708	4'418	4'418	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	89.5	97.6	91.9	42.9	66.7	48.9	63.3	90.9	67.6	92.5	89.5	92.1	83.8	94.1	86.5	1'549
Strafhaft	6.1	0.9	4.5	29.3	11.1	24.7	16.7	9.1	15.5	3.1	2.6	3.0	8.7	2.1	7.0	125
Untersuchungshaft	3.2	0.6	2.4	6.8	13.3	8.4	11.7	0.0	9.9	3.1	5.3	3.4	4.0	2.1	3.5	62
Straf- und Untersuchungshaft	1.2	0.9	1.1	21.1	8.9	18.0	8.3	0.0	7.0	1.3	2.6	1.5	3.5	1.7	3.0	54
N**	806	338	1'144	133	45	178	60	11	71	227	38	265	1'316	474	1'790	1'790
fehlende Angaben	1'806	787	2'593	213	88	301	181	49	230	607	143	750	3'082	1'273	4'355	4'355
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	40.3	16.7	38.4	14.8	22.2	15.7	33.3	.	33.3	23.1	66.7	31.3	28.0	27.8	28.0	51
1 bis 2 Monate	14.9	16.7	15.1	6.6	33.3	10.0	13.3	.	13.3	15.4	0.0	12.5	11.3	22.2	12.4	23
>2 bis 6 Monate	31.3	50.0	32.9	16.4	44.4	20.0	26.7	.	26.7	23.1	33.3	25.0	24.4	44.4	26.3	49
>6 bis 12 Monate	4.5	16.7	5.5	18.0	0.0	15.7	6.7	.	6.7	7.7	0.0	6.3	9.5	5.6	9.1	17
mehr als 1 Jahr	9.0	0.0	8.2	44.3	0.0	38.6	20.0	.	20.0	30.8	0.0	25.0	26.8	0.0	24.2	45
N**	66	6	72	61	9	70	15	0	15	13	3	16	167	18	185	185
fehlende Angaben	19	2	21	15	6	21	7	1	8	4	1	5	46	10	56	56

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	34.5	39.7	36.1	49.4	45.9	48.4	40.9	45.6	41.9	20.3	22.3	20.7	70.9	77.4	76.2	35.6	51.6	41.3	2'738
PartnerIn	4.4	2.6	3.9	2.6	3.0	2.7	5.2	0.0	4.2	1.1	0.6	1.0	5.6	1.7	2.4	3.8	2.0	3.1	208
Familie	3.8	5.9	4.4	3.5	3.8	3.6	7.8	10.5	8.3	8.3	6.7	8.0	4.5	4.0	4.1	5.3	5.7	5.4	361
FreundInnen/Bekannte	2.0	2.3	2.1	2.4	3.8	2.7	3.4	7.0	4.2	0.7	1.1	0.8	2.2	4.0	3.6	1.9	3.3	2.4	156
spez. ambulante Institution	1.6	2.4	1.9	3.2	4.5	3.6	0.4	1.8	0.7	0.6	1.1	0.7	0.6	1.7	1.4	1.4	2.1	1.6	109
spez. stationäre Institution	6.0	5.9	6.0	3.5	4.5	3.8	6.5	3.5	5.9	0.5	1.1	0.6	0.0	0.4	0.3	4.2	3.2	3.8	255
Arztpraxis	8.6	9.9	9.0	10.0	17.3	12.1	2.6	7.0	3.5	3.5	2.2	3.3	3.9	3.7	3.8	7.0	7.4	7.1	471
Spital/Klinik	11.8	14.5	12.6	3.8	6.0	4.4	5.2	12.3	6.6	1.5	1.7	1.5	1.7	0.6	0.8	8.2	8.0	8.1	538
Sozialdienste	6.2	5.1	5.9	5.9	4.5	5.5	3.4	1.8	3.1	4.2	5.0	4.4	2.8	1.7	1.9	5.7	4.0	5.1	336
Justiz/adm. Massnahme	13.2	5.2	10.8	12.9	4.5	10.6	17.2	5.3	14.9	46.9	41.9	46.0	2.2	1.0	1.2	18.6	6.3	14.2	943
ArbeitgeberIn	3.5	2.3	3.1	0.3	0.8	0.4	2.2	0.0	1.7	2.1	3.9	2.4	1.1	0.7	0.8	2.6	1.7	2.3	152
LehrerIn	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	1.2	2.2	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	44
anderes	4.3	3.9	4.2	2.4	1.5	2.1	5.2	5.3	5.2	8.7	11.7	9.3	2.2	2.8	2.6	5.2	4.2	4.9	322
N**	2'372	1'029	3'401	340	133	473	232	57	289	803	179	982	179	727	906	4'270	2'363	6'633	6'633
fehlende Angaben	240	96	336	6	0	6	9	3	12	31	2	33	22	74	96	329	185	514	514
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	28.4	23.5	27.0	19.1	28.6	21.8	32.7	36.8	33.3	19.7	28.6	20.9	11.5	13.2	12.9	25.5	21.3	24.1	699
PartnerIn	11.6	7.2	10.3	9.0	8.6	8.9	9.3	0.0	7.9	6.0	6.1	6.0	16.4	2.4	4.8	10.7	5.8	9.1	263
Familie	5.0	5.9	5.2	4.5	10.0	6.0	6.5	15.8	7.9	12.0	14.3	12.3	6.6	5.1	5.3	6.2	6.6	6.4	185
FreundInnen/Bekannte	1.4	2.2	1.6	2.8	1.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.6	3.4	3.1	1.3	2.3	1.7	48
spez. ambulante Institution	0.7	0.9	0.7	3.4	2.9	3.2	0.9	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	1.6	2.4	2.2	1.0	1.3	1.1	32
spez. stationäre Institution	3.3	3.3	3.3	1.7	4.3	2.4	0.9	5.3	1.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2.2	64
Arztpraxis	4.4	7.2	5.2	7.9	7.1	7.7	1.9	0.0	1.6	1.3	2.0	1.4	3.3	2.0	2.2	4.0	4.8	4.3	124
Spital/Klinik	4.0	3.5	3.9	3.9	4.3	4.0	3.7	0.0	3.2	0.3	2.0	0.6	1.6	0.0	0.3	3.2	2.2	2.9	84
Sozialdienste	2.0	2.0	2.0	5.1	11.4	6.9	2.8	15.8	4.8	1.7	0.0	1.4	1.6	0.3	0.6	2.4	2.2	2.3	67
Justiz/adm. Massnahme	2.2	1.3	1.9	3.9	5.7	4.4	3.7	0.0	3.2	3.7	6.1	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.3	2.2	64
ArbeitgeberIn	2.2	1.1	1.9	0.6	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.3	0.3	1.7	0.9	1.4	41
LehrerIn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.6	3.3	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	5
anderes	2.7	3.5	2.9	1.7	2.9	2.0	3.7	0.0	3.2	3.0	4.1	3.2	3.3	1.7	2.0	2.8	2.9	2.9	83
keine	40.6	46.2	42.2	47.8	40.0	45.6	41.1	36.8	40.5	54.0	49.0	53.3	55.7	69.6	67.2	44.0	53.4	47.1	1368.0
N**	1'146	459	1'605	178	70	248	107	19	126	300	49	349	61	296	357	1'939	964	2'903	2'903
fehlende Angaben	1'466	666	2'132	168	63	231	134	41	175	534	132	666	140	505	645	2'660	1'584	4'244	4'244

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hilferwartungen für...*																			
Suchtprobleme	84.3	89.0	85.7	91.3	93.3	91.8	80.3	87.5	81.6	72.6	75.9	73.0	66.7	58.2	59.7	81.7	79.3	80.9	2'602
somatische Probleme	2.2	2.6	2.3	7.3	6.7	7.1	2.6	0.0	2.1	0.9	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	2.3	73
psychische Probleme	13.6	21.4	15.9	20.9	22.7	21.4	14.5	8.3	13.5	7.1	6.9	7.1	6.1	15.0	13.3	13.0	18.8	14.9	478
Beziehungsprobleme	12.3	16.6	13.6	9.7	14.7	11.0	9.4	16.7	10.6	4.1	6.9	4.5	24.2	36.7	34.4	10.6	21.6	14.2	458
Familienprobleme	7.5	11.7	8.7	10.7	17.3	12.5	7.7	12.5	8.5	10.0	8.6	9.8	53.0	45.2	46.7	9.6	21.7	13.6	437
finanzielle Probleme	6.5	5.5	6.2	19.9	24.0	21.0	14.5	8.3	13.5	7.1	1.7	6.3	4.5	4.4	4.4	8.8	6.8	8.1	262
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	11.3	7.8	10.3	12.1	14.7	12.8	12.0	16.7	12.8	9.7	10.3	9.8	6.1	2.7	3.3	11.2	7.3	9.9	319
Wohnprobleme	3.5	2.5	3.2	8.7	10.7	9.3	4.3	4.2	4.3	2.4	5.2	2.8	1.5	5.4	4.7	3.9	4.5	4.1	132
Gewaltprobleme	1.0	0.9	1.0	1.9	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	1.5	0.0	1.3	1.5	3.4	3.1	1.1	1.4	1.2	39
rechtliche Probleme	8.2	1.7	6.3	7.3	2.7	6.0	17.9	0.0	14.9	14.2	6.9	13.1	1.5	3.4	3.1	9.1	2.7	7.0	224
andere(s)	2.4	1.7	2.2	1.9	1.3	1.8	1.7	0.0	1.4	2.4	1.7	2.3	1.5	1.0	1.1	2.7	1.9	2.4	78
keine Erwartung	7.5	6.6	7.3	1.0	2.7	1.4	7.7	4.2	7.1	16.2	19.0	16.6	0.0	1.0	0.8	8.1	5.3	7.2	231
N**	1'272	529	1'801	206	75	281	117	24	141	339	58	397	66	294	360	2'160	1'056	3'216	3'216
fehlende Angaben	1'340	596	1'936	140	58	198	124	36	160	495	123	618	135	507	642	2'439	1'492	3'931	3'931
Rechtsgrundlage der Behandlung																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.5	0.4	0.5	1.1	3.0	1.7	2.0	0.0	1.6	9.5	6.5	9.1	3.1	1.3	1.7	2.2	1.1	1.8	51
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	1.6	1.1	1.5	0.6	0.0	0.4	2.0	0.0	1.6	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	1.2	32
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.4	0.0	0.3	1.7	0.0	1.2	1.0	4.8	1.6	4.6	2.2	4.3	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	24
anderes	11.5	3.9	9.2	9.1	4.5	7.9	12.9	9.5	12.3	26.1	26.1	26.1	0.0	0.4	0.3	12.9	4.6	10.2	284
keine (freiwillige Behandlung)	86.0	94.6	88.6	86.9	92.4	88.4	83.2	85.7	83.6	58.0	65.2	59.0	96.9	98.3	98.0	82.3	93.5	85.9	2'390
N**	1'117	465	1'582	175	66	241	101	21	122	283	46	329	65	237	302	1'878	904	2'782	2'782
fehlende Angaben	1'495	660	2'155	171	67	238	140	39	179	551	135	686	136	564	700	2'721	1'644	4'365	4'365

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	45.5	41.6	44.4	17.7	16.0	17.2	48.6	57.4	50.4	76.5	78.5	76.9	71.8	66.3	67.3	52.3	52.2	52.2	3'081
ja	54.5	58.4	55.6	82.3	84.0	82.8	51.4	42.6	49.6	23.5	21.5	23.1	28.2	33.7	32.7	47.7	47.8	47.8	2'816
N**	2'137	910	3'047	294	119	413	208	54	262	732	158	890	142	614	756	3'825	2'072	5'897	5'897
fehlende Angaben	475	215	690	52	14	66	33	6	39	102	23	125	59	187	246	774	476	1'250	1'250
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.7	1.1	1.5	4.1	3.9	4.1	2.5	5.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.8	1.3	1.7	37
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.4	4.7	4.5	74.1	75.0	74.3	13.6	33.3	17.2	3.7	7.7	4.4	0.0	0.9	0.8	14.5	12.2	13.7	306
weitere medikamentöse Suchtbeh.	6.9	8.0	7.3	8.3	9.2	8.6	4.9	0.0	4.0	4.5	11.5	5.6	0.0	0.9	0.8	6.6	6.9	6.7	149
ambulante Beratung	68.1	70.1	68.8	66.3	67.1	66.5	76.5	72.2	75.8	79.9	73.1	78.8	87.5	89.8	89.4	70.5	73.0	71.4	1'591
stationäre Therapie	50.3	59.6	53.2	44.0	42.1	43.5	40.7	38.9	40.4	18.7	30.8	20.6	12.5	13.0	12.9	44.5	47.1	45.4	1'011
Entzug	42.3	47.8	44.0	51.3	52.6	51.7	46.9	33.3	44.4	16.4	23.1	17.5	8.3	8.3	8.3	40.1	38.1	39.4	879
Selbsthilfegruppe	5.8	7.4	6.3	2.6	2.6	2.6	3.7	0.0	3.0	1.5	7.7	2.5	4.2	0.9	1.5	4.6	5.6	4.9	110
andere	2.7	1.8	2.4	1.6	0.0	1.1	1.2	5.6	2.0	5.2	3.8	5.0	12.5	6.5	7.6	2.9	3.0	3.0	66
N**	967	448	1'415	193	76	269	81	18	99	134	26	160	24	108	132	1'473	756	2'229	2'229
fehlende Angaben	197	83	280	49	24	73	26	5	31	38	8	46	16	99	115	353	234	587	587

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitutionsbehandlung*																
nein	97.9	97.2	97.6	48.6	46.0	47.8	91.8	87.5	91.0	99.7	98.6	99.5	93.9	93.1	93.7	4'051
ja	2.1	2.8	2.4	51.4	54.0	52.2	8.2	12.5	9.0	0.3	1.4	0.5	6.1	6.9	6.3	274
N**	1'771	775	2'546	243	100	343	170	40	210	623	148	771	3'076	1'249	4'325	4'325
fehlende Angaben	841	350	1'191	103	33	136	71	20	91	211	33	244	1'322	498	1'820	1'820
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	5.4	0.0	3.6	1.6	1.9	1.7	7.1	20.0	10.5	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	2.6	7
Methadon	73.0	89.5	78.6	83.9	88.7	85.3	78.6	80.0	78.9	100.0	100.0	100.0	82.1	87.8	83.8	223
andere Opiate	13.5	10.5	12.5	13.7	7.5	11.9	14.3	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	13.0	8.5	11.7	31
andere Substanzen	8.1	0.0	5.4	0.8	1.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.2	1.9	5
N**	37	19	56	124	53	177	14	5	19	2	2	4	184	82	266	266
fehlende Angaben	1	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8
Andere parallele Behandlung*																
nein	92.1	88.6	91.1	86.4	77.9	84.1	84.0	95.2	85.8	93.6	88.0	92.8	91.7	88.3	90.8	2'353
ja	7.9	11.4	8.9	13.6	22.1	15.9	16.0	4.8	14.2	6.4	12.0	7.2	8.3	11.7	9.2	238
N**	1'168	483	1'651	177	68	245	106	21	127	299	50	349	1'896	695	2'591	2'591
fehlende Angaben	1'444	642	2'086	169	65	234	135	39	174	535	131	666	2'502	1'052	3'554	3'554
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	60.9	46.3	55.3	65.2	71.4	67.6	41.2	100.0	44.4	52.6	50.0	52.0	57.6	53.2	56.1	129
stationäre Therapie	12.6	13.0	12.8	13.0	7.1	10.8	17.6	0.0	16.7	5.3	0.0	4.0	11.9	11.4	11.7	27
Selbsthilfegruppe	6.9	3.7	5.7	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	4.6	2.5	3.9	9
anderes	25.3	38.9	30.5	21.7	21.4	21.6	41.2	0.0	38.9	42.1	50.0	44.0	29.8	34.2	31.3	72
N**	87	54	141	23	14	37	17	1	18	19	6	25	151	79	230	230
fehlende Angaben	5	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	77.9	76.0	77.3	86.2	89.2	87.0	86.2	81.0	85.4	96.5	94.3	96.2	82.7	80.4	82.1	2'213
Entzug in der gleichen Institution	0.7	1.4	0.9	1.6	0.0	1.1	0.9	4.8	1.5	0.9	1.9	1.1	0.8	1.4	1.0	26
Entzug in einer anderen Institution	21.5	22.6	21.8	12.2	10.8	11.8	12.9	14.3	13.1	2.5	3.8	2.7	16.5	18.3	17.0	457
N**	1'201	517	1'718	188	74	262	116	21	137	317	53	370	1'957	739	2'696	2'696
fehlende Angaben	1'411	608	2'019	158	59	217	125	39	164	517	128	645	2'441	1'008	3'449	3'449

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2011)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
nie	64.5	58.6	62.8	15.4	28.6	18.5	52.3	75.0	55.8	68.0	67.7	68.0	60.1	59.2	59.9	802
einmal	8.6	7.8	8.4	11.0	3.6	9.2	9.2	8.3	9.1	14.9	9.7	14.2	10.0	7.9	9.5	127
zwei oder dreimal	9.0	12.3	9.9	13.2	17.9	14.3	12.3	8.3	11.7	8.2	12.9	8.9	9.2	11.7	9.9	132
mehr als dreimal	17.9	21.3	18.9	60.4	50.0	58.0	26.2	8.3	23.4	8.8	9.7	8.9	20.7	21.3	20.8	279
N**	591	244	835	91	28	119	65	12	77	194	31	225	997	343	1'340	1'340
fehlende Angaben	2'021	881	2'902	255	105	360	176	48	224	640	150	790	3'401	1'404	4'805	4'805

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2011)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	59.4	64.4	60.8	3'737	Alkohol	59.4	64.4	60.8	3'737
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.3	0.3	16	Cocktail	0.3	0.3	0.3	16
Heroin	6.0	6.2	6.1	374	Opiate	7.6	7.3	7.5	463
Methadon	1.2	0.9	1.1	68					
andere Opiate	0.4	0.3	0.3	21					
Kokain	5.5	3.4	4.9	301	Kokain und Derivate	5.5	3.4	4.9	301
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0					
Amphetamine	0.5	1.0	0.7	40	Stimulantien	0.8	1.5	1.0	62
MDMA und verwandte Stoffe	0.3	0.6	0.3	21					
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	1					
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0	Medikamente	0.6	1.2	0.8	49
Benzodiazepine	0.6	1.0	0.7	42					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.2	0.1	7					
LSD	0.0	0.0	0.0	2	Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	3
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1					
Cannabis	19.0	10.4	16.5	1'015	Cannabis	19.0	10.4	16.5	1'015
Tabak	1.8	4.1	2.5	152	Tabak	1.8	4.1	2.5	152
flüchtige Stoffe	0.1	0.1	0.1	4	andere Substanzen	1.0	0.9	1.0	59
andere Substanz	0.9	0.8	0.9	55					
pathologisches Spielen	1.9	0.9	1.6	101	suchtähnliche Verhaltensweisen	4.0	6.5	4.7	288
Essstörungen	0.1	3.5	1.1	68					
anderes suchtähnliches Problem	1.9	2.0	1.9	119					
N**	4'398	1'747	6'145	6'145	4'398	1'747	6'145	6'145	6'145
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	30.2	50.0	26.3	41.3	26.1	40.0	100.0	26.0	6.0	60.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	0.0	12.9	20.0	26.1	0.0	0.0	21.4	1.5	20.0
2-3 Tage pro Woche	13.5	12.5	6.9	18.1	21.7	0.0	0.0	18.2	3.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	10.7	0.0	9.2	9.0	4.3	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0
einmal täglich	8.7	25.0	21.2	3.2	0.0	5.0	0.0	7.1	6.0	0.0
mehrmals täglich	28.7	12.5	23.5	8.4	21.7	55.0	0.0	20.0	83.6	20.0
N**	1'660	8	217	155	23	20	2	631	67	5
fehlende Angaben	952	3	118	86	12	8	1	203	13	39
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	8.2	28.6	13.1	11.9	12.5	9.1	0.0	6.9	0.0	12.5
1 Tag pro Woche oder weniger	8.0	14.3	10.7	27.7	25.0	9.1	100.0	25.8	1.4	16.7
2-3 Tage pro Woche	15.9	14.3	10.3	27.7	29.2	9.1	0.0	18.3	4.2	8.3
4-6 Tage pro Woche	13.2	14.3	12.1	15.7	4.2	0.0	0.0	10.9	1.4	4.2
einmal täglich	12.3	14.3	25.2	4.4	0.0	18.2	0.0	9.3	5.6	8.3
mehrmals täglich	42.4	14.3	28.5	12.6	29.2	54.5	0.0	28.8	87.5	50.0
N**	1'663	7	214	159	24	22	1	605	72	24
fehlende Angaben	949	4	121	82	11	6	2	229	8	20

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	49.1	0.0	16.1
1 Tag pro Woche oder weniger	18.9	20.0	7.1
2-3 Tage pro Woche	7.5	20.0	12.5
4-6 Tage pro Woche	9.4	40.0	1.8
einmal täglich	5.7	0.0	21.4
mehrmals täglich	9.4	20.0	41.1
N**	53	5	56
fehlende Angaben	32	1	28
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	12.8	0.0	7.0
1 Tag pro Woche oder weniger	30.8	0.0	5.3
2-3 Tage pro Woche	12.8	25.0	8.8
4-6 Tage pro Woche	20.5	50.0	7.0
einmal täglich	12.8	0.0	21.1
mehrmals täglich	10.3	25.0	50.9
N**	39	4	57
fehlende Angaben	46	2	27

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	24.4	20.0	22.0	20.0	21.4	37.5	.	28.5	1.5	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	10.7	60.0	14.3	20.0	28.6	6.3	.	23.4	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.0	0.0	11.0	25.7	50.0	0.0	.	12.4	1.5	40.0
4-6 Tage pro Woche	14.0	0.0	8.8	14.3	0.0	0.0	.	7.3	3.0	20.0
einmal täglich	7.9	0.0	17.6	8.6	0.0	12.5	.	5.8	4.5	20.0
mehrmals täglich	29.0	20.0	26.4	11.4	0.0	43.8	.	22.6	89.6	20.0
N**	721	5	91	35	14	16	0	137	67	5
fehlende Angaben	404	0	37	25	13	5	0	44	5	10
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	6.1	0.0	10.5	8.1	0.0	6.7	.	3.0	3.0	9.1
1 Tag pro Woche oder weniger	9.0	25.0	14.0	18.9	31.3	13.3	.	32.6	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.6	50.0	14.0	29.7	50.0	0.0	.	15.6	1.5	27.3
4-6 Tage pro Woche	16.4	0.0	11.6	16.2	6.3	0.0	.	8.1	1.5	9.1
einmal täglich	11.4	0.0	19.8	10.8	6.3	6.7	.	7.4	4.5	27.3
mehrmals täglich	42.6	25.0	30.2	16.2	6.3	73.3	.	33.3	89.4	27.3
N**	721	4	86	37	16	15	0	135	66	11
fehlende Angaben	404	1	42	23	11	6	0	46	6	4

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	70.0	5.0	15.0
1 Tag pro Woche oder weniger	10.0	2.5	20.0
2-3 Tage pro Woche	10.0	7.5	20.0
4-6 Tage pro Woche	10.0	10.0	0.0
einmal täglich	0.0	7.5	5.0
mehrmals täglich	0.0	67.5	40.0
N**	10	40	20
fehlende Angaben	6	22	15
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	57.1	2.6	10.0
1 Tag pro Woche oder weniger	14.3	5.1	20.0
2-3 Tage pro Woche	14.3	5.1	15.0
4-6 Tage pro Woche	14.3	12.8	5.0
einmal täglich	0.0	5.1	5.0
mehrmals täglich	0.0	69.2	45.0
N**	7	39	20
fehlende Angaben	9	23	15

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	28.4	38.5	25.0	37.4	24.3	38.9	100.0	26.4	3.7	30.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.0	23.1	13.3	20.0	27.0	2.8	0.0	21.7	0.7	10.0
2-3 Tage pro Woche	13.6	7.7	8.1	19.5	32.4	0.0	0.0	17.2	2.2	20.0
4-6 Tage pro Woche	11.7	0.0	9.1	10.0	2.7	0.0	0.0	7.3	1.5	10.0
einmal täglich	8.4	15.4	20.1	4.2	0.0	8.3	0.0	6.9	5.2	10.0
mehrmals täglich	28.8	15.4	24.4	8.9	13.5	50.0	0.0	20.4	86.6	20.0
N**	2'381	13	308	190	37	36	2	768	134	10
fehlende Angaben	1'356	3	155	111	25	13	1	247	18	49
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.6	18.2	12.3	11.2	7.5	8.1	0.0	6.2	1.4	11.4
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	18.2	11.7	26.0	27.5	10.8	100.0	27.0	0.7	11.4
2-3 Tage pro Woche	15.5	27.3	11.3	28.1	37.5	5.4	0.0	17.8	2.9	14.3
4-6 Tage pro Woche	14.2	9.1	12.0	15.8	5.0	0.0	0.0	10.4	1.4	5.7
einmal täglich	12.0	9.1	23.7	5.6	2.5	13.5	0.0	8.9	5.1	14.3
mehrmals täglich	42.4	18.2	29.0	13.3	20.0	62.2	0.0	29.6	88.4	42.9
N**	2'384	11	300	196	40	37	1	740	138	35
fehlende Angaben	1'353	5	163	105	22	12	2	275	14	24

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2011), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	52.4	4.4	15.8
1 Tag pro Woche oder weniger	17.5	4.4	10.5
2-3 Tage pro Woche	7.9	8.9	14.5
4-6 Tage pro Woche	9.5	13.3	1.3
einmal täglich	4.8	6.7	17.1
mehrmals täglich	7.9	62.2	40.8
N**	63	45	76
fehlende Angaben	38	23	43
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	19.6	2.3	7.8
1 Tag pro Woche oder weniger	28.3	4.7	9.1
2-3 Tage pro Woche	13.0	7.0	10.4
4-6 Tage pro Woche	19.6	16.3	6.5
einmal täglich	10.9	4.7	16.9
mehrmals täglich	8.7	65.1	49.4
N**	46	43	77
fehlende Angaben	55	25	42

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.0	21.1	21.2	21.5	20.1	29.9	18.0	14.7	15.4	21.1
Standardabweichung	3.5	11.5	5.9	6.2	5.6	14.2	.	2.0	2.9	8.4
1. Quartil	14.0	14.0	17.0	18.0	16.0	18.0	18.0	14.0	13.0	15.0
Medianwert	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	27.5	18.0	15.0	15.5	18.0
3. Quartil	17.0	23.0	24.0	24.0	23.0	39.0	18.0	16.0	17.0	29.0
N*	1'021	7	190	136	21	14	1	639	40	15
fehlende Angaben	1'591	4	145	105	14	14	2	195	40	29
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.6	24.6	22.2	23.6	20.8	33.2	.	15.9	17.6	20.0
Standardabweichung	8.4	12.8	6.4	6.6	5.5	13.4	.	2.7	4.1	7.1
1. Quartil	17.0	18.0	18.0	19.0	18.0	25.0	.	15.0	14.0	17.0
Medianwert	20.0	20.0	20.0	22.0	18.0	30.0	.	15.0	16.5	18.0
3. Quartil	25.0	26.0	25.0	26.0	23.0	39.0	.	17.0	20.0	20.0
N*	1'043	5	178	125	17	13	0	528	42	10
fehlende Angaben	1'569	6	157	116	18	15	3	306	38	34
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.3	25.2	22.9	25.0	21.7	29.4	18.0	16.8	20.5	26.4
Standardabweichung	11.9	12.8	6.3	7.1	5.3	11.4	.	3.7	9.4	8.3
1. Quartil	23.0	18.0	18.0	20.0	18.0	19.5	18.0	15.0	15.0	18.0
Medianwert	30.0	21.0	21.0	24.0	21.0	26.0	18.0	16.0	18.0	28.0
3. Quartil	40.0	28.0	25.5	29.0	26.0	38.5	18.0	17.0	23.0	35.0
N*	881	5	144	130	19	8	1	515	43	7
fehlende Angaben	1'731	6	191	111	16	20	2	319	37	37
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.8	.	9.4	8.0	4.7	9.3	1.4	4.9	15.7	12.2
Standardabweichung	13.2	.	9.8	5.6	5.0	11.7	.	6.4	16.4	17.3
1. Quartil	14.1	.	2.8	3.3	0.8	2.3	1.4	1.4	2.9	2.9
Medianwert	24.3	.	5.3	6.6	3.1	7.2	1.4	2.7	9.2	4.5
3. Quartil	34.6	.	10.7	11.8	6.5	7.3	1.4	5.1	27.2	14.4
N*	466	0	37	75	13	5	1	482	28	8
fehlende Angaben	507	0	15	26	7	0	0	78	22	13

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	18.1	16.5	20.6	18.2	15.9	34.1	.	14.6	16.0	21.8
Standardabweichung	6.3	2.1	5.8	3.8	2.3	13.0	.	2.0	4.4	11.0
1. Quartil	15.0	15.0	16.0	16.0	14.0	28.0	.	13.0	13.0	16.0
Medianwert	16.5	16.5	19.0	17.0	16.0	33.5	.	14.0	15.5	18.0
3. Quartil	20.0	18.0	24.0	19.0	17.0	44.0	.	16.0	17.0	20.0
N*	392	2	80	33	15	10	0	138	42	5
fehlende Angaben	733	3	48	27	12	11	0	43	30	10
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	27.1	20.0	21.9	19.9	16.8	33.5	.	15.5	19.2	19.0
Standardabweichung	10.4	7.1	6.0	4.1	2.3	12.2	.	2.1	8.8	4.0
1. Quartil	19.0	15.0	18.0	18.0	15.0	28.0	.	14.0	14.0	18.0
Medianwert	25.0	20.0	20.0	19.0	17.0	33.0	.	15.0	17.0	18.0
3. Quartil	34.0	25.0	25.0	22.0	18.0	44.0	.	16.0	21.0	20.0
N*	427	2	69	29	15	10	0	110	43	5
fehlende Angaben	698	3	59	31	12	11	0	71	29	10
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	35.8	.	21.9	20.0	16.3	40.0	.	16.2	21.1	31.8
Standardabweichung	11.9	.	6.5	3.5	1.7	14.0	.	2.9	10.9	15.0
1. Quartil	26.0	.	17.0	17.0	15.0	30.0	.	15.0	14.0	19.0
Medianwert	36.0	.	20.0	20.0	16.5	44.0	.	16.0	17.0	30.5
3. Quartil	44.0	.	25.0	22.0	18.0	49.0	.	17.0	24.0	44.5
N*	423	0	58	31	12	7	0	121	44	4
fehlende Angaben	702	5	70	29	15	14	0	60	28	11
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.4	0.1	4.1	5.2	4.1	5.5	.	4.3	16.6	1.5
Standardabweichung	12.5	.	3.5	3.7	2.6	3.2	.	5.4	15.5	1.6
1. Quartil	15.9	0.1	0.8	2.7	1.9	3.5	.	1.2	2.6	0.3
Medianwert	25.5	0.1	3.0	4.7	3.1	6.4	.	2.4	13.1	1.5
3. Quartil	34.2	0.1	7.0	7.0	7.0	7.5	.	4.7	29.3	2.7
N*	162	1	15	19	10	4	0	106	29	2
fehlende Angaben	217	0	3	12	5	1	0	18	13	2

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2011), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.6	20.1	21.0	20.9	18.4	31.7	18.0	14.7	15.7	21.3
Standardabweichung	4.6	10.2	5.9	6.0	4.9	13.6	.	2.0	3.7	8.8
1. Quartil	15.0	15.0	17.0	17.0	15.0	18.5	18.0	14.0	13.0	15.5
Medianwert	16.0	17.0	20.0	19.0	16.0	30.0	18.0	15.0	15.5	18.0
3. Quartil	18.0	19.0	24.0	23.0	20.5	41.5	18.0	16.0	17.0	28.5
N*	1'413	9	270	169	36	24	1	777	82	20
fehlende Angaben	2'324	7	193	132	26	25	2	238	70	39
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.9	23.3	22.1	22.9	18.9	33.3	.	15.9	18.4	19.7
Standardabweichung	9.2	11.1	6.3	6.3	4.7	12.6	.	2.6	6.9	6.1
1. Quartil	18.0	15.0	18.0	18.0	16.0	25.0	.	14.0	14.0	17.0
Medianwert	20.0	20.0	20.0	21.0	18.0	31.0	.	15.0	17.0	18.0
3. Quartil	28.0	26.0	25.0	26.0	21.0	40.0	.	17.0	20.0	20.0
N*	1'470	7	247	154	32	23	0	638	85	15
fehlende Angaben	2'267	9	216	147	30	26	3	377	67	44
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	33.4	25.2	22.6	24.1	19.6	34.3	18.0	16.7	20.8	28.4
Standardabweichung	12.0	12.8	6.3	6.9	5.0	13.4	.	3.5	10.1	10.8
1. Quartil	24.0	18.0	18.0	18.0	17.0	21.0	18.0	15.0	15.0	18.0
Medianwert	30.5	21.0	20.0	23.0	18.0	35.0	18.0	16.0	17.0	28.0
3. Quartil	41.0	28.0	25.0	28.0	22.0	45.0	18.0	17.0	23.0	35.0
N*	1'304	5	202	161	31	15	1	636	87	11
fehlende Angaben	2'433	11	261	140	31	34	2	379	65	48
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.0	0.1	7.9	7.4	4.4	7.6	1.4	4.8	16.1	10.1
Standardabweichung	13.0	.	8.8	5.4	4.1	8.7	.	6.3	15.8	15.9
1. Quartil	14.8	0.1	2.3	3.3	1.4	2.3	1.4	1.4	2.6	2.4
Medianwert	24.4	0.1	5.1	6.3	3.1	6.7	1.4	2.7	10.9	3.5
3. Quartil	34.5	0.1	9.8	10.7	7.0	7.3	1.4	5.1	29.3	11.2
N*	628	1	52	94	23	9	1	588	57	10
fehlende Angaben	724	0	18	38	12	1	0	96	35	15

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	24.4	18.0	18.7
Standardabweichung	9.3	2.8	10.3
1. Quartil	20.0	16.0	13.0
Medianwert	23.0	18.0	14.0
3. Quartil	28.0	20.0	20.0
N*	27	2	25
fehlende Angaben	58	4	59
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	28.1	22.7	21.0
Standardabweichung	8.7	6.7	10.1
1. Quartil	24.0	17.0	14.0
Medianwert	27.0	21.0	17.5
3. Quartil	32.5	30.0	25.0
N*	28	3	34
fehlende Angaben	57	3	50
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	30.9	24.5	23.1
Standardabweichung	9.0	7.8	11.1
1. Quartil	27.0	19.0	15.0
Medianwert	30.0	24.5	19.0
3. Quartil	35.0	30.0	26.0
N*	30	2	36
fehlende Angaben	55	4	48
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	12.7	3.9	6.5
Standardabweichung	10.4	2.1	5.8
1. Quartil	4.5	2.4	2.2
Medianwert	7.7	3.9	4.1
3. Quartil	17.8	5.4	10.0
N*	26	2	25
fehlende Angaben	59	4	59

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	28.3	16.9	28.3
Standardabweichung	11.4	3.7	16.6
1. Quartil	21.0	15.0	16.5
Medianwert	24.0	17.0	24.5
3. Quartil	35.5	18.0	35.5
N*	4	31	12
fehlende Angaben	12	31	23
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	30.8	17.7	28.3
Standardabweichung	14.6	3.4	15.9
1. Quartil	29.0	16.0	19.0
Medianwert	33.0	17.0	25.0
3. Quartil	36.0	19.0	34.0
N*	5	31	13
fehlende Angaben	11	31	22
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	37.0	19.3	28.8
Standardabweichung	9.6	4.6	15.1
1. Quartil	30.0	17.0	20.0
Medianwert	33.0	18.5	26.5
3. Quartil	48.0	21.5	35.0
N*	3	36	14
fehlende Angaben	13	26	21
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	15.2	10.6	4.5
Standardabweichung	8.2	8.2	4.9
1. Quartil	10.0	3.3	1.6
Medianwert	14.8	9.3	3.0
3. Quartil	20.4	16.6	5.6
N*	4	31	12
fehlende Angaben	12	31	23

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2011), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	24.9	16.9	21.8
Standardabweichung	9.5	3.6	13.3
1. Quartil	20.0	15.0	13.0
Medianwert	23.0	17.0	16.0
3. Quartil	28.0	18.0	26.0
N*	31	33	37
fehlende Angaben	70	35	82
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	28.5	18.2	23.0
Standardabweichung	9.5	3.9	12.2
1. Quartil	24.0	16.0	14.0
Medianwert	28.0	17.0	18.0
3. Quartil	33.0	20.0	27.0
N*	33	34	47
fehlende Angaben	68	34	72
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	31.4	19.6	24.7
Standardabweichung	9.1	4.8	12.5
1. Quartil	27.0	17.0	15.0
Medianwert	30.0	19.0	21.0
3. Quartil	35.0	22.0	28.0
N*	33	38	50
fehlende Angaben	68	30	69
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	13.0	10.2	5.9
Standardabweichung	10.1	8.1	5.5
1. Quartil	5.0	3.3	1.9
Medianwert	9.6	9.3	4.0
3. Quartil	17.8	16.3	8.3
N*	30	33	37
fehlende Angaben	71	35	82

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2011)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	31.0	25.8	29.3	3.6	16.1	5.9	15.4	0.0	8.3	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	42.1	51.6	45.2	13.7	16.1	14.1	0.0	18.2	8.3	99.3	97.7	99.0	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	3.2	0.0	2.1	1.4	0.0	1.2	53.8	36.4	45.8	0.4	0.8	0.4	91.7	100.0	95.0
sniffen	23.8	22.6	23.4	81.3	67.7	78.8	30.8	45.5	37.5	0.4	0.0	0.3	8.3	0.0	5.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	126	62	188	139	31	170	13	11	24	543	133	676	12	8	20
fehlende Angaben	140	46	186	102	29	131	10	6	16	291	48	339	13	9	22

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	5.4	5.2	5.3	64.3	54.8	61.7	9.5	19.0	11.6	3.4	4.0	3.5	10.0	9.2	9.8	399
nie	94.6	94.8	94.7	35.7	45.2	38.3	90.5	81.0	88.4	96.6	96.0	96.5	90.0	90.8	90.2	3'691
N**	1'654	699	2'353	244	93	337	148	42	190	656	150	806	2'941	1'149	4'090	4'090
fehlende Angaben	958	426	1'384	102	40	142	93	18	111	178	31	209	1'457	598	2'055	2'055
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	0.9	0.3	0.7	34.9	28.2	33.0	7.4	11.9	8.4	2.1	2.0	2.1	4.1	3.0	3.8	154
nein	99.1	99.7	99.3	65.1	71.8	67.0	92.6	88.1	91.6	97.9	98.0	97.9	95.9	97.0	96.2	3'895
N**	1'646	703	2'349	215	85	300	148	42	190	657	148	805	2'906	1'143	4'049	4'049
fehlende Angaben	966	422	1'388	131	48	179	93	18	111	177	33	210	1'492	604	2'096	2'096
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.2	0.3	0.2	26.1	19.0	24.1	4.5	11.6	6.1	0.2	0.0	0.1	2.2	1.8	2.1	90
nein	99.8	99.7	99.8	73.9	81.0	75.9	95.5	88.4	93.9	99.8	100.0	99.9	97.8	98.2	97.9	4'164
N**	1'760	747	2'507	199	79	278	155	43	198	664	151	815	3'051	1'203	4'254	4'254
fehlende Angaben	852	378	1'230	147	54	201	86	17	103	170	30	200	1'347	544	1'891	1'891
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	0.0	0.0	0.0	12.5	20.0	13.8	0.0	100.0	28.6	0.0	0.0	0.0	7.4	25.0	10.3	10
nein	100.0	100.0	100.0	87.5	80.0	86.2	100.0	0.0	71.4	100.0	100.0	100.0	92.6	75.0	89.7	87
N**	10	1	11	48	10	58	5	2	7	14	3	17	81	16	97	97
fehlende Angaben	4	1	5	17	6	23	4	2	6	0	0	0	25	9	34	34
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	3.2	12.5	6.4	2.2	17.4	5.3	12.5	0.0	8.3	0.0	.	0.0	2.8	13.3	5.3	10
15-16	16.1	12.5	14.9	14.3	13.0	14.0	25.0	25.0	25.0	11.1	.	11.1	15.9	15.6	15.8	30
17-18	29.0	37.5	31.9	23.1	26.1	23.7	12.5	25.0	16.7	44.4	.	44.4	25.5	31.1	26.8	51
19-20	9.7	12.5	10.6	24.2	4.3	20.2	0.0	25.0	8.3	22.2	.	22.2	18.6	8.9	16.3	31
21-25	22.6	12.5	19.1	19.8	21.7	20.2	12.5	0.0	8.3	22.2	.	22.2	20.7	15.6	19.5	37
26-30	6.5	6.3	6.4	12.1	13.0	12.3	12.5	25.0	16.7	0.0	.	0.0	9.7	11.1	10.0	19
30-39	12.9	6.3	10.6	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	4.1	2.2	3.7	7
ab 40	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	2.6	25.0	0.0	16.7	0.0	.	0.0	2.8	2.2	2.6	5
N**	31	16	47	91	23	114	8	4	12	9	0	9	145	45	190	190
fehlende Angaben	58	20	78	66	28	94	6	4	10	13	6	19	148	61	209	209

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	55.6	32.4	42.4	23.3	30.4	50.0	23.4	10.2	44.8
Cocktail	0.4	-	6.2	0.5	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.3	22.2	3.9	8.2	6.7	30.4	50.0	0.9	0.0	6.9
Methadon	1.7	44.4	21.6	5.4	6.7	17.4	0.0	0.0	0.0	3.4
andere Opiate	0.4	0.0	2.7	1.1	0.0	0.0	50.0	0.3	0.0	3.4
Kokain	5.3	22.2	27.0	0.0	23.3	8.7	50.0	7.3	0.0	6.9
Crack, Freebase	0.2	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
Amphetamine	1.4	11.1	5.4	8.7	10.0	0.0	100.0	4.9	0.0	6.9
MDMA und verwandte Stoffe	1.1	11.1	4.2	11.4	3.3	0.0	50.0	4.8	0.0	3.4
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.8	1.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.4
Benzodiazepine	1.6	22.2	15.4	3.3	6.7	0.0	0.0	0.3	0.0	10.3
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.7	11.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
LSD	0.5	0.0	4.6	4.3	6.7	0.0	0.0	1.8	0.0	3.4
andere Halluzinogene	0.2	0.0	1.2	1.6	3.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	10.4	33.3	32.0	34.2	40.0	13.0	100.0	-	4.1	6.9
Tabak	29.4	44.4	35.1	38.6	30.0	13.0	0.0	38.4	-	13.8
andere Substanz	0.4	0.0	2.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	6.9
Essstörungen	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.7	6.1	0.0
kein weiteres Suchtproblem	59.4	0.0	23.9	22.8	26.7	43.5	0.0	43.0	79.6	27.6
N**	1'635	9	259	184	30	23	2	670	49	29
<i>fehlende Angaben</i>	977	2	76	57	5	5	1	164	31	15

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Frauen
Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	50.0	30.6	45.1	31.6	35.3	.	20.0	10.5	40.0
Cocktail	0.3	-	5.1	0.0	5.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Heroin	1.9	50.0	7.1	11.8	10.5	0.0	.	4.0	0.0	10.0
Methadon	1.4	0.0	26.5	3.9	0.0	5.9	.	1.3	0.0	10.0
andere Opiate	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Kokain	4.0	50.0	30.6	0.0	52.6	0.0	.	8.7	0.0	20.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.0	0.0	5.3	0.0	.	0.7	0.0	0.0
Amphetamine	0.9	25.0	4.1	17.6	26.3	0.0	.	6.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.4	25.0	3.1	21.6	26.3	0.0	.	8.7	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	1.0	2.0	5.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.7	25.0	18.4	7.8	5.3	0.0	.	1.3	1.8	10.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.7	0.0	2.0	3.9	0.0	0.0	.	0.0	0.0	10.0
LSD	0.1	25.0	3.1	13.7	31.6	0.0	.	6.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	25.0	0.0	9.8	15.8	0.0	.	0.7	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	.	0.7	1.8	0.0
Cannabis	6.8	25.0	38.8	33.3	57.9	11.8	.	-	7.0	10.0
Tabak	28.9	25.0	32.7	37.3	31.6	17.6	.	44.0	-	20.0
andere Substanz	0.4	0.0	2.0	3.9	0.0	5.9	.	0.7	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
Essstörungen	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	.	1.3	1.8	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	3.5	0.0
kein weiteres Suchtproblem	61.3	25.0	19.4	19.6	5.3	29.4	.	36.7	75.4	50.0
N**	702	4	98	51	19	17	0	150	57	10
<i>fehlende Angaben</i>	423	1	30	9	8	4	0	31	15	5

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	53.8	31.9	43.0	26.5	32.5	50.0	22.8	10.4	43.6
Cocktail	0.4	-	5.9	0.4	2.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.2	30.8	4.8	8.9	8.2	17.5	50.0	1.5	0.0	7.7
Methadon	1.6	30.8	23.0	5.1	4.1	12.5	0.0	0.2	0.0	5.1
andere Opiate	0.4	0.0	2.5	0.9	0.0	0.0	50.0	0.2	0.0	2.6
Kokain	4.9	30.8	28.0	0.0	34.7	5.0	50.0	7.6	0.0	10.3
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.8	0.4	2.0	0.0	50.0	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	1.2	15.4	5.0	10.6	16.3	0.0	100.0	5.1	0.0	5.1
MDMA und verwandte Stoffe	0.9	15.4	3.9	13.6	12.2	0.0	50.0	5.5	0.0	2.6
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.6	0.4	4.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.6	0.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6
Benzodiazepine	2.2	23.1	16.2	4.3	6.1	0.0	0.0	0.5	0.9	10.3
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.0	7.7	1.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
LSD	0.4	7.7	4.2	6.4	16.3	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
andere Halluzinogene	0.2	7.7	0.8	3.4	8.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
Cannabis	9.3	30.8	33.9	34.0	46.9	12.5	100.0	-	5.7	7.7
Tabak	29.3	38.5	34.5	38.3	30.6	15.0	0.0	39.4	-	15.4
andere Substanz	0.4	0.0	2.5	1.7	0.0	2.5	0.0	0.6	0.0	0.0
pathologisches Spielen	0.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	5.1
Essstörungen	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.3	0.0	0.6	0.0	2.0	0.0	0.0	0.6	4.7	0.0
kein weiteres Suchtproblem	59.9	7.7	22.7	22.1	18.4	37.5	0.0	41.8	77.4	33.3
N**	2'337	13	357	235	49	40	2	820	106	39
fehlende Angaben	1'400	3	106	66	13	9	1	195	46	20

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	9.3	0.0	6.6
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	1.6
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.9	20.0	3.3
Tabak	13.0	20.0	4.9
andere Substanz	3.7	0.0	1.6
pathologisches Spielen	-	0.0	1.6
Essstörungen	0.0	-	0.0
anderes suchtähnliches Problem	1.9	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	75.9	80.0	86.9
N**	54	5	61
<i>fehlende Angaben</i>	31	1	23

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Frauen
Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	10.0	2.5	18.2
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	2.5	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	2.5	0.0
Tabak	0.0	2.5	4.5
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	-	4.5
anderes suchtähnliches Problem	0.0	5.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	90.0	87.5	77.3
N**	10	40	22
<i>fehlende Angaben</i>	6	22	13

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2011), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	9.4	2.2	9.6
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	2.2	1.2
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.6	4.4	2.4
Tabak	10.9	4.4	4.8
andere Substanz	3.1	0.0	1.2
pathologisches Spielen	-	0.0	1.2
Essstörungen	0.0	-	1.2
anderes suchtähnliches Problem	1.6	4.4	0.0
kein weiteres Suchtproblem	78.1	86.7	84.3
N**	64	45	83
<i>fehlende Angaben</i>	37	23	36

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	10.1	11.3	10.5	9.9	11.8	10.4	6.7	4.0	6.3	11.5	15.7	12.3	11.3	13.5	11.9	441
1-mal pro Monat oder weniger	3.3	4.6	3.7	19.3	16.2	18.5	10.4	20.0	11.9	19.4	28.9	21.1	9.0	10.1	9.3	343
2-4-mal pro Monat	7.9	6.6	7.5	19.9	27.9	22.1	22.4	32.0	23.9	43.2	38.0	42.3	17.1	13.8	16.2	599
2-3-mal pro Woche	16.4	15.4	16.1	19.9	32.4	23.3	36.6	28.0	35.2	18.6	10.7	17.2	18.2	16.5	17.7	655
4-mal oder mehr pro Woche	62.3	62.1	62.2	30.9	11.8	25.7	23.9	16.0	22.6	7.3	6.6	7.2	44.4	46.1	44.9	1'660
N**	1'667	710	2'377	181	68	249	134	25	159	532	121	653	2'677	1'021	3'698	3'698
fehlende Angaben	945	415	1'360	165	65	230	107	35	142	302	60	362	1'721	726	2'447	2'447
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.9	7.6	7.8	50.7	52.5	51.2	34.8	22.7	32.8	47.7	65.6	50.9	21.6	21.9	21.7	680
3 oder 4	18.4	18.9	18.6	27.7	29.5	28.2	43.5	45.5	43.8	34.3	24.7	32.6	23.8	20.9	23.0	722
5 oder 6	22.3	24.8	23.0	10.8	16.4	12.4	10.4	13.6	10.9	12.0	8.6	11.4	18.3	20.9	19.0	597
7 bis 9	20.5	23.5	21.4	4.7	1.6	3.8	5.2	9.1	5.8	3.2	1.1	2.8	14.7	17.4	15.5	485
10 oder mehr	30.8	25.2	29.2	6.1	0.0	4.3	6.1	9.1	6.6	2.8	0.0	2.3	21.5	18.8	20.8	652
N**	1'469	618	2'087	148	61	209	115	22	137	434	93	527	2'281	855	3'136	3'136
fehlende Angaben	1'143	507	1'650	198	72	270	126	38	164	400	88	488	2'117	892	3'009	3'009
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	11.9	14.6	12.7	35.9	47.6	39.4	28.6	27.3	28.4	44.7	61.5	48.0	22.7	27.4	24.0	800
weniger als 1-mal pro Monat	11.2	9.4	10.6	28.8	22.2	26.9	25.2	27.3	25.5	30.7	22.0	29.0	17.3	13.1	16.1	538
1-mal pro Monat	11.5	10.8	11.3	13.7	19.0	15.3	16.8	27.3	18.4	14.0	11.0	13.5	12.3	11.4	12.0	401
1-mal pro Woche	24.3	24.3	24.3	9.8	9.5	9.7	25.2	13.6	23.4	9.6	4.6	8.7	20.0	18.8	19.7	656
fast jeden Tag	41.2	40.8	41.1	11.8	1.6	8.8	4.2	4.5	4.3	0.9	0.9	0.9	27.7	29.2	28.1	938
N**	1'533	649	2'182	153	63	216	119	22	141	456	109	565	2'403	930	3'333	3'333
fehlende Angaben	1'079	476	1'555	193	70	263	122	38	160	378	72	450	1'995	817	2'812	2'812

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	31.1	35.9	32.6	2.7	3.6	3.0	10.7	13.8	11.3	16.6	14.5	16.2	24.0	28.7	25.3	704
1 Tag pro Woche oder weniger	1.2	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	2.8	3.4	2.9	1.6	1.0	1.4	39
2-3 Tage pro Woche	1.0	1.3	1.1	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	3.0	3.4	3.1	1.6	1.6	1.6	45
4-6 Tage pro Woche	0.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.7	0.5	0.6	17
einmal täglich	1.0	0.6	0.9	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	3.0	2.6	2.9	1.4	1.3	1.4	38
mehrmals täglich	65.0	60.9	63.7	95.9	96.4	96.1	86.8	86.2	86.7	73.5	76.1	74.0	70.8	66.9	69.7	1'938
N**	1'048	463	1'511	147	56	203	121	29	150	505	117	622	1'986	795	2'781	2'781
fehlende Angaben	1'564	662	2'226	199	77	276	120	31	151	329	64	393	2'412	952	3'364	3'364
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	15.3	19.5	16.5	12.0	14.6	12.7	20.8	14.3	19.7	50.1	46.2	49.4	25.9	25.2	25.7	480
11 bis 20	44.2	50.2	45.9	47.2	56.3	49.7	43.6	57.1	45.9	39.0	45.2	40.2	42.8	47.6	44.1	824
21 bis 30	28.9	24.9	27.8	30.4	20.8	27.7	21.8	23.8	22.1	7.8	7.5	7.7	22.3	22.0	22.3	416
31 und mehr	11.6	5.4	9.8	10.4	8.3	9.8	13.9	4.8	12.3	3.1	1.1	2.7	9.0	5.1	8.0	149
N**	640	257	897	125	48	173	101	21	122	387	93	480	1'361	508	1'869	1'869
fehlende Angaben	82	40	122	18	6	24	7	4	11	34	7	41	149	59	208	208

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	33.9	80.0	78.1	82.1	83.3	70.6	100.0	51.8	75.0	66.7
zeitlich begrenzte Abstinenz	24.0	20.0	3.1	5.3	8.3	5.9	0.0	7.9	0.0	4.2
kontrollierter Konsum	28.1	0.0	11.3	6.3	8.3	17.6	0.0	21.7	16.7	12.5
keine Beschränkung beabsichtigt	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.2
bis jetzt nicht festgelegt	11.0	0.0	3.8	6.3	0.0	5.9	0.0	15.0	8.3	8.3
anderes	0.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
N**	1'045	5	160	95	12	17	1	253	12	24
fehlende Angaben	1'567	6	175	146	23	11	2	581	68	20

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	36.6	100.0	80.6	55.6	87.5	36.4	.	55.0	75.0	37.5
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.9	0.0	1.6	5.6	0.0	0.0	.	12.5	0.0	12.5
kontrollierter Konsum	32.4	0.0	4.8	5.6	12.5	36.4	.	17.5	25.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.6	0.0	11.3	33.3	0.0	27.3	.	15.0	0.0	50.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
N**	429	2	62	18	8	11	0	40	8	8
fehlende Angaben	696	3	66	42	19	10	0	141	64	7

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2011), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	34.7	85.7	78.8	77.9	85.0	57.1	100.0	52.2	75.0	59.4
zeitlich begrenzte Abstinenz	22.3	14.3	2.7	5.3	5.0	3.6	0.0	8.5	0.0	6.3
kontrollierter Konsum	29.4	0.0	9.5	6.2	10.0	25.0	0.0	21.2	20.0	9.4
keine Beschränkung beabsichtigt	1.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
bis jetzt nicht festgelegt	11.5	0.0	5.9	10.6	0.0	14.3	0.0	15.0	5.0	18.8
anderes	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
N**	1'474	7	222	113	20	28	1	293	20	32
fehlende Angaben	2'263	9	241	188	42	21	2	722	132	27

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23a Psychische Probleme im Leben (2011), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	32.1	50.0	41.9	24.7	45.5	57.1	100.0	16.7	33.3	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	24.1	25.0	43.4	32.5	27.3	71.4	0.0	17.6	33.3	50.0
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	11.5	25.0	19.9	15.6	18.2	28.6	0.0	15.0	0.0	29.2
Halluzinationen	3.1	0.0	9.6	6.5	0.0	14.3	0.0	4.0	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	13.6	0.0	19.9	9.1	0.0	35.7	100.0	15.9	0.0	29.2
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	11.6	25.0	16.9	18.2	18.2	14.3	100.0	10.1	0.0	4.2
ernsthafte Selbstmordgedanken	14.8	25.0	20.6	11.7	0.0	35.7	100.0	11.0	0.0	12.5
Selbstmordversuche	7.0	25.0	14.0	7.8	0.0	21.4	100.0	3.5	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.2	0.0	1.5	7.8	0.0	0.0	0.0	0.9	33.3	0.0
keine	41.0	50.0	28.7	37.7	36.4	7.1	0.0	51.5	33.3	25.0
N**	817	4	136	77	11	14	1	227	3	24
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'795</i>	<i>7</i>	<i>199</i>	<i>164</i>	<i>24</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>607</i>	<i>77</i>	<i>20</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23b Psychische Probleme im Leben (2011), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	51.4	66.7	36.5	25.0	33.3	90.0	.	32.5	40.0	66.7
schwere Angst- und Spannungszustände	36.7	33.3	42.3	50.0	33.3	70.0	.	35.0	20.0	66.7
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	15.9	0.0	17.3	18.8	16.7	30.0	.	22.5	0.0	33.3
Halluzinationen	3.5	0.0	0.0	12.5	16.7	10.0	.	7.5	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	9.2	0.0	7.7	25.0	16.7	20.0	.	10.0	0.0	16.7
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	25.1	33.3	26.9	43.8	16.7	20.0	.	20.0	40.0	16.7
ernsthafte Selbstmordgedanken	19.1	66.7	26.9	31.3	50.0	50.0	.	17.5	20.0	50.0
Selbstmordversuche	11.8	0.0	19.2	12.5	33.3	0.0	.	10.0	0.0	50.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	5.0	0.0	0.0
keine	19.9	0.0	26.9	31.3	16.7	0.0	.	35.0	40.0	16.7
N**	346	3	52	16	6	10	0	40	5	6
<i>fehlende Angaben</i>	<i>779</i>	<i>2</i>	<i>76</i>	<i>44</i>	<i>21</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>67</i>	<i>9</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23c Psychische Probleme im Leben (2011), Männer & Frauen
Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	37.8	57.1	40.4	24.7	41.2	70.8	100.0	19.1	37.5	40.0
schwere Angst- und Spannungszustände	27.9	28.6	43.1	35.5	29.4	70.8	0.0	20.2	25.0	53.3
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	12.8	14.3	19.1	16.1	17.6	29.2	0.0	16.1	0.0	30.0
Halluzinationen	3.2	0.0	6.9	7.5	5.9	12.5	0.0	4.5	0.0	0.0
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	12.3	0.0	16.5	11.8	5.9	29.2	100.0	15.0	0.0	26.7
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	15.6	28.6	19.7	22.6	17.6	16.7	100.0	11.6	25.0	6.7
ernsthafte Selbstmordgedanken	16.1	42.9	22.3	15.1	17.6	41.7	100.0	12.0	12.5	20.0
Selbstmordversuche	8.4	14.3	15.4	8.6	11.8	12.5	100.0	4.5	0.0	10.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.6	0.0	1.6	6.5	0.0	0.0	0.0	1.5	12.5	0.0
keine	34.7	28.6	28.2	36.6	29.4	4.2	0.0	49.1	37.5	23.3
N**	1'163	7	188	93	17	24	1	267	8	30
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'574</i>	<i>9</i>	<i>275</i>	<i>208</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>748</i>	<i>144</i>	<i>29</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2011)

	Angehörige			N
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	34.4	27.9	29.2	285
Tochter/Sohn	21.5	14.3	15.8	154
Schwester/Bruder	4.1	5.1	4.9	48
Ehe-/LebenspartnerIn	31.8	45.7	42.9	419
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	0.5	2.2	1.8	18
KollegIn/FreundIn	2.6	2.4	2.5	24
ArbeitgeberIn/LehrerIn	2.1	0.9	1.1	11
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.1	0.1	1
anderes	3.1	1.4	1.7	17
N**	195	782	977	977
<i>fehlende Angaben</i>	6	19	25	25

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2011)

Angehörige					
Total			Total		
	%	N		%	N
Hauptproblem der Drittperson*			Weitere Probleme der Drittperson***		
Alkohol	65.1	637	Alkohol	31.5	118
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.6	6	Cocktail (Heroin und Kokain)	0.0	0
Heroin	2.7	26	Heroin	2.7	10
Methadon	0.2	2	Methadon	2.9	11
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.1	1	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.3	1
Kokain	2.9	28	Kokain	5.9	22
Crack, Freebase	0.0	0	Crack, Freebase	0.0	0
Amphetamine	0.2	2	Amphetamine	2.1	8
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	5	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.1	8
andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0	andere Stimulantien (z B Khat)	0.5	2
Barbiturate	1.8	18	Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.2	2	Benzodiazepine	4.0	15
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.9	7
LSD	0.0	0	LSD	1.6	6
andere Halluzinogene	1.0	10	andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.2	2	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0
Cannabis	11.8	115	Cannabis	18.9	71
Tabak	1.4	14	Tabak	19.5	73
andere Substanz	0.3	3	andere Substanz	0.8	3
pathologisches Spielen	2.0	20	pathologisches Spielen	3.5	13
Essstörungen	2.7	26	Essstörungen	1.3	5
anderes suchtmähnliches Problem	6.2	61	anderes suchtmähnliches Problem	6.4	24
			keine	26.7	100
N**	978	978	N**	375	375
<i>fehlende Angaben</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>fehlende Angaben</i>	<i>625</i>	<i>625</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2011)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Eigene Probleme*				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	7.8	12.1	11.4	42
eigene suchtähnliche Probleme	0.0	0.7	0.5	2
eigene somatische Probleme	1.6	2.6	2.4	9
eigene psychische Probleme	20.3	32.0	30.0	111
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	21.9	42.8	39.2	145
Familienprobleme	57.8	51.6	52.7	195
finanzielle Probleme	3.1	7.5	6.8	25
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	6.3	3.6	4.1	15
Wohnprobleme	6.3	6.5	6.5	24
Gewaltprobleme (als Opfer)	7.8	6.5	6.8	25
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	3.1	0.3	0.8	3
rechtliche Probleme	3.1	2.0	2.2	8
anderes	1.6	1.3	1.4	5
keine	29.7	13.4	16.2	60
N**	64	306	370	370
<i>fehlende Angaben</i>	137	495	632	632

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.9			74.0			82.2			83.8			19.5			64.6	4'407
Frauen			29.1			26.0			17.8			16.2			80.5			35.4	2'410
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'589	1'063	3'652	355	125	480	222	48	270	735	142	877	200	826	1'026	4'407	2'410	6'817	6'817
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	5.4	1.5	0.4	0.6	1.3	0.7	1.1	73
15-19	1.9	1.9	1.9	2.5	8.8	4.2	2.7	12.5	4.4	56.3	60.6	57.0	6.1	2.9	3.5	12.1	7.5	10.5	712
20-24	4.0	2.3	3.5	8.5	21.6	11.9	9.5	33.3	13.7	14.1	12.7	13.9	4.6	4.9	4.8	6.8	6.5	6.7	456
25-29	7.3	5.5	6.7	17.5	17.6	17.5	29.7	29.2	29.6	10.7	9.2	10.5	5.6	4.9	5.0	10.0	6.9	8.9	604
30-34	9.9	5.4	8.6	16.1	22.4	17.7	23.4	14.6	21.9	6.3	2.1	5.6	7.1	7.8	7.7	10.4	7.2	9.3	629
35-39	10.1	8.9	9.8	20.8	12.0	18.5	15.8	0.0	13.0	2.4	2.8	2.5	6.6	9.0	8.6	9.7	8.6	9.3	635
40-44	13.8	14.0	13.9	18.9	9.6	16.5	12.2	4.2	10.7	2.4	2.1	2.4	12.2	12.8	12.7	12.0	12.1	12.0	817
45-49	13.8	16.2	14.5	8.7	5.6	7.9	4.5	6.3	4.8	1.8	2.8	1.9	12.2	19.8	18.3	10.7	15.6	12.4	845
50-54	13.9	15.2	14.3	5.9	1.6	4.8	2.3	0.0	1.9	0.3	0.0	0.2	11.7	15.4	14.7	9.8	12.7	10.9	739
55-59	11.6	12.0	11.7	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	12.8	8.9	9.6	7.7	8.9	8.2	555
60-64	7.0	8.5	7.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.5	5.4	4.6	5.9	5.1	344
65-69	3.8	6.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	3.9	4.4	2.7	4.2	3.2	218
70 -74	2.1	2.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.7	3.0	1.5	2.1	1.7	117
75 und mehr	0.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	3.6	1.2	1.7	0.7	1.0	0.8	55
N**	2'584	1'063	3'647	355	125	480	222	48	270	735	142	877	196	820	1'016	4'396	2'403	6'799	6'799
fehlende Angaben	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	11	7	18	18
Alter																			
Mittelwert	45.7	48.2	46.4	36.1	31.0	34.8	32.8	27.3	31.8	21.9	21.4	21.8	46.4	45.8	46.0	39.6	43.5	41.0	
Standardabweichung	13.0	12.8	13.0	8.9	8.9	9.2	7.6	7.6	7.9	8.4	8.3	8.4	16.2	13.3	13.9	15.1	14.8	15.1	
1. Quartil	35.9	40.5	37.0	29.1	24.1	27.5	27.2	22.2	26.6	16.9	16.7	16.9	34.8	37.1	36.4	27.5	32.7	28.9	
Medianwert	46.1	48.7	46.9	36.6	30.7	34.5	31.6	26.6	30.5	18.3	18.0	18.2	47.6	46.5	46.6	39.7	45.2	41.8	
3. Quartil	55.1	57.0	55.8	42.5	36.7	41.5	37.7	30.1	37.0	24.5	23.0	24.2	57.8	54.0	54.5	51.1	53.8	52.1	
N**	2'584	1'063	3'647	355	125	480	222	48	270	735	142	877	196	820	1'016	4'396	2'403	6'799	
fehlende Angaben	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	11	7	18	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	41.2	29.3	37.7	74.0	68.5	72.5	66.3	82.9	69.2	94.3	93.9	94.2	24.7	24.5	24.6	54.4	37.2	48.2	2'934
verheiratet	30.6	32.9	31.3	12.9	10.8	12.3	19.2	2.4	16.2	3.4	3.0	3.3	61.5	51.3	53.3	25.4	34.5	28.7	1'744
getrennt	5.9	5.2	5.7	2.9	5.4	3.6	3.6	4.9	3.8	0.3	0.0	0.3	3.3	4.2	4.0	4.3	4.6	4.4	267
geschieden	20.2	27.2	22.2	10.3	9.0	10.0	7.8	7.3	7.7	2.0	3.0	2.2	7.1	16.0	14.3	14.5	19.4	16.2	988
verwitwet	1.4	4.6	2.3	0.0	2.7	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	3.3	3.0	0.9	3.5	1.8	112
reg. Partnerschaft	0.7	0.8	0.7	0.0	3.6	0.9	2.6	2.4	2.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	42
N**	2'289	949	3'238	311	111	422	193	41	234	649	132	781	182	758	940	3'903	2'184	6'087	6'087
fehlende Angaben	300	114	414	44	14	58	29	7	36	86	10	96	18	68	86	504	226	730	730
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	4.6	6.4	5.1	2.7	0.0	2.0	1.4	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	5.2	5.9	5.8	3.4	4.8	3.9	253
Umland der Grossstadtzentren	16.1	16.2	16.1	3.5	7.6	4.6	13.5	12.8	13.4	7.3	8.5	7.5	16.1	13.2	13.8	12.7	13.3	12.9	842
Mittelzentren	13.8	16.4	14.6	17.7	25.4	19.7	19.5	25.5	20.6	22.4	28.4	23.4	21.9	19.8	20.2	16.6	19.2	17.5	1'144
Kleinzentren	35.0	33.6	34.6	50.4	44.1	48.8	44.7	36.2	43.1	37.3	41.1	38.0	26.0	32.7	31.4	37.5	35.1	36.7	2'396
rural	30.4	27.4	29.6	25.7	22.9	24.9	20.9	25.5	21.8	32.6	22.0	30.8	30.7	28.3	28.8	29.8	27.6	29.0	1'895
N**	2'464	1'006	3'470	339	118	457	215	47	262	715	141	856	192	794	986	4'222	2'308	6'530	6'530
fehlende Angaben	125	57	182	16	7	23	7	1	8	20	1	21	8	32	40	185	102	287	287

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.2	35.5	38.1	44.4	33.8	41.6	43.8	34.5	42.0	14.3	8.3	13.3	15.7	15.5	15.6	33.1	26.2	30.6	1'314
mit Eltern/Elternteil	6.8	3.8	5.9	13.6	16.9	14.5	14.1	17.2	14.6	65.7	61.5	65.0	9.4	6.9	7.4	19.9	10.9	16.6	715
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	3.3	9.3	5.1	0.0	7.0	1.9	0.8	0.0	0.6	0.6	3.1	1.0	3.9	14.8	12.7	2.4	10.6	5.4	231
mit PartnerIn (ohne Kinder)	26.1	30.4	27.4	11.6	14.1	12.3	19.5	13.8	18.5	5.0	7.3	5.3	22.8	25.2	24.8	20.1	24.9	21.9	939
mit PartnerIn und Kind(ern)	16.7	16.0	16.5	11.6	14.1	12.3	14.8	13.8	14.6	2.2	1.0	2.0	41.7	35.7	36.9	14.9	21.4	17.3	742
mit anderen Verw./Angeh.	1.3	0.6	1.1	1.0	2.8	1.5	1.6	0.0	1.3	1.8	1.0	1.7	2.4	0.2	0.6	1.5	0.6	1.2	50
mit FreundInnen (WG)	2.0	1.2	1.7	2.5	0.0	1.9	0.8	10.3	2.5	2.0	2.1	2.0	0.8	0.7	0.8	1.9	1.6	1.8	76
anderes	4.7	3.2	4.3	15.2	11.3	14.1	4.7	10.3	5.7	8.5	15.6	9.7	3.1	0.9	1.4	6.2	3.8	5.4	230
N**	1'579	664	2'243	198	71	269	128	29	157	504	96	600	127	535	662	2'753	1'544	4'297	4'297
fehlende Angaben	1'010	399	1'409	157	54	211	94	19	113	231	46	277	73	291	364	1'654	866	2'520	2'520
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	93.5	94.2	93.7	77.3	89.0	80.2	88.6	75.8	86.1	91.4	90.0	91.2	97.8	98.4	98.3	91.8	94.8	92.9	4'342
instabile Wohnsituation	4.4	4.5	4.4	12.7	5.5	10.9	9.3	15.2	10.4	3.7	3.0	3.6	1.5	1.6	1.5	4.9	3.9	4.5	212
Institution	2.1	1.2	1.8	10.0	5.5	8.9	2.1	9.1	3.5	5.0	7.0	5.3	0.7	0.0	0.1	3.3	1.4	2.6	121
N**	1'748	727	2'475	220	73	293	140	33	173	545	100	645	136	579	715	3'015	1'660	4'675	4'675
fehlende Angaben	841	336	1'177	135	52	187	82	15	97	190	42	232	64	247	311	1'392	750	2'142	2'142
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	31.6	27.1	30.2	46.7	33.3	43.1	36.0	42.9	37.1	64.4	39.7	60.3	19.3	17.8	18.1	37.3	25.5	32.8	1'095
zeitweilige Beziehung(en)	3.5	6.1	4.3	8.0	3.7	6.9	10.8	4.8	9.8	7.3	20.6	9.5	0.9	1.9	1.7	4.6	5.1	4.8	161
feste Beziehung, getrennt lebend	10.2	10.7	10.4	12.0	22.2	14.7	12.6	14.3	12.9	16.2	28.6	18.3	6.4	13.7	12.3	11.0	13.7	12.0	401
feste Beziehung, zus. lebend	54.7	56.1	55.1	33.3	40.7	35.3	40.5	38.1	40.2	12.1	11.1	11.9	73.4	66.5	67.8	47.1	55.6	50.3	1'677
N**	1'246	560	1'806	150	54	204	111	21	132	315	63	378	109	466	575	2'068	1'266	3'334	3'334
fehlende Angaben	1'343	503	1'846	205	71	276	111	27	138	420	79	499	91	360	451	2'339	1'144	3'483	3'483

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	6.0	8.4	6.7	9.5	12.0	10.1	2.2	14.3	4.3	20.0	14.2	19.0	10.2	4.8	5.9	9.6	8.3	9.2	367
obligatorische Schule	13.4	14.3	13.6	29.4	42.7	32.8	17.8	32.1	20.2	53.2	64.2	55.1	11.1	12.1	11.9	23.1	20.5	22.2	890
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	2.6	5.2	3.3	3.2	4.0	3.4	1.5	0.0	1.2	1.9	7.5	2.9	2.8	4.6	4.2	2.5	4.7	3.2	130
Berufslehre, Berufsschule	59.1	52.2	57.1	50.7	33.3	46.3	65.9	42.9	62.0	20.6	10.4	18.8	40.7	52.3	50.0	49.1	46.2	48.1	1'929
Maturität-, Diplommittelschule	3.7	4.9	4.0	2.3	5.3	3.0	5.9	3.6	5.5	2.1	1.9	2.1	5.6	5.5	5.5	3.6	5.5	4.3	171
Lehrerseminar	0.7	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.9	4.1	3.7	0.5	2.4	1.2	47
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.7	5.7	6.4	1.8	2.7	2.0	4.4	0.0	3.7	1.7	0.9	1.6	16.7	6.6	8.6	5.9	5.2	5.7	227
höhere Fachschule	1.6	1.2	1.5	0.5	0.0	0.3	0.7	7.1	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.4	1.6	1.1	1.2	1.1	46
Fachhochschule	2.0	1.7	1.9	0.5	0.0	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.9	0.3	1.9	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	59
Universität, Hochschule	4.2	3.9	4.1	2.3	0.0	1.7	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	6.5	6.8	6.8	3.1	4.5	3.6	144
N**	1'472	594	2'066	221	75	296	135	28	163	515	106	621	108	438	546	2'641	1'369	4'010	4'010
fehlende Angaben	1'117	469	1'586	134	50	184	87	20	107	220	36	256	92	388	480	1'766	1'041	2'807	2'807
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	59.1	39.1	53.3	30.2	14.6	26.2	66.7	29.7	59.2	30.6	22.0	29.1	64.9	61.0	61.8	52.1	44.1	49.3	2'435
Ersparnisse	0.8	1.5	1.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.7	1.0	0.9	0.6	1.0	0.7	37
Rente (AHV/IV u.a.)	16.8	25.4	19.3	17.4	19.5	18.0	8.2	13.5	9.2	3.3	3.4	3.3	17.6	11.0	12.3	13.8	17.4	15.1	744
Sozialhilfe/Fürsorge	12.5	12.7	12.6	37.4	47.6	40.1	12.2	29.7	15.8	7.3	13.6	8.4	4.1	2.5	2.8	12.8	10.7	12.1	596
Arbeitslosenversicherung	6.8	4.5	6.1	6.8	6.1	6.6	4.8	10.8	6.0	3.0	1.7	2.8	2.0	1.8	1.9	5.5	3.4	4.7	234
durch PartnerIn	0.5	13.9	4.4	0.4	1.2	0.6	1.4	2.7	1.6	0.5	1.7	0.7	2.0	16.5	13.6	0.7	12.8	5.0	247
durch Eltern/Angehörige	2.0	2.1	2.0	3.4	8.5	4.7	2.7	10.8	4.3	53.5	55.1	53.8	8.8	4.8	5.6	12.8	9.3	11.6	571
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	3
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	4
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	1.5	0.9	1.3	3.8	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7	1.0	2.5	1.3	0.0	1.2	0.9	1.5	1.2	1.4	70
N**	1'837	757	2'594	235	82	317	147	37	184	572	118	690	148	600	748	3'181	1'760	4'941	4'941
fehlende Angaben	752	306	1'058	120	43	163	75	11	86	163	24	187	52	226	278	1'226	650	1'876	1'876
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.1	24.3	46.9	27.8	9.5	22.9	64.0	28.6	57.5	19.5	9.7	17.9	65.6	37.6	43.3	47.7	27.8	40.7	1'729
Teilzeitarbeit	5.1	21.9	10.0	5.9	5.4	5.7	4.0	17.9	6.5	2.3	1.9	2.3	1.6	31.4	25.3	4.3	21.6	10.4	444
Gelegenheitsarbeit	0.9	1.1	0.9	2.0	4.1	2.5	0.8	0.0	0.7	1.4	1.9	1.5	0.0	0.2	0.2	1.0	0.9	1.0	41.0
in Ausbildung	3.3	3.6	3.4	0.5	10.8	3.2	2.4	10.7	3.9	60.4	66.0	61.3	8.6	7.2	7.5	14.7	12.0	13.8	585
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	19.6	36.9	24.7	27.3	36.5	29.7	13.6	17.9	14.4	4.3	2.9	4.1	15.6	19.0	18.3	16.7	26.8	20.3	862
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	9.5	8.1	9.1	21.0	13.5	19.0	8.0	14.3	9.2	5.9	9.7	6.5	4.7	2.6	3.0	9.2	6.2	8.2	347
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.0	0.2	0.4	0.1	0.3	12
anderes	5.3	4.2	5.0	14.6	20.3	16.1	7.2	10.7	7.8	5.5	6.8	5.7	3.1	2.0	2.2	6.0	4.5	5.4	231
N**	1'574	645	2'219	205	74	279	125	28	153	512	103	615	128	500	628	2'749	1'502	4'251	4'251
fehlende Angaben	1'015	418	1'433	150	51	201	97	20	117	223	39	262	72	326	398	1'658	908	2'566	2'566

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	27.5	43.8	32.4	56.3	64.0	58.2	24.7	33.3	25.9	14.3	26.8	16.1	24.4	24.0	24.1	27.6	37.4	30.8	654
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.7	0.6	1.4	0.6	6.0	1.9	4.1	6.7	4.5	29.4	39.0	30.8	2.2	2.6	2.5	6.8	4.3	6.0	127
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.6	4.9	4.0	3.8	4.0	3.8	2.1	13.3	3.6	2.9	0.0	2.5	0.0	2.1	1.7	3.3	3.7	3.4	73
angelernte(r) ArbeiterIn	5.4	5.4	5.4	5.7	6.0	5.8	5.2	0.0	4.5	1.7	2.4	1.8	2.2	8.3	7.2	4.8	5.9	5.2	110
gelernte(r) ArbeiterIn	19.1	8.6	16.0	18.4	10.0	16.3	20.6	26.7	21.4	5.0	4.9	5.0	11.1	6.3	7.2	16.3	8.9	13.9	294
VorarbeiterIn	3.4	0.9	2.7	1.3	0.0	1.0	7.2	6.7	7.1	2.1	0.0	1.8	4.4	0.5	1.3	3.3	0.7	2.5	52
einfache(r) Angestellte(r)	14.4	20.6	16.2	4.4	10.0	5.8	13.4	6.7	12.5	9.2	7.3	9.0	15.6	30.2	27.4	12.1	20.6	14.9	316
mittl. Angestellte(r)/ Kader	10.6	7.2	9.5	3.8	0.0	2.9	6.2	0.0	5.4	3.4	0.0	2.9	26.7	9.9	13.1	9.0	6.8	8.3	176
leit. Angestellte(r)/Kader	3.9	1.7	3.3	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.7	4.6	2.6	2.2	2.5	52
selbständig	8.7	3.7	7.2	1.9	0.0	1.4	14.4	0.0	12.5	3.4	0.0	2.9	4.4	8.9	8.0	7.4	4.3	6.4	136
SchülerIn/StudentIn	1.1	2.3	1.5	0.0	0.0	0.0	2.1	6.7	2.7	27.7	19.5	26.5	4.4	2.6	3.0	5.9	5.0	5.6	119
andere Stellung	0.6	0.3	0.5	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.6	12
N**	815	349	1'164	158	50	208	97	15	112	238	41	279	45	192	237	1'426	695	2'121	2'121
fehlende Angaben	1'774	714	2'488	197	75	272	125	33	158	497	101	598	155	634	789	2'981	1'715	4'696	4'696
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	27.2	46.5	32.4	35.4	39.1	36.1	25.0	50.0	30.0	47.7	80.0	52.2	16.7	11.4	12.2	32.9	39.9	34.8	394
weniger als 1000 Fr.	4.5	4.1	4.4	7.3	26.1	10.9	15.6	0.0	12.5	26.5	8.0	23.9	25.0	14.3	15.9	10.1	9.5	9.9	112
1001 bis 2000 Fr.	5.0	8.2	5.8	13.5	4.3	11.8	3.1	12.5	5.0	5.8	8.0	6.1	0.0	5.7	4.9	6.0	7.0	6.3	71
2001 bis 3000 Fr.	7.6	14.1	9.3	18.8	17.4	18.5	12.5	12.5	12.5	3.9	4.0	3.9	0.0	17.1	14.6	8.3	13.9	9.9	112
3001 bis 4000 Fr.	9.9	11.8	10.4	6.3	13.0	7.6	15.6	12.5	15.0	7.7	0.0	6.7	0.0	24.3	20.7	9.2	14.2	10.6	120
4001 bis 5000 Fr.	20.1	5.9	16.3	10.4	0.0	8.4	9.4	12.5	10.0	5.2	0.0	4.4	16.7	10.0	11.0	14.7	6.3	12.4	140
5001 bis 6000 Fr.	12.3	5.3	10.4	7.3	0.0	5.9	15.6	0.0	12.5	0.6	0.0	0.6	16.7	8.6	9.8	9.4	5.1	8.2	93
6001 bis 8000 Fr.	8.0	2.9	6.6	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.5	1.9	0.0	1.7	8.3	7.1	7.3	5.4	3.2	4.8	54
8001 bis 10 000 Fr.	2.8	0.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	16.7	1.4	3.7	2.2	0.6	1.8	20
10001 bis 15 000 Fr.	2.2	0.0	1.6	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	11
über 15 000 Fr.	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	4
N**	463	170	633	96	23	119	32	8	40	155	25	180	12	70	82	815	316	1'131	1'131
fehlende Angaben	2'126	893	3'019	259	102	361	190	40	230	580	117	697	188	756	944	3'592	2'094	5'686	5'686

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
planm. Beendigung ohne Übertritt	47.6	45.4	47.0	27.7	29.8	28.2	42.3	36.2	41.3	61.4	64.8	61.9	68.5	67.9	68.0	49.3	53.8	50.9	3'434
planm. Beendigung mit Übertritt	6.3	8.3	6.8	11.7	11.6	11.7	9.5	10.6	9.7	4.1	8.5	4.8	2.5	3.1	3.0	6.1	6.7	6.3	426
Wohnortwechsel	2.8	3.1	2.9	6.0	7.4	6.4	5.4	8.5	5.9	3.0	2.1	2.9	0.5	1.3	1.2	3.2	2.7	3.0	203
Hospitalisierung	0.6	0.9	0.7	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	46
Inhaftierung	0.2	0.1	0.2	3.1	0.0	2.3	0.5	0.0	0.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	22
Kontaktverlust	28.2	28.0	28.2	30.6	33.9	31.4	31.1	31.9	31.2	17.1	12.7	16.4	20.8	17.5	18.1	26.2	23.4	25.2	1'704
expliziter Abbruch	10.6	9.8	10.4	11.4	11.6	11.5	8.1	10.6	8.6	10.4	9.9	10.3	5.1	5.6	5.5	10.2	8.6	9.7	652
Tod	1.6	1.7	1.6	6.0	2.5	5.1	2.7	2.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.3	91
anderer Grund	2.2	2.7	2.3	1.7	1.7	1.7	0.5	0.0	0.4	3.2	1.4	2.9	2.5	4.5	4.1	2.2	3.1	2.5	172
N**	2'559	1'053	3'612	350	121	471	222	47	269	730	142	872	197	819	1'016	4'363	2'387	6'750	6'750
fehlende Angaben	30	10	40	5	4	9	0	1	1	5	0	5	3	7	10	44	23	67	67

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
stationäre Therapie	34.0	32.7	33.6	33.3	37.5	34.2	33.3	50.0	36.8	23.5	25.0	24.0	33.3	10.0	15.4	32.9	29.7	31.8	82
ambulante Behandlung	43.3	57.7	48.3	43.3	25.0	39.5	46.7	25.0	42.1	58.8	62.5	60.0	66.7	60.0	61.5	46.1	56.0	49.6	128
Aussenwohngruppe	3.1	3.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.2	1.9	5
andere Stelle/Institution	19.6	5.8	14.8	23.3	37.5	26.3	20.0	25.0	21.1	17.6	12.5	16.0	0.0	30.0	23.1	19.2	12.1	16.7	43
N**	97	52	149	30	8	38	15	4	19	17	8	25	3	10	13	167	91	258	258
fehlende Angaben	63	35	98	11	6	17	6	1	7	13	4	17	2	15	17	100	68	168	168

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
Suizid	11.1	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	40.0	.	40.0	10.0	0.0	8.2	5
Unfall	3.7	20.0	8.1	17.6	0.0	16.7	0.0	.	0.0	10.0	18.2	11.5	7
Krankheit	74.1	80.0	75.7	58.8	100.0	61.1	60.0	.	60.0	66.0	81.8	68.9	42
Überdosis bzw. Vergiftung	7.4	0.0	5.4	17.6	0.0	16.7	0.0	.	0.0	10.0	0.0	8.2	5
andere Todesursache	3.7	0.0	2.7	5.9	0.0	5.6	0.0	.	0.0	4.0	0.0	3.3	2.0
N**	27	10	37	17	1	18	5	0	5	0	0	0	0	0	0	50	11	61	61
fehlende Angaben	14	8	22	4	2	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	19	11	30	30

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2011)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	3.7	3.4	3.6	2.3	4.8	2.9	1.8	0.0	1.5	6.1	2.8	5.6	10.5	7.9	8.4	4.3	5.0	4.6	310
> 1 Woche bis 1 Monat	3.1	3.0	3.1	1.7	1.6	1.7	1.8	2.1	1.9	8.8	13.4	9.6	3.0	4.5	4.2	4.0	4.0	4.0	273
> 1 Monat bis 2 Monate	3.5	3.4	3.5	2.5	6.5	3.5	1.8	0.0	1.5	7.9	9.9	8.2	4.5	4.7	4.7	4.2	4.5	4.3	294
> 2 bis 3 Monate	3.4	3.6	3.4	1.1	4.0	1.9	1.4	6.3	2.2	5.2	7.7	5.6	5.0	4.6	4.7	3.8	4.4	4.0	271
> 3 bis 6 Monate	10.1	11.1	10.4	9.0	4.8	7.9	10.8	10.4	10.7	13.9	15.5	14.1	10.0	16.8	15.5	11.0	13.3	11.8	801
> 6 Monate bis 1 Jahr	27.4	28.4	27.7	25.6	21.8	24.6	30.6	41.7	32.6	33.1	31.7	32.8	40.0	31.6	33.3	29.5	30.8	30.0	2'034
> 1 Jahr bis 2 Jahre	25.2	24.2	24.9	22.0	28.2	23.6	26.1	20.8	25.2	18.6	12.0	17.6	16.0	19.4	18.7	22.8	21.6	22.4	1'519
> 2 bis 3 Jahre	10.2	10.3	10.2	13.0	8.9	11.9	11.3	8.3	10.7	4.5	4.2	4.4	5.0	4.7	4.8	9.0	7.4	8.5	574
> 3 bis 5 Jahre	9.4	9.2	9.3	13.2	14.5	13.6	11.3	8.3	10.7	1.6	2.8	1.8	5.0	3.3	3.6	7.9	6.5	7.4	501
> 5 bis 10 Jahre	2.9	2.3	2.7	7.6	4.0	6.7	3.2	2.1	3.0	0.3	0.0	0.2	0.5	1.5	1.3	2.6	1.8	2.3	158
mehr als 10 Jahre	1.1	1.0	1.1	2.0	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	56
N**	2'573	1'056	3'629	355	124	479	222	48	270	735	142	877	200	825	1'025	4'391	2'400	6'791	6'791
fehlende Angaben	16	7	23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	26	26
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	80.0	77.0	79.1	109.9	93.6	105.7	79.8	68.0	77.7	38.7	35.5	38.2	48.2	54.2	53.0	71.7	64.4	69.1	
Standardabweichung	99.4	94.3	98.0	124.3	106.1	120.0	74.8	62.7	72.9	39.9	43.2	40.5	63.7	91.1	86.4	91.6	88.8	90.7	
1. Quartil	25.3	24.8	25.0	31.9	26.9	30.4	29.3	30.1	29.3	9.3	7.3	9.0	14.1	14.4	14.3	21.9	18.9	20.9	
Medianwert	50.9	49.4	50.1	67.6	67.1	67.6	52.9	47.6	51.8	29.9	24.5	29.1	30.9	32.0	31.9	43.7	38.9	42.1	
3. Quartil	99.0	96.6	98.3	146.3	112.8	141.6	105.6	82.2	101.9	52.3	42.3	51.1	57.3	60.3	59.0	88.4	75.1	83.6	
N**	2'573	1'056	3'629	355	124	479	222	48	270	735	142	877	200	825	1'025	4'391	2'400	6'791	
fehlende Angaben	16	7	23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	26	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	97.8	97.9	97.9	38.2	41.0	38.9	88.5	87.2	88.2	99.5	100.0	99.6	92.7	93.6	92.9	3'961
ja	2.2	2.1	2.1	61.8	59.0	61.1	11.5	12.8	11.8	0.5	0.0	0.4	7.3	6.4	7.1	302
N**	1'859	770	2'629	251	83	334	156	39	195	586	110	696	3'096	1'167	4'263	4'263
fehlende Angaben	730	292	1'022	104	42	146	66	9	75	149	32	181	1'111	416	1'527	1'527
Typ der Substitution***																
Heroin	5.3	0.0	3.7	3.7	4.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	3.6	2.8	3.3	9
Methadon	39.5	81.3	51.9	88.8	89.4	89.0	78.6	100.0	83.3	100.0	.	100.0	78.7	88.9	81.4	218
andere Opiate	5.3	12.5	7.4	5.2	2.1	4.4	14.3	0.0	11.1	0.0	.	0.0	5.6	4.2	5.2	14
andere Substanzen	50.0	6.3	37.0	2.2	4.3	2.8	7.1	0.0	5.6	0.0	.	0.0	12.2	4.2	10.0	27
N**	38	16	54	134	47	181	14	4	18	2	0	2	196	72	268	268
fehlende Angaben	2	0	2	21	2	23	4	1	5	1	0	1	31	3	34	34
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.5	99.6	99.5	68.0	70.3	68.5	94.8	97.0	95.2	99.8	100.0	99.8	96.9	97.6	97.1	3'638
ja	0.5	0.4	0.5	32.0	29.7	31.5	5.2	3.0	4.8	0.2	0.0	0.2	3.1	2.4	2.9	108
N**	1'650	675	2'325	206	64	270	135	33	168	517	99	616	2'727	1'019	3'746	3'746
fehlende Angaben	939	387	1'326	149	61	210	87	15	102	218	43	261	1'480	564	2'044	2'044
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	25.0	0.0	18.2	15.2	10.5	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	14.3	8.3	13.0	13
Substitution	75.0	100.0	81.8	84.8	89.5	85.9	100.0	100.0	100.0	100.0	.	100.0	85.7	91.7	87.0	144
N**	8	3	11	66	19	85	7	1	8	1	0	1	84	24	108	157
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	88.5	80.2	86.3	81.5	75.5	80.2	87.5	95.5	89.1	89.2	94.3	89.8	88.1	82.2	86.7	1'871
ja	11.5	19.8	13.7	18.5	24.5	19.8	12.5	4.5	10.9	10.8	5.7	10.2	11.9	17.8	13.3	287
N**	1'004	368	1'372	168	49	217	88	22	110	268	35	303	1'636	522	2'158	2'158
<i>fehlende Angaben</i>	1'585	694	2'279	187	76	263	134	26	160	467	107	574	2'571	1'061	3'632	3'632
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
institutionseigene Nachsorgestelle	2.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	3.7	0.0	3.4	2.8	0.0	1.9	5
fremde Aussenwohngruppe	3.9	3.0	3.6	6.5	0.0	4.8	0.0	100.0	8.3	3.7	0.0	3.4	3.9	3.5	3.8	10
fremde Nachsorgestelle	10.8	11.9	11.2	12.9	9.1	11.9	0.0	0.0	0.0	11.1	50.0	13.8	10.7	11.8	11.0	29
Alkoholberatungsstelle	22.5	19.4	21.3	12.9	9.1	11.9	9.1	0.0	8.3	11.1	0.0	10.3	18.5	16.5	17.9	47
Drogenberatungsstelle	3.9	6.0	4.7	22.6	36.4	26.2	18.2	0.0	16.7	22.2	0.0	20.7	10.7	9.4	10.3	27
andere Beratungsstelle	8.8	4.5	7.1	22.6	18.2	21.4	18.2	0.0	16.7	11.1	0.0	10.3	12.4	5.9	10.3	27
Selbsthilfegruppe	5.9	9.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	4.6	12
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1
andere	45.1	52.2	47.9	45.2	27.3	40.5	36.4	0.0	33.3	37.0	50.0	37.9	43.3	50.6	45.6	120
N**	102	67	169	31	11	42	11	1	12	27	2	29	178	85	263	263
<i>fehlende Angaben</i>	13	6	19	0	1	1	0	0	0	2	0	2	16	8	24	24

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2011)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	53.6	60.5	55.6	26.1	17.9	24.2	22.0	14.8	20.7	11.0	6.7	10.3	38.1	42.8	39.4	1'321
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.1	0.0	0.0	2.2	1.8	2.1	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	10
Heroin	0.5	0.5	0.5	47.8	46.4	47.5	4.9	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.3	4.0	133
Methadon	0.3	1.0	0.5	21.7	16.1	20.3	3.3	0.0	2.7	0.2	0.0	0.2	2.2	1.7	2.1	69
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	1.7	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	5
Kokain	1.5	1.8	1.6	10.0	8.9	9.7	40.7	51.9	42.7	0.4	3.4	0.9	3.9	3.9	3.9	131
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Amphetamine	0.2	0.5	0.3	0.6	0.0	0.4	2.4	3.7	2.7	0.0	1.1	0.2	0.4	1.0	0.5	18
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	0.4	0.8	7.4	2.0	0.4	4.5	1.1	0.3	1.5	0.7	22
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Barbiturate	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	4
Benzodiazepine	0.8	2.0	1.2	14.4	14.3	14.4	6.5	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	80
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.5	0.3	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	9
LSD	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	5
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	4
Cannabis	3.1	1.2	2.5	13.3	8.9	12.3	12.2	14.8	12.7	48.1	46.1	47.8	13.1	6.2	11.2	376
Tabak	10.6	9.0	10.1	18.9	16.1	18.2	15.4	7.4	14.0	12.5	10.1	12.1	12.7	12.0	12.5	419
andere Substanzen	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	11
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.0	35
Essstörungen	0.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	5.3	1.6	54
anderes suchtähnliches Problem	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.9	30
keine	41.7	35.7	40.0	28.9	32.1	29.7	39.8	33.3	38.7	43.4	49.4	44.4	40.7	35.5	39.2	1'316
N**	1'466	603	2'069	180	56	236	123	27	150	472	89	561	2'435	918	3'353	3'353
fehlende Angaben	1'123	459	1'582	175	69	244	99	21	120	263	53	316	1'772	665	2'437	2'437

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	60.2	48.4	56.9	34.3	30.8	33.6	54.3	47.1	52.9	75.0	60.0	73.1	60.0	49.0	57.3	790
einmal	11.1	11.5	11.2	12.7	23.1	14.8	5.7	0.0	4.6	9.5	12.0	9.8	10.7	11.3	10.9	150
zweimal	6.6	7.4	6.8	7.8	11.5	8.6	7.1	5.9	6.9	2.4	8.0	3.1	6.1	7.5	6.5	89
drei- oder viermal	10.6	15.6	12.0	19.6	3.8	16.4	14.3	29.4	17.2	7.7	4.0	7.3	11.2	14.9	12.1	167
fünfmal oder mehr	11.6	17.2	13.1	25.5	30.8	26.6	18.6	17.6	18.4	5.4	16.0	6.7	12.0	17.3	13.3	183
N**	640	244	884	102	26	128	70	17	87	168	25	193	1'044	335	1'379	1'379
fehlende Angaben	1'949	818	2'767	253	99	352	152	31	183	567	117	684	3'163	1'248	4'411	4'411
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	97.5	98.3	97.8	33.3	38.9	34.6	46.9	33.3	43.9	9.8	11.1	10.0	71.0	79.5	73.5	410
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.4	0.0	0.3	6.3	0.0	4.9	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	6
Opiate	2.5	0.8	1.9	87.3	61.1	81.5	9.4	11.1	9.8	0.0	0.0	0.0	16.6	8.1	14.2	79
Kokain und Derivate	4.6	2.5	3.9	27.0	27.8	27.2	84.4	88.9	85.4	0.0	0.0	0.0	14.1	9.9	12.9	72
Stimulantien	0.8	0.8	0.8	3.2	0.0	2.5	6.3	0.0	4.9	12.2	0.0	10.0	3.5	1.2	2.9	16
Medikamente	0.4	2.5	1.1	23.8	16.7	22.2	9.4	11.1	9.8	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	5.4	30
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
Cannabis	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	1
Tabak	4.6	2.5	3.9	22.2	11.1	19.8	12.5	11.1	12.2	82.9	88.9	84.0	16.1	8.7	14.0	78
flüchtige Stoffe	0.8	0.8	0.8	7.9	5.6	7.4	0.0	0.0	0.0	12.2	11.1	12.0	3.3	2.5	3.0	17
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	2
pathologisches Spielen	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.3	7
Essstörungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	3
anderes suchtägliches Problem	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.3	7
N**	241	118	359	63	18	81	32	9	41	41	9	50	397	161	558	558
fehlende Angaben	14	8	22	4	0	4	0	0	0	1	1	2	21	10	31	31
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	27.2	34.0	29.2	25.0	50.0	30.0	21.1	50.0	26.1	47.1	50.0	47.6	30.1	37.5	32.0	79
3-6 Tage	22.8	27.7	24.2	29.2	0.0	23.3	26.3	50.0	30.4	29.4	0.0	23.8	24.0	25.0	24.3	60
7-10 Tage	14.9	10.6	13.7	12.5	33.3	16.7	10.5	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	13.1	12.5	13.0	32
>10 Tage bis 2 Wochen	4.4	10.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.8	4.0	10
>2 bis 4 Wochen	7.9	6.4	7.5	12.5	16.7	13.3	21.1	0.0	17.4	5.9	0.0	4.8	9.3	6.3	8.5	21
>4 bis 6 Wochen	12.3	8.5	11.2	4.2	0.0	3.3	10.5	0.0	8.7	0.0	25.0	4.8	9.3	7.8	8.9	22
>6 bis 8 Wochen	1.8	2.1	1.9	8.3	0.0	6.7	5.3	0.0	4.3	0.0	25.0	4.8	2.7	3.1	2.8	7
>2 Monate	8.8	0.0	6.2	8.3	0.0	6.7	5.3	0.0	4.3	17.6	0.0	14.3	8.7	0.0	6.5	16
N**	114	47	161	24	6	30	19	4	23	17	4	21	183	64	247	247
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	29.8	40.4	32.7	5.4	0.0	4.1	12.9	0.0	11.0	16.3	0.0	14.3	23.8	31.7	25.8	299
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	1.5	1.1	1.1	0.0	0.8	0.0	9.1	1.4	2.8	0.0	2.5	1.3	1.8	1.4	16
2 bis 3 Tage pro Woche	0.8	0.0	0.5	1.1	0.0	0.8	3.2	0.0	2.7	2.8	0.0	2.5	1.5	0.0	1.1	13
4 bis 6 Tage pro Woche	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.5	0.4	0.4	5
einmal täglich	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	5
mehrmals täglich	67.4	57.6	64.7	92.4	100.0	94.3	83.9	90.9	84.9	75.9	100.0	78.9	72.4	66.2	70.9	823
N**	533	203	736	92	30	122	62	11	73	141	20	161	877	284	1'161	1'161
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'056</i>	<i>859</i>	<i>2'915</i>	<i>263</i>	<i>95</i>	<i>358</i>	<i>160</i>	<i>37</i>	<i>197</i>	<i>594</i>	<i>122</i>	<i>716</i>	<i>3'330</i>	<i>1'299</i>	<i>4'629</i>	<i>4'629</i>
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	21.8	20.0	21.3	14.1	5.9	12.3	6.7	10.0	7.3	49.0	15.4	45.2	25.0	16.7	23.2	145
11-20 Zigaretten pro Tag	48.1	51.8	49.0	40.6	64.7	45.7	48.9	50.0	49.1	40.2	84.6	45.2	45.3	56.1	47.6	297
21-30 Zigaretten pro Tag	19.5	22.4	20.2	35.9	29.4	34.6	40.0	40.0	40.0	10.8	0.0	9.6	22.2	23.5	22.4	140
31 und mehr Zigaretten pro Tag	10.7	5.9	9.5	9.4	0.0	7.4	4.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	7.5	3.8	6.7	42
N**	262	85	347	64	17	81	45	10	55	102	13	115	492	132	624	624
<i>fehlende Angaben</i>	<i>112</i>	<i>36</i>	<i>148</i>	<i>23</i>	<i>13</i>	<i>36</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>7</i>	<i>23</i>	<i>176</i>	<i>62</i>	<i>238</i>	<i>238</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2011)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	36.1	40.0	37.2	71.4	73.0	71.8	69.1	81.3	71.1	58.2	45.7	56.5	46.0	45.2	45.8	832
zeitlich begrenzte Abstinenz	16.9	9.6	14.8	0.8	0.0	0.6	6.2	0.0	5.2	5.6	17.1	7.3	11.8	8.4	11.0	199
kontrollierter Konsum	33.3	35.5	33.9	12.8	16.2	13.5	11.1	18.8	12.4	22.1	20.0	21.8	28.1	32.3	29.1	529
keine Beschränkung beabsichtigt	3.4	3.0	3.3	2.3	2.7	2.4	2.5	0.0	2.1	5.2	2.9	4.8	3.4	2.8	3.2	59
bis jetzt nicht festgelegt	9.8	11.6	10.3	9.8	8.1	9.4	11.1	0.0	9.3	8.9	14.3	9.7	9.9	11.2	10.2	186
andere	0.6	0.3	0.5	3.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.6	11
N**	829	335	1'164	133	37	170	81	16	97	213	35	248	1'351	465	1'816	1'816
fehlende Angaben	1'760	727	2'487	222	88	310	141	32	173	522	107	629	2'856	1'118	3'974	3'974
Prognose*																
sehr gute Prognose	15.6	15.4	15.5	7.4	7.7	7.5	15.4	11.1	14.6	21.7	3.1	19.5	15.3	14.3	15.0	287
gute Prognose	47.7	44.4	46.8	36.5	35.9	36.4	44.9	61.1	47.9	48.3	75.0	51.5	46.8	46.2	46.7	891
eher ungünstige Prognose	25.7	30.8	27.1	41.2	35.9	40.1	30.8	27.8	30.2	24.8	21.9	24.4	27.7	30.6	28.4	542
ungünstige Prognose	11.0	9.5	10.6	14.9	20.5	16.0	9.0	0.0	7.3	5.2	0.0	4.6	10.2	8.9	9.9	189
N**	879	338	1'217	148	39	187	78	18	96	230	32	262	1'439	470	1'909	1'909
fehlende Angaben	1'710	724	2'434	207	86	293	144	30	174	505	110	615	2'768	1'113	3'881	3'881

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

ANHANG

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2011)

Selbstbetroffene: Hauptproblem													alle Eintritte***			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																
Männer			67.1			76.5			79.1			76.3			72.4	996
Frauen			31.0			22.1			19.6			20.9			26.2	360
Geschl. unbekannt			1.9			1.4			1.4			2.8			1.5	20
N**	247	114	368	221	64	289	117	29	148	161	44	211	996	360	1'376	1'376
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.9	0.8	0.0	0.6	8
15-19	3.7	2.9	3.6	1.8	4.7	2.4	0.0	3.4	0.7	40.6	34.1	40.5	9.3	10.6	10.0	133
20-24	4.6	1.9	3.6	8.7	20.3	11.1	12.1	17.2	13.6	23.8	11.4	20.5	11.4	11.1	11.2	150
25-29	11.4	8.6	10.6	13.7	20.3	15.3	19.0	13.8	17.7	13.1	13.6	13.3	13.9	14.0	13.9	186
30-34	12.8	9.5	11.8	19.6	15.6	18.8	23.3	17.2	22.4	8.1	11.4	8.6	16.1	12.0	15.0	200
35-39	16.0	8.6	13.3	22.8	10.9	20.2	16.4	13.8	15.6	5.6	4.5	5.2	16.8	10.3	14.9	199
40-44	12.8	18.1	14.5	14.2	10.9	13.6	14.7	20.7	15.6	2.5	11.4	4.3	12.6	16.6	13.6	182
45-49	11.4	15.2	12.4	11.9	9.4	11.1	7.8	10.3	8.2	1.3	4.5	1.9	8.8	9.4	8.8	118
50-54	12.8	12.4	12.7	3.2	1.6	2.8	4.3	3.4	4.1	1.9	4.5	2.4	5.4	6.0	5.5	74
55-59	6.8	10.5	8.2	4.1	6.3	4.5	1.7	0.0	1.4	0.0	2.3	0.5	2.7	5.1	3.4	45
60-64	3.2	3.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.0	14
65-69	1.8	2.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5	7
70-74	2.3	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	8
75 und mehr	0.5	3.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	1.0	0.3	2.0	0.7	10
N**	219	105	331	219	64	287	116	29	147	160	44	210	964	350	1'334	1'334
<i>fehlende Angaben</i>	28	9	37	2	0	2	1	0	1	1	0	1	32	10	42	42
Alter																
Mittelwert	41.7	46.2	43.1	36.3	32.9	35.5	35.1	34.3	34.8	24.2	30.5	25.4	34.8	37.2	35.4	
Standardabweichung	12.8	15.5	13.9	9.0	10.7	9.5	9.3	9.4	9.3	10.6	16.6	12.3	11.8	15.4	12.9	
1. Quartil	31.2	36.1	32.3	30.0	24.6	28.4	28.3	26.2	28.0	17.2	18.1	17.2	26.0	26.0	26.0	
Medianwert	40.2	45.9	42.8	36.0	30.0	35.0	34.0	34.0	34.0	21.0	26.5	21.0	34.0	36.0	34.5	
3. Quartil	51.8	53.2	52.3	42.0	40.5	42.0	41.43	41.0	41.0	28.0	39.1	29.0	42.1	45.0	43.0	
N**	219	105	331	219	64	287	116	29	147	160	44	210	964	350	1'334	
<i>fehlende Angaben</i>	28	9	37	2	0	2	1	0	1	1	0	1	32	10	42	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2011)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	24.8	31.7	26.7	368
Opiate	22.2	17.8	21.0	289
Kokain	11.7	8.1	10.8	148
Stimulantien	1.6	2.2	1.7	24
Hypnotika/Sedativa	0.9	1.4	1.0	14
Halluzinogene	0.2	0.0	0.1	2
flüchtige Stoffe	0.1	0.3	0.1	2
Cannabis	16.2	12.2	15.3	211
Tabak	0.2	3.6	1.1	15
andere Substanz	0.8	1.9	1.1	15
Mischkonsum**	19.6	16.1	18.4	253
suchtähnliche Verhaltensweisen	1.7	4.7	2.5	35
N***	996	360	1'376	1'376
<i>fehlende Angaben</i>	0	0	0	0

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein