

act-info - SAMBAD

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der Erhebung 2020



Etienne Maffli

Lausanne, November 2021

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Klientinnen und Klienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebogen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher und Diane Jaccard für die Layoutarbeiten gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Maffli, E. (2021). *act-info* – SAMBAD: Ambulante Suchthilfe:
Ergebnisse der Erhebung 2020. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7
Hinweise zu den Tabellen und Grafiken	8

TRENDS

G1	Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G2	Hauptproblem Opioide bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G3	Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G4	Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G5	Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G6	Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020
G7	Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2020)

- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren
Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer
Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach
Hauptproblem (2020)
- T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2020)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt
(2020), Männer
- T15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt
(2020), Frauen
- T15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt
(2020), Männer und Frauen
- T15.2a Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020),
Männer
- T15.2b Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020),
Frauen
- T15.2c Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020),
Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen
Konsums sowie Latenzzeit (2020), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen
Konsums sowie Latenzzeit (2020), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen
Konsums sowie Latenzzeit (2020), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des
regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des
regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des
regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Männer und
Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2020)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30
Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach
Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer
und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Männer

- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2020), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2020), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2020), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2020)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2020)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2020)

- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2020)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahresehebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden seit dem Berichtsjahr 2018 alle von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Allerdings konnten nicht alle Einrichtungen die revidierten Fragebogen in ihre Systeme implementieren. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt zum Teil die relativ hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die sozio-demographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2020 beteiligten sich 54 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich hauptsächlich um spezialisierte Alkohol- und /oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten. Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden. Die Ergebnisse dieser Befragung werden im Gesamtbericht act-info (Jahresbericht 2020) berichtet, welcher ebenfalls Ende 2021 publiziert wurde.

Hinweise zu den Tabellen und Grafiken

Im ersten Teil werden einschlägige Trends (2013–2020) des laufenden *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opioide, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa sowie Glücksspiel).

Im zweiten Teil werden detaillierte Ergebnisse zu den Eintritten (grüne Hintergrundfarbe) und im dritten Teil zu den Austritten des Berichtsjahres 2020 dargelegt (blaue Hintergrundfarbe). In diesen deskriptiven Statistiken werden sämtliche Fragen der Erhebungsinstrumente berücksichtigt. Dabei sind zwei Arten von Tabellen zu unterscheiden:


- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der Klientinnen und Klienten, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opioide** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate wie Crack) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) Personen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt oder unbestimmt ist).




Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.


Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020







Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G4 Hauptproblem andere Stimulanzien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020


Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2020


Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	68.1			69.9			83.8			79.4			22.3			63.1			3 845
Frauen	31.9			30.1			16.2			20.6			77.7			36.9			2 247
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	1 701	795	2 496	107	46	153	367	71	438	931	242	1 173	241	839	1 080	3 845	2 247	6 092	6 092
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7.0	5.0	3.0	1.2	1.6	2.3	1.8	2.1	128
15-19	2.3	2.6	2.4	2.8	4.3	3.3	5.4	4.2	5.3	56.9	52.1	55.9	6.8	1.6	2.7	18.4	10.1	15.4	933
20-24	4.1	2.6	3.6	7.5	6.5	7.2	13.4	7.0	12.3	11.7	15.3	12.4	4.2	4.1	4.1	8.0	5.6	7.1	431
25-29	7.4	5.3	6.7	6.6	10.9	7.9	21.3	36.6	23.7	10.2	9.9	10.1	4.7	6.1	5.8	9.4	7.9	8.9	539
30-34	10.8	9.2	10.3	15.1	15.2	15.1	21.8	26.8	22.6	5.2	4.5	5.0	5.5	10.2	9.2	10.9	9.9	10.5	640
35-39	12.4	14.4	13.0	18.9	8.7	15.8	19.3	8.5	17.6	5.9	2.9	5.3	4.2	9.6	8.4	10.6	10.5	10.6	642
40-44	11.8	11.6	11.7	17.0	15.2	16.4	7.9	11.3	8.4	2.4	4.1	2.7	9.7	10.8	10.6	8.7	10.0	9.2	556
45-49	12.3	11.6	12.1	7.5	17.4	10.5	5.7	1.4	5.0	1.7	0.8	1.5	14.0	16.1	15.7	8.2	11.4	9.3	568
50-54	13.8	13.5	13.7	14.2	13.0	13.8	3.5	2.8	3.4	1.0	1.7	1.1	11.9	14.6	14.0	8.5	11.4	9.6	583
55-59	11.0	13.1	11.7	6.6	4.3	5.9	1.6	0.0	1.4	0.2	1.7	0.5	14.8	12.8	13.2	6.7	10.3	8.0	488
60-64	6.9	7.9	7.3	0.9	2.2	1.3	0.0	1.4	0.2	0.1	0.0	0.1	7.6	6.0	6.4	3.8	5.4	4.4	266
65-69	3.6	4.0	3.8	0.9	2.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	7.6	3.6	4.5	2.4	3.0	2.7	161
70-74	2.4	2.8	2.5	1.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.9	2.4	1.4	1.8	1.5	94
75 und mehr	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	1.4	0.6	1.0	0.8	46
N**	1 701	794	2 495	106	46	152	367	71	438	931	242	1 173	236	831	1 067	3 838	2 237	6 075	6 075
fehlende Angaben	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	13	7	10	17	17
Alter																			
Mittelwert	45.3	46.5	45.7	40.6	40.2	40.5	32.9	31.9	32.8	22.3	22.6	22.4	46.3	45.7	45.8	36.8	41.5	38.5	
Standardabweichung	13.6	13.4	13.5	11.7	11.8	11.7	8.8	8.1	8.7	8.9	9.4	9.0	17.2	13.5	14.4	15.8	15.4	15.9	
1. Quartil	35.1	37.2	35.5	33.8	32.2	33.3	26.5	27.3	26.9	16.6	16.5	16.6	34.9	36.1	36.0	22.7	29.8	25.2	
Medianwert	45.7	46.4	45.9	39.7	40.9	40.3	32.2	30.2	31.6	17.8	18.3	17.9	49.2	46.7	47.5	35.4	42.0	37.7	
3. Quartil	55.0	56.4	55.5	49.9	47.6	49.3	38.10	35.0	37.9	25.7	25.1	25.6	58.1	55.1	55.7	49.1	53.2	51.0	
N**	1 701	794	2 495	106	46	152	367	71	438	931	242	1 173	241	833	1 074	3 843	2 240	6 083	
fehlende Angaben	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	7	9	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Zivilstand*																						
ledig	44.7	39.3	42.9	66.0	63.4	65.2	75.2	71.4	74.6	92.4	86.2	91.1	29.2	26.0	26.7	61.5	44.6	55.3	3 137			
verheiratet	33.2	26.2	31.0	17.0	14.6	16.3	17.1	8.6	15.7	3.6	8.0	4.5	50.5	51.4	51.2	23.4	31.2	26.3	1 492			
getrennt	4.7	3.9	4.5	2.1	2.4	2.2	3.1	0.0	2.6	0.6	0.0	0.5	3.3	3.4	3.4	3.0	2.8	2.9	167			
geschieden	15.5	25.0	18.6	12.8	19.5	14.8	3.7	12.9	5.2	1.7	4.0	2.2	14.6	15.5	15.3	9.8	17.3	12.6	714			
verwitwet	0.9	4.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	0.9	2.7	2.3	1.0	3.0	1.7	99			
reg. Partnerschaft	1.0	0.8	0.9	2.1	0.0	1.5	0.9	7.1	1.9	0.6	0.4	0.6	1.4	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	66			
N**	1 608	751	2 359	94	41	135	351	70	421	863	225	1 088	212	769	981	3 581	2 094	5 675	5 675			
fehlende Angaben	93	44	137	13	5	18	16	1	17	68	17	85	29	70	99	264	153	417	417			
Staatsangehörigkeit*																						
Schweiz/FL	72.7	80.6	75.2	64.8	69.6	66.2	71.1	77.5	72.1	80.8	79.8	80.6	80.8	78.5	79.1	75.0	79.7	76.7	4 646			
EU	15.0	11.2	13.8	18.1	15.2	17.2	16.0	5.6	14.3	9.2	6.7	8.7	7.5	9.6	9.1	12.9	9.7	11.7	707			
andere	12.3	8.2	11.0	17.1	15.2	16.6	12.9	16.9	13.6	10.0	13.4	10.7	11.7	11.9	11.8	12.2	10.6	11.6	702			
N**	1 688	793	2 481	105	46	151	363	71	434	927	238	1 165	240	834	1 074	3 819	2 236	6 055	6 055			
fehlende Angaben	13	2	15	2	0	2	4	0	4	4	4	8	1	5	6	26	11	37	37			

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.2	8.4	9.0	0.9	0.0	0.7	7.8	15.7	9.0	3.0	4.7	3.4	10.9	11.6	11.4	6.7	8.6	7.4	442
Umland der Grossstadtzentren	19.8	22.4	20.6	15.0	9.3	13.3	20.8	14.3	19.7	9.2	11.0	9.6	23.6	18.7	19.7	16.4	17.5	16.8	1 003
Mittelzentren	11.1	12.3	11.5	5.6	14.0	8.0	14.7	14.3	14.6	23.2	24.2	23.4	17.9	13.9	14.8	15.9	15.6	15.8	944
Kleinzentren	31.4	30.2	31.0	38.3	44.2	40.0	37.4	32.9	36.7	34.8	33.5	34.5	24.9	29.6	28.6	33.3	31.1	32.5	1 938
rural	28.4	26.7	27.8	40.2	32.6	38.0	19.4	22.9	20.0	29.8	26.7	29.2	22.7	26.2	25.5	27.7	27.1	27.5	1 641
N**	1 679	782	2 461	107	43	150	361	70	431	923	236	1 159	229	804	1 033	3 783	2 185	5 968	5 968
fehlende Angaben	22	13	35	0	3	3	6	1	7	8	6	14	12	35	47	62	62	124	124
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	35.2	33.8	34.8	44.3	28.9	39.3	33.9	31.0	33.4	14.1	14.8	14.3	11.0	12.9	12.5	27.8	25.0	26.9	1 288
mit Herkunftsfamilie	6.9	5.5	6.5	15.2	18.4	16.2	23.4	12.1	21.7	66.1	53.2	63.4	14.3	6.5	8.1	26.9	16.2	23.4	1 120
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	46.8	52.3	48.5	25.3	42.1	30.8	32.0	39.7	33.2	9.2	16.2	10.6	70.3	78.8	77.0	34.1	49.6	39.2	1 880
mit Freunden/anderen Personen	3.6	3.3	3.5	1.3	2.6	1.7	4.4	6.9	4.8	3.8	5.6	4.2	2.2	1.5	1.6	3.6	4.0	3.8	180
Haft	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	14
therap. Einrichtung/Wohnheim	3.4	1.6	2.8	10.1	5.3	8.5	2.2	5.2	2.7	2.7	1.4	2.4	0.0	0.0	0.0	3.2	1.6	2.7	127
Spital/Klinik	1.6	1.8	1.7	1.3	0.0	0.9	0.9	1.7	1.1	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	46
anderes	2.2	1.7	2.1	2.5	2.6	2.6	0.9	3.4	1.3	3.6	8.3	4.6	2.2	0.3	0.7	2.9	2.6	2.8	135
N**	1 482	704	2 186	79	38	117	316	58	374	808	216	1 024	91	340	431	3 206	1 584	4 790	4 790
fehlende Angaben	219	91	310	28	8	36	51	13	64	123	26	149	150	499	649	639	663	1 302	1 302
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	92.8	95.2	93.6	87.0	83.3	85.8	90.1	86.2	89.4	93.6	90.3	92.9	96.2	98.4	98.0	92.7	94.8	93.4	4 661
instabile Wohnsituation	2.8	2.2	2.6	1.3	13.9	5.3	5.6	7.7	5.9	2.4	4.8	2.9	1.9	1.6	1.6	2.9	2.9	2.9	145
Haft	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	13
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	4.1	2.6	3.6	11.7	2.8	8.8	2.5	6.2	3.1	3.8	4.8	4.0	1.9	0.0	0.4	3.9	2.3	3.4	170
N**	1 519	724	2 243	77	36	113	322	65	387	844	227	1 071	106	386	492	3 319	1 670	4 989	4 989
fehlende Angaben	182	71	253	30	10	40	45	6	51	87	15	102	135	453	588	526	577	1 103	1 103

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	41.5	45.0	42.6	68.6	60.0	66.0	41.3	46.2	42.0	74.9	63.6	72.4	28.9	25.6	26.2	51.7	42.8	48.5	1 492
zeitweilige Beziehung(en)	2.2	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.0	3.8	2.3	3.0	3.5	3.1	0.0	0.3	0.3	2.2	2.3	2.2	69
feste Beziehung, getrennt lebend	9.3	12.0	10.2	8.6	13.3	10.0	16.0	23.1	17.0	15.4	17.5	15.8	3.9	12.8	11.0	11.4	14.3	12.4	381
feste Beziehung, zusammen leb.	47.0	40.0	44.8	22.9	26.7	24.0	40.7	26.9	38.6	6.8	15.4	8.7	67.1	61.3	62.5	34.7	40.7	36.8	1 132
N**	943	440	1 383	35	15	50	150	26	176	501	143	644	76	305	381	1 987	1 087	3 074	3 074
fehlende Angaben	758	355	1 113	72	31	103	217	45	262	430	99	529	165	534	699	1 858	1 160	3 018	3 018
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	41.0	41.2	41.0	48.8	66.7	53.4	63.1	58.3	62.3	92.8	89.3	92.0	35.7	30.1	31.3	61.7	49.8	57.3	1 906
1 Kind	17.5	21.6	18.9	27.9	13.3	24.1	20.2	27.8	21.6	3.5	3.9	3.6	13.3	17.4	16.5	12.5	16.4	13.9	463
2 Kinder	28.2	28.4	28.3	20.9	20.0	20.7	10.1	11.1	10.3	2.5	6.2	3.4	36.7	34.5	35.0	17.7	23.8	19.9	663
3 Kinder oder mehr	13.3	8.8	11.8	2.3	0.0	1.7	6.5	2.8	5.9	1.2	0.6	1.0	14.3	18.0	17.2	8.1	10.1	8.8	293
N**	901	464	1 365	43	15	58	168	36	204	598	178	776	98	362	460	2 102	1 223	3 325	3 325
fehlende Angaben	800	331	1 131	64	31	95	199	35	234	333	64	397	143	477	620	1 743	1 024	2 767	2 767
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	68.9	66.3	68.0	88.5	72.7	83.8	76.0	82.1	77.1	77.1	87.7	79.5	47.8	45.4	45.9	71.5	64.4	68.8	1 946
1 Kind	12.2	16.6	13.6	7.7	18.2	10.8	10.9	14.3	11.5	5.9	4.8	5.6	28.3	22.6	23.8	10.7	15.8	12.6	357
2 Kinder	14.5	15.5	14.9	3.8	0.0	2.7	7.8	3.6	7.0	11.7	6.8	10.7	17.4	24.3	22.8	12.9	15.6	13.9	393
3 Kinder oder mehr	4.4	1.6	3.5	0.0	9.1	2.7	5.4	0.0	4.5	5.3	0.7	4.3	6.5	7.7	7.5	4.9	4.2	4.7	132
N**	765	386	1 151	26	11	37	129	28	157	511	146	657	92	337	429	1 769	1 059	2 828	2 828
fehlende Angaben	936	409	1 345	81	35	116	238	43	281	420	96	516	149	502	651	2 076	1 188	3 264	3 264

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	3.4	3.4	3.4	3.9	10.7	5.8	3.9	5.7	4.2	14.1	16.5	14.6	4.5	1.2	1.9	7.8	5.4	6.9	324
obligatorische Schule	11.0	9.5	10.6	15.8	32.1	20.2	13.5	24.5	15.1	54.3	51.0	53.6	12.8	7.5	8.6	24.1	16.7	21.5	1 006
Übergangsausbildung	2.1	3.6	2.6	1.3	7.1	2.9	1.0	1.9	1.1	3.2	2.0	3.0	1.5	1.6	1.6	2.3	2.8	2.5	117
Allgemeinausbildung ohne Maturität	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	5.7	1.1	0.4	0.5	0.4	1.5	0.8	0.9	0.6	0.8	0.6	30
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	56.4	59.1	57.2	65.8	46.4	60.6	63.2	54.7	61.9	22.7	22.0	22.6	33.8	46.0	43.5	45.8	47.3	46.3	2 162
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.6	5.9	5.0	3.9	0.0	2.9	3.3	0.0	2.8	2.6	3.5	2.8	2.3	9.4	7.9	3.7	6.5	4.7	219
höhere Berufsbildung	9.4	7.4	8.8	6.6	0.0	4.8	8.9	1.9	7.8	1.5	1.5	1.5	19.5	13.9	15.1	7.3	8.4	7.7	360
Fachhochschule oder Universität	11.8	9.9	11.2	2.6	3.6	2.9	5.9	5.7	5.9	1.2	3.0	1.5	22.6	19.4	20.1	8.1	11.8	9.4	437
Doktorat oder Habilitation	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	14
N**	1 369	609	1 978	76	28	104	304	53	357	779	200	979	133	509	642	3 070	1 599	4 669	4 669
<i>fehlende Angaben</i>	332	186	518	31	18	49	63	18	81	152	42	194	108	330	438	775	648	1 423	1 423
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	18.0	25.1	20.1	31.0	60.7	39.4	16.6	26.8	18.0	20.8	29.4	22.7	0.0	21.2	18.4	18.4	27.4	20.9	581
Lehrling/Lehrtöchter, Praktik.	1.9	1.1	1.6	4.2	0.0	3.0	5.1	7.3	5.4	26.3	22.5	25.5	0.0	0.0	0.0	7.8	4.8	7.0	194
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.5	3.7	3.5	4.2	3.6	4.0	3.2	2.4	3.1	2.7	2.0	2.6	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	3.1	87
angelernete(r) ArbeiterIn	6.5	5.1	6.1	1.4	7.1	3.0	3.6	2.4	3.4	1.9	2.0	1.9	0.0	0.0	0.0	5.0	4.2	4.8	132
gelernte(r) ArbeiterIn	12.5	10.3	11.9	18.3	7.1	15.2	19.8	7.3	18.0	10.4	2.9	8.8	0.0	0.0	0.0	13.3	8.1	11.8	329
VorarbeiterIn	2.0	0.2	1.4	1.4	0.0	1.0	2.8	0.0	2.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	37
einfache(r) Angestellte(r)	22.3	33.2	25.5	21.1	14.3	19.2	31.2	46.3	33.3	15.6	17.6	16.1	40.0	37.9	38.2	21.9	30.4	24.2	673
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	14.8	12.1	14.0	8.5	3.6	7.1	9.5	2.4	8.5	3.8	2.9	3.6	10.0	24.2	22.4	11.5	10.5	11.2	312
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.9	2.6	4.9	2.8	3.6	3.0	2.4	0.0	2.0	0.5	1.0	0.6	10.0	4.5	5.3	4.0	2.3	3.6	99
selbständig	10.4	5.7	9.0	2.8	0.0	2.0	5.9	0.0	5.1	3.0	1.0	2.6	20.0	7.6	9.2	7.5	4.7	6.7	187
SchülerIn/StudentIn	1.1	0.2	0.9	2.8	0.0	2.0	0.0	2.4	0.3	13.2	17.6	14.1	20.0	4.5	6.6	4.4	3.9	4.3	119
andere Stellung	1.2	0.7	1.0	1.4	0.0	1.0	0.0	2.4	0.3	1.1	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.0	28
N**	1 072	455	1 527	71	28	99	253	41	294	365	102	467	10	66	76	2 009	769	2 778	2 778
<i>fehlende Angaben</i>	629	340	969	36	18	54	114	30	144	566	140	706	231	773	1 004	1 836	1 478	3 314	3 314

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	56.2	45.4	52.8	22.6	17.9	21.2	60.2	41.2	57.0	26.3	19.8	25.0	60.0	68.7	66.7	47.2	45.3	46.6	2 372
Ersparnisse	2.4	2.2	2.3	1.1	0.0	0.8	1.5	0.0	1.2	0.9	1.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.7	1.5	1.6	82
Rente (AHV/IV u.a.)	14.5	20.0	16.2	23.7	30.8	25.8	5.8	13.2	7.0	3.9	5.9	4.3	15.2	9.5	10.8	10.5	15.0	12.0	609
Sozialhilfe/Fürsorge	14.0	11.9	13.4	36.6	35.9	36.4	11.0	32.4	14.6	9.4	15.8	10.7	1.9	1.4	1.5	12.5	11.3	12.1	616
Arbeitslosenversicherung	6.3	4.0	5.6	5.4	2.6	4.5	8.1	4.4	7.5	2.4	3.6	2.7	1.9	0.8	1.1	5.0	3.2	4.4	225
durch PartnerIn	1.1	8.6	3.5	2.2	2.6	2.3	0.9	0.0	0.7	1.5	3.2	1.8	1.9	12.6	10.2	1.4	7.7	3.4	175
durch Eltern/Angehörige	2.8	4.1	3.2	4.3	10.3	6.1	7.0	4.4	6.6	54.2	48.6	53.1	17.1	4.7	7.6	19.2	13.4	17.3	882
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	6
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2
Taggeldversicherung	1.4	1.6	1.5	2.2	0.0	1.5	2.0	2.9	2.2	0.3	0.5	0.4	0.0	0.3	0.2	1.1	1.0	1.1	55
anderes	1.3	2.1	1.5	1.1	0.0	0.8	2.9	1.5	2.7	0.6	0.9	0.6	1.0	0.8	0.9	1.2	1.5	1.3	66
N**	1 575	729	2 304	93	39	132	344	68	412	871	222	1 093	105	358	463	3 441	1 649	5 090	5 090
fehlende Angaben	126	66	192	14	7	21	23	3	26	60	20	80	136	481	617	404	598	1 002	1 002
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	51.7	30.4	45.1	20.4	12.8	18.2	55.2	30.0	51.4	17.6	10.6	16.2	50.0	42.4	44.2	41.3	29.2	37.5	1 836
Teilzeitarbeit	5.6	20.3	10.2	5.4	10.3	6.8	3.2	10.0	4.3	2.8	8.3	3.9	12.2	33.6	28.7	4.7	19.7	9.4	460
Gelegenheitsjobs	1.2	0.9	1.1	6.5	0.0	4.5	1.8	3.3	2.0	0.7	0.5	0.7	0.0	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1	55
in Ausbildung	2.9	3.5	3.1	4.3	0.0	3.0	6.8	6.7	6.8	58.6	53.5	57.6	12.2	6.9	8.1	20.7	15.1	19.0	929
arbeitslos und aktive Stellensuche	12.3	10.3	11.7	15.1	7.7	12.9	15.9	15.0	15.8	7.9	7.8	7.9	4.4	1.0	1.8	10.7	7.5	9.7	473
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	7.8	6.9	7.5	32.3	20.5	28.8	8.0	16.7	9.3	3.7	6.9	4.4	0.0	1.6	1.3	6.8	6.5	6.7	327
Rentner/Rentnerin	7.4	10.9	8.5	1.1	10.3	3.8	1.2	3.3	1.5	0.7	0.5	0.7	11.1	7.6	8.4	4.4	7.6	5.4	263
Arbeitsunfähigkeit	5.7	8.2	6.5	9.7	17.9	12.1	3.5	5.0	3.8	2.1	3.7	2.4	4.4	1.3	2.0	4.5	5.8	4.9	238
Hausfrau/-mann	0.2	4.2	1.4	0.0	2.6	0.8	0.0	5.0	0.8	0.0	0.5	0.1	1.1	3.0	2.5	0.1	3.2	1.1	53
anderes	5.1	4.5	4.9	5.4	17.9	9.1	4.4	5.0	4.5	5.7	7.8	6.2	4.4	1.3	2.0	5.7	4.4	5.3	258
N**	1 535	691	2 226	93	39	132	339	60	399	856	217	1 073	90	304	394	3 366	1 526	4 892	4 892
fehlende Angaben	166	104	270	14	7	21	28	11	39	75	25	100	151	535	686	479	721	1 200	1 200

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	46.2	57.5	49.5	85.3	70.0	81.8	54.1	28.6	51.5	60.5	83.3	66.2	96.9	88.3	90.2	56.9	71.6	61.7	673
weniger als 1000 Fr.	0.8	4.6	1.9	5.9	0.0	4.5	4.9	0.0	4.4	16.3	8.3	14.4	0.0	0.0	0.0	5.7	3.1	4.9	53
1001 bis 2000 Fr.	5.2	7.2	5.8	0.0	0.0	0.0	1.6	14.3	2.9	4.1	0.0	3.1	0.0	1.8	1.4	3.7	3.9	3.8	41
2001 bis 3000 Fr.	4.6	5.9	5.0	0.0	30.0	6.8	3.3	14.3	4.4	2.7	4.2	3.1	0.0	1.8	1.4	3.5	5.1	4.0	44
3001 bis 4000 Fr.	8.2	11.8	9.2	0.0	0.0	0.0	3.3	14.3	4.4	6.8	2.1	5.6	0.0	1.8	1.4	6.0	7.0	6.3	69
4001 bis 5000 Fr.	12.0	4.6	9.8	5.9	0.0	4.5	13.1	14.3	13.2	6.8	2.1	5.6	0.0	2.7	2.1	9.0	3.9	7.3	80
5001 bis 6000 Fr.	10.6	4.6	8.8	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	8.8	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.8	2.2	5.3	58
6001 bis 8000 Fr.	6.5	2.0	5.2	2.9	0.0	2.3	4.9	14.3	5.9	0.7	0.0	0.5	0.0	2.7	2.1	4.5	2.0	3.7	40
8001 bis 10 000 Fr.	3.3	2.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.5	0.7	0.0	0.5	0.0	0.9	0.7	2.0	1.1	1.7	19
10001 bis 15 000 Fr.	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.7	1.2	0.0	0.8	9
über 15 000 Fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4
N**	368	153	521	34	10	44	61	7	68	147	48	195	32	111	143	734	356	1 090	1 090
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 333</i>	<i>642</i>	<i>1 975</i>	<i>73</i>	<i>36</i>	<i>109</i>	<i>306</i>	<i>64</i>	<i>370</i>	<i>784</i>	<i>194</i>	<i>978</i>	<i>209</i>	<i>728</i>	<i>937</i>	<i>3 111</i>	<i>1 891</i>	<i>5 002</i>	<i>5 002</i>
Schulden*																			
keine Schulden	58.9	71.7	63.0	28.9	26.7	28.3	48.3	77.8	51.6	78.0	70.3	76.4	93.5	95.6	95.2	63.4	74.5	66.8	1 604
bis 5000 Fr.	4.7	1.6	3.7	8.9	0.0	6.7	5.6	5.6	5.6	4.8	6.5	5.2	0.0	2.2	1.8	5.2	3.5	4.7	112
5001 bis 10 000 Fr.	4.7	1.9	3.8	6.7	0.0	5.0	7.0	5.6	6.8	3.3	2.9	3.2	0.0	0.7	0.6	4.0	2.2	3.5	83
10 001 bis 25 000 Fr.	3.5	1.6	2.9	0.0	20.0	5.0	10.5	0.0	9.3	2.1	5.1	2.7	3.2	0.7	1.2	3.8	2.6	3.5	83
25 001 bis 50 000 Fr.	3.2	3.5	3.3	4.4	0.0	3.3	11.2	0.0	9.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.6	3.2	2.2	2.9	70
50 001 bis 100 000 Fr.	19.2	17.5	18.6	48.9	46.7	48.3	12.6	0.0	11.2	9.6	13.8	10.5	0.0	0.0	0.0	16.3	13.2	15.3	368
über 100 000 Fr.	3.2	0.6	2.4	2.2	6.7	3.3	3.5	0.0	3.1	0.4	1.4	0.6	3.2	0.0	0.6	2.5	0.9	2.0	48
Höhe nicht bekannt	2.4	1.6	2.1	0.0	0.0	0.0	1.4	11.1	2.5	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.4	33
N**	677	315	992	45	15	60	143	18	161	522	138	660	31	137	168	1 664	737	2 401	2 401
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 024</i>	<i>480</i>	<i>1 504</i>	<i>62</i>	<i>31</i>	<i>93</i>	<i>224</i>	<i>53</i>	<i>277</i>	<i>409</i>	<i>104</i>	<i>513</i>	<i>210</i>	<i>702</i>	<i>912</i>	<i>2 181</i>	<i>1 510</i>	<i>3 691</i>	<i>3 691</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N	
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Frühere Hafterfahrungen*																	
keine	89.6	97.6	91.9	57.1	0.0	44.4	70.8	93.8	75.3	91.2	100.0	92.8	87.6	96.1	89.7	821	
Strafhaft	5.9	1.2	4.6	21.4	50.0	27.8	9.2	6.3	8.6	3.2	0.0	2.6	5.8	2.2	4.9	45	
Untersuchungshaft	2.8	0.6	2.2	14.3	0.0	11.1	10.8	0.0	8.6	4.8	0.0	3.9	4.4	0.4	3.4	31	
Straf- und Untersuchungshaft	1.7	0.6	1.4	7.1	50.0	16.7	9.2	0.0	7.4	0.8	0.0	0.7	2.2	1.3	2.0	18	
N**	423	166	589	14	4	18	65	16	81	125	28	153	684	231	915	915	
<i>fehlende Angaben</i>	1 278	629	1 907	93	42	135	302	55	357	806	214	1 020	2 920	1 177	4 097	4 097	
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																	
<1 Monat	21.4	33.3	22.6	50.0	0.0	20.0	42.9	0.0	40.0	33.3	-	33.3	30.8	14.3	28.8	17	
1 bis 2 Monate	21.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	13.3	0.0	-	0.0	15.4	0.0	13.6	8	
>2 bis 6 Monate	28.6	0.0	25.8	50.0	33.3	40.0	14.3	0.0	13.3	50.0	-	50.0	26.9	14.3	25.4	15	
>6 bis 12 Monate	14.3	33.3	16.1	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	13.3	0.0	-	0.0	13.5	14.3	13.6	8	
mehr als 1 Jahr	14.3	33.3	16.1	0.0	66.7	40.0	14.3	100.0	20.0	16.7	-	16.7	13.5	57.1	18.6	11	
N**	28	3	31	2	3	5	14	1	15	6	0	6	52	7	59	59	
<i>fehlende Angaben</i>	16	1	17	4	1	5	5	0	5	5	0	5	33	2	35	35	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N	
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																				
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	15.4	6.5	12.5	6.9	5.1	6.3	12.0	3.1	10.6	55.3	39.6	52.1	1.9	0.4	0.7	22.8	7.4	17.2	960	
Arztpraxis	9.6	10.6	9.9	16.1	23.1	18.3	3.6	1.5	3.3	2.4	3.6	2.6	4.7	3.8	4.0	6.4	7.0	6.6	371	
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	5.3	5.4	5.3	13.8	7.7	11.9	4.5	6.2	4.8	1.4	2.3	1.6	4.2	2.7	3.1	4.0	3.8	3.9	220	
andere medizinische oder soziale Dienste	16.0	16.5	16.2	12.6	20.5	15.1	9.0	20.0	10.8	7.6	17.6	9.6	6.1	5.9	5.9	12.0	12.8	12.3	686	
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	2.3	3.2	2.5	0.9	1.2	1.2	1.4	1.8	1.5	85	
ArbeitgeberIn	3.6	1.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	1.3	1.1	0.9	1.1	0.5	0.3	0.3	2.2	1.2	1.8	103	
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	48.2	56.2	50.8	50.6	41.0	47.6	67.6	64.6	67.1	28.5	31.5	29.1	80.3	84.6	83.7	48.4	64.0	54.1	3 021	
anderes	1.7	2.0	1.8	0.0	2.6	0.8	2.1	1.5	2.0	1.5	1.4	1.5	1.4	1.0	1.1	2.7	2.1	2.5	137	
N**	1 569	744	2 313	87	39	126	333	65	398	874	222	1 096	213	729	942	3 545	2 038	5 583	5 583	
fehlende Angaben	132	51	183	20	7	27	34	6	40	57	20	77	28	110	138	300	209	509	509	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	93.9	97.1	94.8	91.7	93.3	92.2	96.0	97.8	96.3	80.5	82.0	80.8	91.8	95.1	92.6	2 427
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	3.2	2.2	3.0	0.6	0.4	0.6	15
Massnahme liegt vor	6.0	2.9	5.1	8.3	6.7	7.8	4.0	0.0	3.3	16.2	15.7	16.1	7.6	4.5	6.8	178
N**	1 059	444	1 503	72	30	102	224	45	269	339	89	428	1 931	689	2 620	2 620
fehlende Angaben	642	351	993	35	16	51	143	26	169	592	153	745	1 673	719	2 392	2 392
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	14.3	0.0	11.5	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	3.4	0.0	2.5	6.2	0.0	4.9	4
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	0.0	20.0	3.8	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.2	1
ambulante Behandlung	61.9	80.0	65.4	50.0	-	50.0	100.0	-	100.0	48.3	72.7	55.0	55.4	76.5	59.8	49
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
in Erwartung eines Urteils	9.5	0.0	7.7	50.0	-	50.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	4.9	4
anderes	14.3	0.0	11.5	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	51.7	45.5	50.0	33.8	29.4	32.9	27
N**	21	5	26	2	0	2	4	0	4	29	11	40	65	17	82	82
fehlende Angaben	44	8	52	4	2	6	5	1	6	37	5	42	94	17	111	111

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	47.1	41.8	45.4	13.2	18.9	15.0	58.0	40.0	55.2	78.5	72.3	77.2	73.8	73.6	73.6	58.8	53.0	57.0	2 473
ja	52.9	58.2	54.6	86.8	81.1	85.0	42.0	60.0	44.8	21.5	27.7	22.8	26.2	26.4	26.4	41.2	47.0	43.0	1 869
N**	1 389	653	2 042	76	37	113	276	50	326	739	195	934	61	227	288	2 965	1 377	4 342	4 342
fehlende Angaben	312	142	454	31	9	40	91	21	112	192	47	239	180	612	792	880	870	1 750	1 750
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.6	0.4	0.5	0.0	8.3	2.4	0.0	6.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.6	7
Substitution (Methadon, Subutex®)	2.3	1.6	2.0	66.7	50.0	61.9	8.2	6.3	7.7	0.8	2.6	1.3	0.0	1.8	1.4	4.9	3.6	4.4	54
weitere medikamentöse Behandlung	6.5	3.1	5.3	6.7	8.3	7.1	6.1	6.3	6.2	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	5.1	2.9	4.3	53
ambulante Beratung/Therapie	75.3	72.9	74.5	70.0	83.3	73.8	71.4	62.5	69.2	90.8	69.2	85.4	100.0	80.0	84.1	77.1	75.4	76.5	940
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.5	1.6	1.5	6.7	8.3	7.1	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	16
stationäre Therapie	47.7	54.7	50.1	16.7	50.0	26.2	44.9	68.8	50.8	15.1	23.1	17.1	14.3	18.2	17.4	39.1	45.1	41.3	507
Entzug	38.7	43.0	40.2	43.3	41.7	42.9	38.8	37.5	38.5	4.2	10.3	5.7	7.1	7.3	7.2	30.2	31.7	30.8	378
Selbsthilfegruppe	6.1	9.3	7.2	3.3	0.0	2.4	2.0	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	4.2	6.0	4.9	60
andere	1.7	1.6	1.6	0.0	8.3	2.4	2.0	0.0	1.5	1.7	7.7	3.2	0.0	3.6	2.9	2.0	2.2	2.1	26
N**	478	258	736	30	12	42	49	16	65	119	39	158	14	55	69	781	448	1 229	1 229
fehlende Angaben	261	124	385	36	19	55	67	14	81	42	18	60	2	7	9	451	207	658	658

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	98.2	99.3	98.6	52.6	50.0	51.9	95.1	96.6	95.3	99.2	99.4	99.2	97.4	98.1	97.6	2 715
ja	1.8	0.7	1.4	47.4	50.0	48.1	4.9	3.4	4.7	0.8	0.6	0.8	2.6	1.9	2.4	67
N**	902	431	1 333	38	14	52	143	29	172	603	163	766	1 977	805	2 782	2 782
fehlende Angaben	799	364	1 163	69	32	101	224	42	266	328	79	407	1 627	603	2 230	2 230
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	9.1	0.0	8.3	70.6	66.7	69.6	25.0	0.0	20.0	-	0.0	0.0	38.9	41.7	39.6	19
Methadon	54.5	100.0	58.3	17.6	16.7	17.4	50.0	100.0	60.0	-	100.0	100.0	36.1	41.7	37.5	18
andere Opioide	27.3	0.0	25.0	11.8	16.7	13.0	25.0	0.0	20.0	-	0.0	0.0	19.4	16.7	18.8	9
andere Substanzen	9.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	5.6	0.0	4.2	2
N**	11	1	12	17	6	23	4	1	5	0	1	1	36	12	48	48
fehlende Angaben	5	2	7	1	1	2	3	0	3	5	0	5	16	3	19	19
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	97.5	97.7	97.6	30.2	48.5	36.5	94.2	92.9	94.0	98.9	99.0	98.9	95.2	95.5	95.3	2 610
ja	2.5	2.3	2.4	69.8	51.5	63.5	5.8	7.1	6.0	1.1	1.0	1.1	4.8	4.5	4.7	128
N**	1 077	483	1 560	63	33	96	190	42	232	362	102	464	1 956	782	2 738	2 738
fehlende Angaben	624	312	936	44	13	57	177	29	206	569	140	709	1 648	626	2 274	2 274
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	32.4	30.4	31.7	31.5	25.1	29.6	31.3	23.0	29.3	25.0	-	25.0	31.6	27.0	30.3	
Standardabweichung	16.5	9.9	14.3	8.7	4.1	8.1	12.1	-	10.7	-	-	-	11.5	7.0	10.5	
1. Quartil	22.0	24.0	22.0	25.0	22.0	24.0	20.0	-	21.5	-	-	-	24.0	23.0	24.0	
Medianwert	28.5	26.0	26.0	30.0	26.0	28.0	30.0	23.0	26.5	25.0	-	25.0	30.0	26.0	27.0	
3. Quartil	35.0	41.0	41.0	36.0	30.0	35.0	44.0	-	37.0	-	-	-	35.0	30.0	35.0	
N**	10	5	15	16	7	23	3	1	4	1	0	1	31	13	44	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren. Altersangaben

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2020)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
Alkohol	47.2	56.5	49.8	2 496	Alkohol	47.2	56.5	49.8	2 496
Heroin	2.4	2.4	2.4	120					
Methadon	0.2	0.1	0.2	8					
Buprenorphin	0.1	0.0	0.0	2	Opioide	3.0	3.3	3.1	153
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
andere Opioide	0.3	0.8	0.4	22					
Kokain-Pulver	9.7	4.7	8.3	417					
Crack-Kokain	0.4	0.4	0.4	20	Kokain oder Derivate	10.2	5.0	8.7	438
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	1					
Amphetamine	0.8	1.5	1.0	51					
Metamphetamine	0.1	0.2	0.1	7					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.2	0.4	0.3	15	andere Stimulanzien	1.3	2.1	1.5	76
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0					
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.1	3					
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	1					
Benzodiazepine	1.2	1.8	1.4	70	Hypnotika/Sedativa	1.3	1.9	1.5	74
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.1	0.0	2					
LSD	0.0	0.0	0.0	0					
Ketamin	0.1	0.1	0.1	3	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	3
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0					
Cannabis	25.9	17.2	23.4	1 173	Cannabis	25.9	17.2	23.4	1 173
Tabak	1.9	3.3	2.3	114	Tabak	1.9	3.3	2.3	114
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	1					
andere Substanz(en)	0.2	0.4	0.2	12	andere Substanz	0.2	0.4	0.3	13
Glücksspielsucht	3.6	1.5	3.0	151					
Computer-bzw. Internetsucht	1.5	0.5	1.2	62	suchtähnliche Verhaltensweisen	9.0	10.2	9.4	469
Essstörungen	0.2	5.8	1.8	90					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3.7	2.4	3.3	166					
N**	3 601	1 408	5 009	5 009	N**	3 601	1 408	5 009	5 009
fehlende Angaben	3	0	3	3		3	0	3	3

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2020)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	7.4	5.5	6.9
nein	92.6	94.5	93.1
N*	1 740	635	2 375
<i>fehlende Angaben</i>	1 864	773	2 637
Häufigste Substanzkombinationen***			
Kok/Alk	14.1	11.5	13.6
Tab/Alk	15.2	7.7	13.6
Can/Alk	6.5	19.2	9.3
Can/Kok	7.6	0.0	5.9
Can/Kok/Alk	6.5	3.8	5.9
Tab/Can/Alk	6.5	3.8	5.9
Op/Alk	3.3	11.5	5.1
Tab/Can/Kok	3.3	0.0	2.5
Tab/Can/Kok/Alk	2.2	3.8	2.5
Med/Alk	2.2	0.0	1.7
Med/Kok/Alk	2.2	0.0	1.7
Can/Stim/Kok/Op/Alk	2.2	0.0	1.7
Tab/Med/Op/Alk	1.1	3.8	1.7
Tab/Med/Kok/Op	1.1	3.8	1.7
Tab/Can/Stim/Kok	0.0	7.7	1.7
Tab/Can/Med/Kok/Op	1.1	3.8	1.7
Andere Kombinationen	25.0	19.2	23.7
N**	91	26	117
<i>fehlende Angaben</i>	38	9	47

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozent; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.0	33.9	19.2	25.7	60.0	0.0	32.4	81.5	0.0
4-6 Tage pro Woche	11.5	10.7	9.8	8.6	8.6	0.0	9.0	1.9	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.4	7.1	23.9	5.7	8.6	0.0	15.3	7.4	50.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.5	8.9	25.7	14.3	11.4	100.0	18.4	5.6	50.0
kein Konsum	23.7	39.3	21.4	45.7	11.4	0.0	24.9	3.7	0.0
N**	1 391	56	276	35	35	2	778	54	2
<i>fehlende Angaben</i>	310	51	91	11	12	0	153	13	6

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.8	43.5	23.4	13.0	77.8	0.0	43.3	84.1	0.0
4-6 Tage pro Woche	13.4	0.0	14.9	17.4	5.6	0.0	9.0	4.5	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.2	4.3	17.0	8.7	0.0	0.0	13.9	4.5	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.8	8.7	14.9	26.1	0.0	0.0	15.4	2.3	100.0
kein Konsum	19.9	43.5	29.8	34.8	16.7	100.0	18.4	4.5	0.0
N**	643	23	47	23	18	1	201	44	1
<i>fehlende Angaben</i>	152	23	24	7	9	0	41	3	4

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2020), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.2	36.7	19.8	20.7	66.0	0.0	34.6	82.7	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.1	7.6	10.5	12.1	7.5	0.0	9.0	3.1	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.6	6.3	22.9	6.9	5.7	0.0	15.0	6.1	33.3
1 Tag pro Woche oder weniger	9.6	8.9	24.1	19.0	7.5	66.7	17.8	4.1	66.7
kein Konsum	22.5	40.5	22.6	41.4	13.2	33.3	23.6	4.1	0.0
N**	2 034	79	323	58	53	3	979	98	3
<i>fehlende Angaben</i>	462	74	115	18	21	0	194	16	10

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2020), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	10.7	69.2	75.0	65.7
4-6 Tage pro Woche	12.0	7.7	12.5	9.5
2-3 Tage pro Woche	18.7	7.7	12.5	11.4
1 Tag pro Woche oder weniger	18.7	2.6	0.0	6.7
nie	40.0	12.8	0.0	6.7
N**	75	39	8	105
<i>fehlende Angaben</i>	55	16	0	27

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2020), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	7.7	100.0	60.9	73.9
4-6 Tage pro Woche	38.5	0.0	8.7	4.3
2-3 Tage pro Woche	15.4	0.0	14.5	4.3
1 Tag pro Woche oder weniger	7.7	0.0	10.1	13.0
nie	30.8	0.0	5.8	4.3
N**	13	5	69	23
<i>fehlende Angaben</i>	8	2	13	11

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2020), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	10.2	72.7	62.3	67.2
4-6 Tage pro Woche	15.9	6.8	9.1	8.6
2-3 Tage pro Woche	18.2	6.8	14.3	10.2
1 Tag pro Woche oder weniger	17.0	2.3	9.1	7.8
nie	38.6	11.4	5.2	6.3
N**	88	44	77	128
<i>fehlende Angaben</i>	63	18	13	38

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2020), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.2	22.6	21.7	19.8	20.1	35.0	15.1	16.7	21.2	
Standardabweichung	4.0	6.8	6.7	7.4	7.8	-	2.2	5.9	8.0	
1. Quartil	14.0	17.0	18.0	16.0	15.0	-	14.0	14.0	16.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	17.5	18.5	35.0	15.0	16.0	19.0	
3. Quartil	17.0	28.0	24.0	18.0	22.0	-	16.0	18.0	28.0	
N*	886	41	216	24	26	1	642	39	5	
fehlende Angaben	815	66	151	22	21	1	289	28	3	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.9	26.7	25.7	19.4	23.4	37.0	16.1	18.7	20.0	
Standardabweichung	8.3	7.1	8.1	5.4	9.7	-	2.3	7.2	7.5	
1. Quartil	18.0	20.0	20.0	17.0	16.0	-	15.0	15.0	13.0	
Medianwert	20.0	27.0	24.0	18.0	22.0	37.0	16.0	17.0	19.0	
3. Quartil	25.0	33.0	30.0	18.5	25.0	-	17.0	20.0	28.0	
N*	587	19	108	16	11	1	431	39	3	
fehlende Angaben	1 114	88	259	30	36	1	500	28	5	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.0	25.8	26.5	22.8	22.0	34.5	17.4	23.3	22.8	
Standardabweichung	12.6	7.0	7.7	7.5	7.0	3.5	4.5	11.6	8.3	
1. Quartil	21.0	20.0	20.0	18.0	17.0	32.0	15.0	15.0	16.0	
Medianwert	30.0	25.0	25.0	20.0	20.0	34.5	16.0	18.0	23.5	
3. Quartil	40.0	30.5	30.5	24.0	25.0	37.0	17.0	30.0	29.5	
N*	967	44	224	22	27	2	589	41	4	
fehlende Angaben	734	63	143	24	20	0	342	26	4	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.9	13.0	9.7	8.0	8.1	-	5.0	12.7	1.4	
Standardabweichung	13.2	3.6	7.3	11.7	9.3	-	6.9	12.4	0.4	
1. Quartil	16.2	10.5	4.2	1.8	2.3	-	1.3	2.0	0.9	
Medianwert	24.8	13.9	8.3	4.9	3.6	-	2.1	6.6	1.5	
3. Quartil	35.5	15.5	13.1	9.5	9.7	-	4.6	24.1	1.7	
N*	371	4	111	11	7	0	433	22	3	
fehlende Angaben	282	6	49	12	3	1	146	16	2	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2020), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	17.5	21.1	22.7	21.2	33.5	30.0	14.8	15.8	29.0
Standardabweichung	5.9	8.0	7.1	5.1	15.7	-	1.8	2.4	14.1
1. Quartil	15.0	16.0	18.0	18.0	20.0	-	14.0	14.0	19.0
Medianwert	16.0	18.0	20.0	20.0	31.5	30.0	15.0	15.5	29.0
3. Quartil	18.0	28.0	26.0	22.5	45.0	-	16.0	18.0	39.0
N*	374	17	38	20	10	1	158	38	2
fehlende Angaben	421	29	33	10	17	0	84	9	3
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	26.3	20.0	25.3	22.1	32.0	31.0	16.1	19.0	29.0
Standardabweichung	11.0	4.6	7.7	6.1	25.4	-	3.2	5.7	14.1
1. Quartil	18.0	16.0	19.0	18.0	14.0	-	14.0	15.0	19.0
Medianwert	23.0	19.0	25.0	21.0	21.0	31.0	15.0	18.0	29.0
3. Quartil	35.0	25.0	28.0	24.0	61.0	-	17.0	20.0	39.0
N*	284	6	17	10	3	1	118	33	2
fehlende Angaben	511	40	54	20	24	0	124	14	3
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.0	24.4	24.4	23.5	36.9	31.0	17.6	23.2	31.0
Standardabweichung	13.0	7.5	6.7	6.2	15.6	-	6.0	10.4	11.3
1. Quartil	24.0	17.5	20.0	18.0	23.0	-	15.0	16.0	23.0
Medianwert	33.0	23.5	24.0	23.0	35.0	31.0	16.0	18.0	31.0
3. Quartil	43.0	30.0	28.0	28.0	52.0	-	18.0	30.0	39.0
N*	484	20	41	21	12	1	153	35	2
fehlende Angaben	311	26	30	9	15	0	89	12	3
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	25.2	9.9	4.3	4.5	1.2	-	4.6	16.2	7.9
Standardabweichung	13.2	11.0	5.8	4.5	-	-	6.1	15.0	3.8
1. Quartil	16.7	2.1	1.1	0.8	-	-	1.3	2.0	5.2
Medianwert	24.3	9.9	2.0	3.0	1.2	-	2.4	11.3	7.9
3. Quartil	35.0	17.6	4.5	9.9	-	-	6.0	27.7	10.6
N*	132	2	14	7	1	0	94	21	2
fehlende Angaben	139	5	6	4	3	0	47	4	1

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2020), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.6	22.2	21.9	20.4	23.8	32.5	15.0	16.2	23.4
Standardabweichung	4.7	7.1	6.7	6.4	12.0	3.5	2.1	4.5	9.5
1. Quartil	15.0	17.0	18.0	16.0	16.0	30.0	14.0	14.0	16.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	20.0	32.5	15.0	16.0	19.0
3. Quartil	18.0	28.0	25.0	21.5	25.0	35.0	16.0	18.0	31.0
N*	1 260	58	254	44	36	2	800	77	7
fehlende Angaben	1 236	95	184	32	38	1	373	37	6
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	24.0	25.1	25.6	20.5	25.2	34.0	16.1	18.8	23.6
Standardabweichung	9.4	7.1	8.0	5.7	13.6	4.2	2.5	6.5	10.1
1. Quartil	18.0	18.0	20.0	18.0	16.0	31.0	15.0	15.0	19.0
Medianwert	20.0	25.0	24.0	18.0	21.5	34.0	16.0	17.5	19.0
3. Quartil	30.0	30.0	30.0	22.0	25.0	37.0	17.0	20.0	28.0
N*	871	25	125	26	14	2	549	72	5
fehlende Angaben	1 625	128	313	50	60	1	624	42	8
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	32.7	25.3	26.2	23.2	26.6	33.3	17.4	23.3	25.5
Standardabweichung	12.8	7.1	7.6	6.9	12.3	3.2	4.8	11.0	9.2
1. Quartil	22.0	20.0	20.0	18.0	18.0	31.0	15.0	15.0	19.0
Medianwert	30.0	25.0	25.0	21.0	22.0	32.0	16.0	18.0	25.5
3. Quartil	40.0	30.0	30.0	28.0	30.0	37.0	18.0	30.0	31.0
N*	1 451	64	265	43	39	3	742	76	6
fehlende Angaben	1 045	89	173	33	35	0	431	38	7
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	25.7	12.0	9.1	6.6	7.3	-	4.9	14.4	4.0
Standardabweichung	13.2	5.9	7.3	9.5	9.0	-	6.7	13.7	4.1
1. Quartil	16.3	8.0	3.3	1.8	1.8	-	1.3	2.0	1.5
Medianwert	24.5	13.9	7.9	3.8	3.2	-	2.2	9.7	1.7
3. Quartil	35.4	16.1	12.8	9.5	9.6	-	4.7	25.5	5.2
N*	503	6	125	18	8	0	527	43	5
fehlende Angaben	421	11	55	16	6	1	193	20	3

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	22.5	13.9	15.7	15.9
Standardabweichung	8.1	3.3	2.1	8.6
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	12.0
Medianwert	20.0	14.0	15.0	14.0
3. Quartil	25.0	15.0	18.0	18.0
N*	49	14	3	62
fehlende Angaben	81	41	5	70
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	23.4	13.2	26.4	16.5
Standardabweichung	7.1	1.6	20.0	9.1
1. Quartil	18.0	12.0	16.0	12.5
Medianwert	20.0	12.0	19.0	14.0
3. Quartil	26.0	15.0	20.0	16.5
N*	31	5	5	52
fehlende Angaben	99	50	3	80
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	28.0	16.2	28.3	20.0
Standardabweichung	9.7	5.2	22.5	10.5
1. Quartil	20.5	13.0	16.0	14.0
Medianwert	26.5	14.5	17.5	16.0
3. Quartil	31.0	20.0	40.5	23.0
N*	60	18	4	66
fehlende Angaben	70	37	4	66
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	11.2	5.7	3.0	10.7
Standardabweichung	10.2	4.4	-	12.3
1. Quartil	2.8	3.0	-	2.2
Medianwert	7.9	4.6	3.0	5.3
3. Quartil	17.5	7.6	-	17.2
N*	36	13	1	46
fehlende Angaben	47	28	2	43

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	25.4	12.8	15.8	16.0
Standardabweichung	10.5	4.0	4.5	7.8
1. Quartil	18.0	10.0	13.0	12.0
Medianwert	21.0	14.0	15.0	13.0
3. Quartil	30.0	15.5	17.0	16.0
N*	9	4	49	15
fehlende Angaben	12	3	33	19
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	23.3	18.0	16.1	17.6
Standardabweichung	4.6	-	5.1	9.3
1. Quartil	19.5	-	14.0	13.0
Medianwert	22.5	18.0	15.0	14.5
3. Quartil	27.0	-	18.0	17.0
N*	4	1	45	16
fehlende Angaben	17	6	37	18
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	37.6	16.8	19.1	21.2
Standardabweichung	15.5	8.8	9.8	11.7
1. Quartil	25.0	14.0	14.0	15.0
Medianwert	32.0	15.0	16.0	16.0
3. Quartil	50.0	17.0	19.0	23.0
N*	14	5	57	18
fehlende Angaben	7	2	25	16
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	8.8	4.5	7.5	5.8
Standardabweichung	12.0	4.7	8.2	6.7
1. Quartil	1.6	1.4	1.2	2.6
Medianwert	4.3	2.3	5.2	3.9
3. Quartil	16.1	10.0	9.5	6.5
N*	4	3	25	11
fehlende Angaben	9	0	18	9

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2020), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchttähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	23.0	13.6	15.8	15.9
Standardabweichung	8.5	3.4	4.4	8.4
1. Quartil	18.0	12.0	13.0	12.0
Medianwert	20.0	14.0	15.0	14.0
3. Quartil	27.0	15.0	17.0	18.0
N*	58	18	52	77
fehlende Angaben	93	44	38	89
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	23.3	14.0	17.1	16.7
Standardabweichung	6.8	2.4	8.1	9.1
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	13.0
Medianwert	20.0	13.5	15.0	14.0
3. Quartil	26.0	15.0	18.0	16.5
N*	35	6	50	68
fehlende Angaben	116	56	40	98
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	29.8	16.3	19.7	20.3
Standardabweichung	11.5	5.9	11.0	10.7
1. Quartil	22.0	13.0	14.0	14.0
Medianwert	27.0	15.0	16.0	16.0
3. Quartil	33.0	20.0	19.0	23.0
N*	74	23	61	84
fehlende Angaben	77	39	29	82
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	10.9	5.4	7.3	9.7
Standardabweichung	10.3	4.4	8.1	11.5
1. Quartil	2.6	1.8	1.2	2.3
Medianwert	7.4	4.3	4.7	4.1
3. Quartil	17.5	8.8	9.5	16.5
N*	40	16	26	57
fehlende Angaben	56	28	20	52

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2020)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	25.0	37.5	28.6	1.2	0.0	1.0	5.3	10.0	6.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	47.5	50.0	48.2	11.9	11.8	11.9	15.8	0.0	10.3	95.9	97.4	96.2	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	7.5	6.3	7.1	8.1	19.6	10.0	42.1	30.0	37.9	3.8	2.6	3.6	96.9	95.2	96.2
sniffen	15.0	6.3	12.5	76.2	68.6	74.9	31.6	60.0	41.4	0.1	0.0	0.1	3.1	0.0	1.9
anderes	5.0	0.0	3.6	2.7	0.0	2.3	5.3	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.9
N**	40	16	56	260	51	311	19	10	29	730	194	924	32	21	53
fehlende Angaben	46	18	64	91	15	106	11	11	22	201	48	249	12	5	17

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injektion im Leben*																
ja	3.6	3.1	3.4	38.8	58.6	44.8	3.1	4.0	3.3	0.7	1.0	0.7	3.6	4.3	3.8	140
nie	93.1	93.5	93.2	41.8	34.5	39.6	93.4	96.0	93.8	94.1	92.2	93.8	91.8	91.7	91.7	3 424
möchte nicht antworten	3.4	3.4	3.4	19.4	6.9	15.6	3.5	0.0	2.9	5.2	6.7	5.5	4.7	4.1	4.5	168
N**	1 239	582	1 821	67	29	96	226	50	276	751	193	944	2 675	1 057	3 732	3 732
fehlende Angaben	462	213	675	40	17	57	141	21	162	180	49	229	929	351	1 280	1 280
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	0.3	0.4	0.3	10.0	15.8	11.9	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	22
nein	99.7	99.6	99.7	90.0	84.2	88.1	98.6	100.0	98.9	100.0	100.0	100.0	99.4	99.4	99.4	3 463
N**	1 168	551	1 719	40	19	59	215	49	264	709	179	888	2 496	989	3 485	3 485
fehlende Angaben	533	244	777	67	27	94	152	22	174	222	63	285	1 108	419	1 527	1 527
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.1	0.0	0.1	2.4	13.6	6.3	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	13
nein	99.9	100.0	99.9	97.6	86.4	93.8	98.6	100.0	98.9	100.0	100.0	100.0	99.6	99.6	99.6	3 509
N**	1 183	557	1 740	42	22	64	216	50	266	711	180	891	2 519	1 003	3 522	3 522
fehlende Angaben	518	238	756	65	24	89	151	21	172	220	62	282	1 085	405	1 490	1 490
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	50.0	66.7	57.1	0.0	0.0	0.0	100.0	-	100.0	0.0	0.0	0.0	30.8	28.6	30.0	6
nein	50.0	33.3	42.9	100.0	50.0	83.3	0.0	-	0.0	100.0	100.0	100.0	69.2	57.1	65.0	13
möchte nicht antworten	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	16.7	0.0	-	0.0	0	0.0	0.0	0.0	14.3	5.0	1
N**	4	3	7	4	2	6	1	0	1	1	1	2	13	7	20	20
fehlende Angaben	40	15	55	22	15	37	6	2	8	4	1	5	82	38	120	120
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	100.0	100.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	100.0	25.0	1
nein	0.0	0.0	0.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	0.0	75.0	3
N**	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	4
fehlende Angaben	4	1	5	4	3	7	1	0	1	0	0	0	13	5	18	18
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fehlende Angaben	1	0	1	1	3	4	3	0	3	0	0	0	9	4	13	13

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	0.0	10.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.4	1
15-16	27.3	10.0	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	4.8	9.6	7
17-18	22.7	30.0	25.0	30.8	25.0	28.6	20.0	0.0	20.0	50.0	0.0	50.0	28.8	23.8	27.4	20
19-20	9.1	10.0	9.4	23.1	12.5	19.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	13.5	9.5	12.3	9
21-25	31.8	20.0	28.1	23.1	25.0	23.8	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	26.9	33.3	28.8	21
26-30	0.0	10.0	3.1	7.7	12.5	9.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.5	6.8	5
30-39	4.5	10.0	6.3	15.4	25.0	19.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	7.7	14.3	9.6	7
ab 40	4.5	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	4.1	3
N**	22	10	32	13	8	21	5	0	5	4	0	4	52	21	73	73
<i>fehlende Angaben</i>	22	8	30	13	9	22	2	2	4	1	2	3	43	24	67	67

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	31.6	37.2	32.6	40.0	0.0	17.4	25.8	28.6
Heroin	1.0	2.0	3.9	0.0	6.7	0.0	0.2	0.0	0.0
Methadon	0.0	8.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Buprenorphin	0.1	3.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	14.3
andere Opioide	0.2	8.2	0.6	4.3	15.6	0.0	1.3	0.0	0.0
Kokain-Pulver	8.7	27.6	1.7	19.6	22.2	0.0	8.2	6.1	14.3
Crack-Kokain	0.2	1.0	1.4	2.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.4	5.1	5.3	0.0	11.1	0.0	3.4	0.0	14.3
Metamphetamine	0.2	1.0	1.4	4.3	2.2	0.0	0.3	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.8	5.1	5.0	15.2	13.3	0.0	6.3	0.0	28.6
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.3	0.0	2.2	0.0	0.3	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.4	17.3	2.2	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	14.3
GHB/GBL	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	1.0	0.0	2.2	4.4	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.7	4.1	2.8	6.5	6.7	0.0	1.8	0.0	0.0
Ketamin	0.0	1.0	0.3	0.0	2.2	0.0	0.3	0.0	14.3
andere Halluzinogene	0.1	2.0	0.6	2.2	6.7	0.0	1.1	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	11.4	33.7	31.0	39.1	44.4	100.0	-	21.2	28.6
Tabak	21.1	23.5	18.4	17.4	17.8	0.0	23.0	-	14.3
andere Substanz(en)	0.2	5.1	0.3	2.2	2.2	0.0	0.3	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.5	0.0	1.1	0.0	2.2	0.0	0.8	1.5	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.5	2.0	0.3	2.2	0.0	0.0	1.3	1.5	0.0
Essstörungen	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.2	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.7	0.0	0.8	0.0	2.2	0.0	1.0	1.5	0.0
kein weiteres Suchtproblem	66.1	29.6	39.7	28.3	26.7	0.0	61.2	56.1	42.9
N**	1 638	98	358	46	45	2	901	66	7
<i>fehlende Angaben</i>	63	9	9	0	2	0	30	1	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Frauen
Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	26.2	29.9	20.7	16.0	100.0	18.3	21.3	20.0
Heroin	0.5	2.4	4.5	3.4	4.0	0.0	1.3	2.1	0.0
Methadon	0.4	2.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.6	26.2	4.5	31.0	4.0	0.0	10.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.3	0.0	7.5	6.9	0.0	0.0	7.0	2.1	0.0
Metamphetamine	0.7	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.2	0.0	6.0	6.9	0.0	100.0	11.8	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.3	7.1	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	2.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.1	21.4	3.0	10.3	4.0	0.0	3.1	2.1	0.0
GHB/GBL	0.0	2.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.5	2.4	0.0	0.0	24.0	0.0	0.9	0.0	0.0
LSD	0.3	2.4	4.5	6.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
Ketamin	0.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	8.3	19.0	20.9	44.8	20.0	100.0	-	12.8	20.0
Tabak	19.0	14.3	16.4	20.7	28.0	0.0	28.4	-	20.0
andere Substanz(en)	0.3	2.4	3.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	3.1	2.4	4.5	6.9	4.0	0.0	3.9	12.8	40.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.7	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.9	2.1	0.0
kein weiteres Suchtproblem	69.4	40.5	44.8	24.1	44.0	0.0	56.3	57.4	60.0
N**	769	42	67	29	25	1	229	47	5
<i>fehlende Angaben</i>	<i>26</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzen	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	30.0	36.0	28.0	31.4	33.3	17.6	23.9	25.0
Heroin	0.9	2.1	4.0	1.3	5.7	0.0	0.4	0.9	0.0
Methadon	0.1	6.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
Buprenorphin	0.0	2.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	8.3
andere Opioide	0.2	7.9	0.5	2.7	10.0	0.0	1.4	0.0	0.0
Kokain-Pulver	7.4	27.1	2.1	24.0	15.7	0.0	8.6	3.5	8.3
Crack-Kokain	0.2	0.7	1.4	2.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.4	3.6	5.6	2.7	7.1	0.0	4.2	0.9	8.3
Metamphetamine	0.4	0.7	1.2	5.3	1.4	0.0	0.3	0.9	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.6	3.6	5.2	12.0	8.6	33.3	7.4	0.0	16.7
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzen	0.2	2.1	0.2	2.7	1.4	0.0	0.3	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	1.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.0	18.6	2.4	4.0	1.4	0.0	2.9	2.7	8.3
GHB/GBL	0.0	0.7	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	1.4	0.0	1.3	11.4	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.5	3.6	3.1	6.7	4.3	0.0	1.9	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.7	0.5	0.0	1.4	0.0	0.3	0.0	8.3
andere Halluzinogene	0.1	1.4	0.5	1.3	4.3	0.0	1.2	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	10.4	29.3	29.4	41.3	35.7	100.0	-	17.7	25.0
Tabak	20.4	20.7	18.1	18.7	21.4	0.0	24.1	-	16.7
andere Substanz(en)	0.2	4.3	0.7	2.7	1.4	0.0	0.3	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.4	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	0.6	0.9	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.5	1.4	0.2	1.3	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0
Essstörungen	1.3	1.4	0.7	2.7	1.4	33.3	1.0	5.3	16.7
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.7	0.0	0.7	1.3	1.4	0.0	1.0	1.8	0.0
kein weiteres Suchtproblem	67.2	32.9	40.5	26.7	32.9	0.0	60.2	56.6	50.0
N**	2 407	140	425	75	70	3	1 130	113	12
<i>fehlende Angaben</i>	89	13	13	1	4	0	43	1	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	3.4	5.9	0.0	4.8
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.8
Kokain-Pulver	0.9	0.0	0.0	0.8
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.6	2.0	12.5	4.0
Tabak	10.3	0.0	12.5	4.8
andere Substanz(en)	0.0	3.9	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	2.0	0.0	0.8
Computer-bzw. Internetsucht	5.2	-	0.0	5.6
Essstörungen	0.0	0.0	-	2.4
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2.6	2.0	12.5	-
kein weiteres Suchtproblem	80.2	88.2	75.0	81.5
N**	116	51	8	124
<i>fehlende Angaben</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>8</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	0.0	16.7	5.1	3.3
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	1.3	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	5.6	16.7	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	2.5	0.0
Tabak	5.6	0.0	5.1	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	16.7	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	3.3
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	88.9	83.3	91.1	93.3
N**	18	6	79	30
<i>fehlende Angaben</i>	3	1	3	4

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2020), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	3.0	7.0	4.6	4.5
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.6
Kokain-Pulver	0.7	0.0	0.0	0.6
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	1.1	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.7	1.8	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.2	1.8	3.4	3.2
Tabak	9.7	0.0	5.7	3.9
andere Substanz(en)	0.0	3.5	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	3.5	0.0	0.6
Computer-bzw. Internetsucht	4.5	-	0.0	4.5
Essstörungen	0.0	0.0	-	2.6
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2.2	1.8	1.1	-
kein weiteres Suchtproblem	81.3	87.7	89.7	83.8
N**	134	57	87	154
<i>fehlende Angaben</i>	17	5	3	12

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Hauptprobleme						
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N			
Alkohol*	Opioide			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	42.9	0.0	30.0	19.0	33.3	20.3	11.9	15.8	12.8	9.1	0.0	8.3	44.4	100.0	50.0	19.2	22.5	19.8	44
4-6 Tage pro Woche	21.4	16.7	20.0	9.5	0.0	8.7	16.4	5.3	14.0	18.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	12.6	5.0	11.3	25
2-3 Tage pro Woche	7.1	16.7	10.0	33.3	33.3	33.3	31.3	26.3	30.2	27.3	100.0	33.3	22.2	0.0	20.0	29.1	25.0	28.4	63
1 Tag pro Woche oder weniger	14.3	16.7	15.0	28.6	0.0	26.1	20.9	21.1	20.9	36.4	0.0	33.3	33.3	0.0	30.0	24.2	17.5	23.0	51
kein Konsum	14.3	50.0	25.0	9.5	33.3	11.6	19.4	31.6	22.1	9.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	14.8	30.0	17.6	39
N**	14	6	20	63	6	69	67	19	86	11	1	12	9	1	10	182	40	222	222
fehlende Angaben	93	40	133	304	65	369	864	223	1 087	36	26	62	316	143	459	3 663	2 207	5 870	5 870
Opioide*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	16.7	0.0	13.3	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	12.5	11.1	12.1	4
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	8.3	33.3	13.3	11.1	0.0	9.1	50.0	0.0	20.0	0.0	-	0.0	-	-	-	12.5	11.1	12.1	4
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	8.3	0.0	6.1	2
kein Konsum	75.0	66.7	73.3	55.6	100.0	63.6	50.0	100.0	80.0	100.0	-	100.0	-	-	-	66.7	77.8	69.7	23
N**	12	3	15	9	2	11	2	3	5	1	0	1	0	0	0	24	9	33	33
fehlende Angaben	1 689	792	2 481	358	69	427	929	239	1 168	46	27	73	325	144	469	3 821	2 238	6 059	6 059
Kokain*	Alkohol			Opioide			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	3.8	0.0	3.0	8.3	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	16.7	-	16.7	0.0	-	0.0	3.5	0.0	2.8	5
4-6 Tage pro Woche	5.1	4.5	5.0	8.3	0.0	5.9	2.6	0.0	2.2	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	4.2	5.4	4.5	8
2-3 Tage pro Woche	12.7	13.6	12.9	8.3	40.0	17.6	5.1	14.3	6.5	33.3	-	33.3	100.0	-	100.0	11.3	16.2	12.3	22
1 Tag pro Woche oder weniger	26.6	22.7	25.7	33.3	0.0	23.5	23.1	28.6	23.9	33.3	-	33.3	0.0	-	0.0	26.1	21.6	25.1	45
kein Konsum	51.9	59.1	53.5	41.7	60.0	47.1	69.2	57.1	67.4	16.7	-	16.7	0.0	-	0.0	54.9	56.8	55.3	99
N**	79	22	101	12	5	17	39	7	46	6	0	6	1	0	1	142	37	179	179
fehlende Angaben	1 622	773	2 395	95	41	136	892	235	1 127	41	27	68	324	144	468	3 703	2 210	5 913	5 913
Cannabis*	Alkohol			Opioide			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	28.4	21.6	26.8	50.0	60.0	52.0	36.5	50.0	37.5	63.6	100.0	66.7	16.7	100.0	28.6	34.9	32.2	34.3	103
4-6 Tage pro Woche	6.0	10.8	7.2	5.0	20.0	8.0	10.8	0.0	10.0	18.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	7.5	10.2	8.0	24
2-3 Tage pro Woche	14.7	2.7	11.8	10.0	20.0	12.0	10.8	0.0	10.0	18.2	0.0	16.7	16.7	0.0	14.3	12.9	3.4	11.0	33
1 Tag pro Woche oder weniger	12.1	16.2	13.1	15.0	0.0	12.0	12.2	16.7	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	15.3	12.7	38
kein Konsum	38.8	48.6	41.2	20.0	0.0	16.0	29.7	33.3	30.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	57.1	32.8	39.0	34.0	102
N**	116	37	153	20	5	25	74	6	80	11	1	12	6	1	7	241	59	300	300
fehlende Angaben	1 585	758	2 343	87	41	128	293	65	358	36	26	62	319	143	462	3 604	2 188	5 792	5 792

*Als weiteres Problem. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme			
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	33.3	8.3	5.3	0.0	4.0	-	-	-	2.1	5.3	3.0	6
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	2
2-3 Tage pro Woche	7.7	11.1	9.1	66.7	-	66.7	11.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	8.5	5.3	7.6	8
1 Tag pro Woche oder weniger	15.4	11.1	13.6	33.3	-	33.3	11.1	0.0	8.3	10.5	33.3	16.0	-	-	-	14.9	15.8	15.2	19
kein Konsum	76.9	77.8	77.3	0.0	-	0.0	77.8	66.7	75.0	84.2	66.7	80.0	-	-	-	74.5	73.7	74.2	58
N**	13	9	22	3	0	3	9	3	12	19	6	25	0	0	0	47	19	66	93
fehlende Angaben	1 688	786	2 474	104	46	150	358	68	426	912	236	1 148	325	144	469	3 798	2 228	6 026	6 359
Hypnotika/Sedativa*																			
täglich	100.0	-	100.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	33.3	-	33.3	1
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
kein Konsum	0.0	-	0.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	66.7	-	66.7	2
N**	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	3
fehlende Angaben	1 700	795	2 495	106	46	152	367	71	438	930	242	1 172	325	144	469	3 842	2 247	6 089	6 089
Halluzinogene*																			
täglich	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.2	0.0	2.5	1
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.2	0.0	2.5	1
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	50.0	25.0	0.0	20.0	16.7	33.3	20.0	-	-	-	19.4	11.1	17.5	7
kein Konsum	85.7	100.0	88.9	0.0	100.0	25.0	75.0	100.0	80.0	83.3	66.7	80.0	-	-	-	74.2	88.9	77.5	31
N**	7	2	9	3	1	4	8	2	10	12	3	15	0	0	0	31	9	40	40
fehlende Angaben	1 694	793	2 487	104	45	149	359	69	428	919	239	1 158	325	144	469	3 814	2 238	6 052	6 052
andere Substanzen*																			
täglich	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-	-	40.0	-	40.0	2
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	20.0	-	20.0	1
kein Konsum	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-	-	40.0	-	40.0	2
N**	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	5
fehlende Angaben	1 699	795	2 494	107	46	153	367	71	438	929	242	1 171	325	144	469	3 840	2 247	6 087	6 087

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	9.9	8.7	9.5	12.5	40.0	20.6	5.8	8.0	6.2	15.3	22.1	16.6	13.9	17.0	14.8	358
1-mal pro Monat oder weniger	3.6	5.4	4.2	29.2	0.0	20.6	18.2	24.0	19.2	30.6	32.7	31.0	13.8	12.7	13.5	326
2-4-mal pro Monat	7.8	6.8	7.5	8.3	0.0	5.9	24.8	20.0	24.0	34.0	33.6	34.0	18.0	13.4	16.7	404
2-3-mal pro Woche	16.4	15.5	16.1	25.0	40.0	29.4	31.4	32.0	31.5	14.9	8.0	13.6	17.0	14.9	16.4	396
4-mal oder mehr pro Woche	62.3	63.7	62.8	25.0	20.0	23.5	19.8	16.0	19.2	5.1	3.5	4.8	37.4	41.9	38.7	937
N**	913	427	1 340	24	10	34	121	25	146	470	113	583	1 722	699	2 421	2 421
<i>fehlende Angaben</i>	788	368	1 156	83	36	119	246	46	292	461	129	590	1 882	709	2 591	2 591
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.5	7.4	6.8	45.5	71.4	51.7	30.5	28.6	30.2	53.4	56.6	54.0	25.5	22.5	24.7	485
3 oder 4	17.2	18.0	17.5	40.9	0.0	31.0	32.4	47.6	34.9	31.0	32.5	31.2	23.7	23.4	23.6	464
5 oder 6	20.8	26.8	22.7	4.5	0.0	3.4	16.2	14.3	15.9	9.5	7.2	9.1	15.7	20.1	16.9	333
7 bis 9	21.8	25.2	22.9	4.5	0.0	3.4	6.7	9.5	7.1	4.0	1.2	3.5	14.1	17.8	15.1	298
10 oder mehr	33.8	22.5	30.2	4.5	28.6	10.3	14.3	0.0	11.9	2.1	2.4	2.2	21.0	16.2	19.7	387
N**	790	377	1 167	22	7	29	105	21	126	378	83	461	1 411	556	1 967	1 967
<i>fehlende Angaben</i>	911	418	1 329	85	39	124	262	50	312	553	159	712	2 193	852	3 045	3 045
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	11.6	15.1	12.7	42.1	50.0	44.0	29.0	36.4	30.3	50.2	59.6	52.1	29.7	34.5	31.1	669
weniger als 1-mal pro Monat	9.7	10.2	9.9	42.1	33.3	40.0	19.0	18.2	18.9	31.0	28.8	30.5	18.0	14.9	17.1	368
1-mal pro Monat	12.8	10.2	12.0	5.3	0.0	4.0	16.0	18.2	16.4	12.1	5.8	10.9	11.9	8.6	11.0	236
1-mal pro Woche	26.3	26.6	26.4	5.3	16.7	8.0	26.0	22.7	25.4	5.7	4.8	5.5	17.7	18.8	18.0	388
fast jeden Tag	39.6	37.9	39.1	5.3	0.0	4.0	10.0	4.5	9.0	1.0	1.0	1.0	22.7	23.2	22.8	491
N**	821	372	1 193	19	6	25	100	22	122	420	104	524	1 535	617	2 152	2 152
<i>fehlende Angaben</i>	880	423	1 303	88	40	128	267	49	316	511	138	649	2 069	791	2 860	2 860

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	38.0	44.5	40.1	27.3	0.0	17.6	24.3	12.5	22.8	28.8	25.4	28.1	35.9	40.5	37.2	796
1 Tag pro Woche oder weniger	1.8	0.6	1.4	4.5	0.0	2.9	1.9	0.0	1.6	4.3	4.5	4.4	2.5	1.6	2.2	47
2-3 Tage pro Woche	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.4	7.8	3.0	6.8	3.4	1.4	2.9	61
4-6 Tage pro Woche	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	3.5	2.2	3.2	1.4	1.0	1.3	27
einmal täglich	1.5	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	1.9	1.5	1.8	1.5	0.8	1.3	27
mehrmals täglich	57.5	52.8	55.9	68.2	100.0	79.4	69.2	87.5	71.5	53.7	63.4	55.8	55.4	54.7	55.2	1 179
N**	684	326	1 010	22	12	34	107	16	123	486	134	620	1 510	627	2 137	2 137
fehlende Angaben	1 017	469	1 486	85	34	119	260	55	315	445	108	553	2 094	781	2 875	2 875
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	24.1	25.3	24.4	46.7	18.2	34.6	34.7	42.9	36.0	58.8	61.1	59.3	38.9	36.4	38.2	466
11 bis 20	45.3	54.4	48.0	46.7	45.5	46.2	47.2	42.9	46.5	35.0	33.3	34.6	41.4	46.1	42.7	520
21 bis 30	20.2	13.9	18.4	0.0	18.2	7.7	13.9	14.3	14.0	5.0	2.2	4.4	13.3	11.7	12.9	157
31 und mehr	10.4	6.3	9.2	6.7	18.2	11.5	4.2	0.0	3.5	1.3	3.3	1.7	6.4	5.7	6.2	76
N**	386	158	544	15	11	26	72	14	86	320	90	410	887	332	1 219	1 219
fehlende Angaben	38	23	61	1	1	2	9	0	9	26	10	36	81	41	122	122

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	31.8	66.7	78.3	77.8	80.0	0.0	39.3	38.9	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.5	7.4	1.2	11.1	0.0	0.0	8.9	16.7	0.0
kontrollierter Konsum	31.7	11.1	6.0	0.0	20.0	100.0	29.5	33.3	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.0	3.7	10.8	11.1	0.0	0.0	17.0	11.1	0.0
anderes	0.4	11.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
N**	537	27	83	9	5	2	112	18	2
<i>fehlende Angaben</i>	1 164	80	284	37	42	0	819	49	6

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	41.2	71.4	69.2	50.0	0.0	100.0	36.6	60.0	50.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	14.8	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	9.8	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	28.7	28.6	7.7	0.0	50.0	0.0	24.4	0.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.4	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	7.3	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.4	0.0	23.1	25.0	0.0	0.0	19.5	40.0	50.0
anderes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
N**	216	7	13	4	4	1	41	5	2
<i>fehlende Angaben</i>	579	39	58	26	23	0	201	42	3

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2020), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	34.5	67.6	77.1	69.2	44.4	33.3	38.6	43.5	75.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	18.9	5.9	1.0	15.4	11.1	0.0	9.2	13.0	0.0
kontrollierter Konsum	30.8	14.7	6.3	0.0	33.3	66.7	28.1	26.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.6	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	5.2	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.8	2.9	12.5	15.4	0.0	0.0	17.6	17.4	25.0
anderes	0.4	8.8	3.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
N**	753	34	96	13	9	3	153	23	4
<i>fehlende Angaben</i>	1 743	119	342	63	65	0	1 020	91	9

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2020), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	29.4	34.4	37.7	33.3	100.0	50.0	16.5	46.7	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	25.4	28.1	31.1	33.3	80.0	100.0	12.8	40.0	33.3
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	13.2	15.6	19.7	16.7	40.0	50.0	9.2	13.3	33.3
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	14.2	12.5	29.5	33.3	40.0	50.0	16.5	13.3	33.3
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.7	0.0	9.8	0.0	20.0	0.0	3.7	0.0	0.0
Halluzinationen	1.7	3.1	6.6	0.0	20.0	0.0	2.8	6.7	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	9.2	0.0	14.8	0.0	20.0	50.0	6.4	13.3	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	22.4	18.8	18.0	0.0	80.0	0.0	17.4	26.7	0.0
ernsthafte Suizidgedanken	10.0	9.4	11.5	33.3	40.0	0.0	8.3	20.0	0.0
Suizidversuche	3.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	2.8	13.3	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.7	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	1.8	6.7	0.0
keine	43.5	50.0	37.7	50.0	0.0	0.0	66.1	33.3	66.7
N**	402	32	61	6	5	2	109	15	3
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 299</i>	<i>75</i>	<i>306</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>822</i>	<i>52</i>	<i>5</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2020), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	46.5	60.0	40.0	33.3	50.0	100.0	31.6	16.7	66.7
schwere Angst- und Spannungszustände	38.2	30.0	40.0	0.0	50.0	100.0	26.3	50.0	66.7
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	17.6	10.0	40.0	0.0	25.0	100.0	10.5	0.0	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	17.6	20.0	40.0	0.0	25.0	100.0	10.5	0.0	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
Halluzinationen	1.8	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	15.8	16.7	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	35.9	30.0	60.0	0.0	75.0	0.0	23.7	16.7	33.3
ernsthafte Suizidgedanken	10.0	10.0	0.0	0.0	50.0	0.0	10.5	16.7	0.0
Suizidversuche	4.7	10.0	0.0	0.0	25.0	0.0	5.3	16.7	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.9	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
keine	27.1	40.0	20.0	33.3	25.0	0.0	39.5	50.0	33.3
N**	170	10	5	3	4	1	38	6	3
<i>fehlende Angaben</i>	<i>625</i>	<i>36</i>	<i>66</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>41</i>	<i>2</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2020), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	34.4	40.5	37.9	33.3	77.8	66.7	20.4	38.1	50.0
schwere Angst- und Spannungszustände	29.2	28.6	31.8	22.2	66.7	100.0	16.3	42.9	50.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	14.5	14.3	21.2	11.1	33.3	66.7	9.5	9.5	16.7
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	15.2	14.3	30.3	22.2	33.3	66.7	15.0	9.5	16.7
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.6	0.0	9.1	0.0	11.1	0.0	4.1	0.0	0.0
Halluzinationen	1.7	2.4	7.6	0.0	11.1	0.0	2.7	4.8	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	10.0	0.0	13.6	0.0	11.1	66.7	8.8	14.3	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	26.4	21.4	21.2	0.0	77.8	0.0	19.0	23.8	16.7
ernsthafte Suizidgedanken	10.0	9.5	10.6	22.2	44.4	0.0	8.8	19.0	0.0
Suizidversuche	3.5	2.4	1.5	0.0	11.1	0.0	3.4	14.3	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.5	0.0	7.6	11.1	0.0	0.0	2.0	4.8	0.0
keine	38.6	47.6	36.4	44.4	11.1	0.0	59.2	38.1	50.0
N**	572	42	66	9	9	3	147	21	6
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 924</i>	<i>111</i>	<i>372</i>	<i>67</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>1 026</i>	<i>93</i>	<i>7</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2020)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	38.9	36.4	37.0	398
Tochter/Sohn	18.8	12.3	13.8	148
Schwester/Bruder	1.7	4.1	3.5	38
Ehe-/LebenspartnerIn	29.7	40.1	37.8	407
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	3.3	2.3	2.5	27
KollegIn/FreundIn	4.2	3.1	3.3	36
ArbeitgeberIn/LehrerIn	0.4	0.0	0.1	1
VormundIn/BeistandIn	0.4	0.0	0.1	1
anderes	2.5	1.7	1.9	20
N**	239	837	1 076	1 076
<i>fehlende Angaben</i>	2	2	4	4

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2020)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	55.2	384
Heroin	1.9	13
Methadon	0.0	0
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.0	0
andere Opioide	0.6	4
Kokain-Pulver	9.8	68
Crack-Kokain	0.3	2
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	0.3	2
Metamphetamine	0.4	3
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	5
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	1.1	8
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	18.7	130
Tabak	0.9	6
andere Substanz(en)	0.6	4
Glücksspielsucht	2.3	16
Computer-bzw. Internetsucht	5.6	39
Essstörungen	0.3	2
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.4	10
N**	696	696
<i>fehlende Angaben</i>	384	384

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	69.4			67.2			84.7			78.6			23.2			63.0		3 808	
Frauen	30.6			32.8			15.3			21.4			76.8			37.0		2 233	
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 808	2 233	6 041	6 041
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.7	3.2	4.7	1.9	2.6	1.5	1.8	1.6	97
15-19	1.7	2.0	1.8	2.9	1.5	2.5	3.3	1.7	3.1	58.1	53.8	57.2	6.7	1.3	2.6	17.5	9.1	14.4	869
20-24	2.8	2.5	2.7	5.1	1.5	3.9	12.0	13.3	12.2	12.0	15.7	12.8	5.1	4.2	4.4	7.0	5.8	6.5	394
25-29	6.5	3.8	5.7	7.3	11.9	8.8	20.8	26.7	21.7	10.8	9.7	10.6	2.8	5.5	4.9	9.1	6.9	8.3	500
30-34	9.6	7.7	9.1	8.8	16.4	11.3	20.5	30.0	21.9	5.8	5.1	5.6	4.3	9.3	8.2	9.8	9.0	9.5	575
35-39	12.2	11.2	11.9	15.3	13.4	14.7	20.2	15.0	19.4	5.3	5.1	5.2	5.5	9.9	8.9	10.6	9.7	10.3	622
40-44	11.8	13.5	12.3	13.9	16.4	14.7	9.6	5.0	8.9	2.6	2.1	2.5	7.1	10.8	9.9	8.9	10.0	9.3	561
45-49	12.6	12.8	12.6	13.9	17.9	15.2	7.2	1.7	6.4	2.2	1.7	2.1	13.4	14.4	14.2	8.9	11.5	9.9	595
50-54	15.5	14.1	15.0	20.4	16.4	19.1	4.8	1.7	4.3	0.2	1.7	0.5	15.0	15.0	15.0	10.1	12.3	10.9	659
55-59	10.7	12.9	11.4	7.3	3.0	5.9	1.2	3.3	1.5	0.1	0.4	0.2	11.5	11.4	11.4	6.6	9.6	7.7	466
60-64	7.5	8.2	7.7	2.9	0.0	2.0	0.3	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	8.7	7.3	7.6	4.4	6.2	5.1	306
65-69	4.3	5.2	4.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.5	5.5	5.5	2.7	4.4	3.3	200
70 -74	2.8	3.1	2.9	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.6	2.2	1.7	1.8	1.7	105
75 und mehr	1.8	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.9	2.7	1.2	1.8	1.4	87
N**	1 741	765	2 506	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	835	1 088	3 808	2 228	6 036	6 036
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	5	5
Alter																			
Mittelwert	46.9	48.4	47.3	43.0	40.9	42.3	34.2	32.5	33.9	22.4	22.5	22.4	47.4	46.4	46.6	38.4	42.9	40.0	
Standardabweichung	13.5	13.6	13.5	11.6	9.7	11.1	9.0	8.7	8.9	8.4	8.7	8.4	17.9	14.2	15.1	16.2	15.9	16.2	
1. Quartil	36.7	38.8	37.4	35.1	33.0	34.5	27.6	27.7	27.7	17.0	16.8	17.0	36.3	36.7	36.7	24.4	30.8	26.6	
Medianwert	47.4	48.6	47.8	43.6	43.5	43.5	33.1	30.9	32.4	18.2	18.4	18.3	50.0	47.5	48.1	37.5	43.8	39.6	
3. Quartil	56.1	57.8	56.6	51.9	47.3	51.1	39.5	35.7	38.9	25.7	25.4	25.6	59.1	56.1	56.5	50.9	54.5	52.3	
N**	1 741	765	2 506	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	835	1 088	3 808	2 228	6 036	
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	5	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Zivilstand*																						
ledig	43.9	31.8	40.0	73.5	61.9	70.0	72.6	90.9	75.6	92.9	91.0	92.5	32.9	28.3	29.2	62.5	45.9	56.6	1 747			
verheiratet	32.0	31.2	31.7	10.2	23.8	14.3	21.2	4.5	18.5	3.7	5.8	4.2	49.4	50.0	49.9	22.4	29.9	25.1	775			
getrennt	4.8	5.6	5.1	2.0	0.0	1.4	2.7	0.0	2.2	0.4	0.0	0.3	6.3	3.0	3.7	3.1	3.5	3.3	101			
geschieden	18.0	24.6	20.1	12.2	14.3	12.9	2.7	4.5	3.0	1.5	1.3	1.4	10.1	17.1	15.7	10.6	16.6	12.8	394			
verwitwet	1.2	6.8	2.9	2.0	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	1.5	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	4.0	2.2	68			
reg. Partnerschaft	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	4			
N**	953	443	1 396	49	21	70	113	22	135	535	156	691	79	304	383	1 982	1 107	3 089	3 089			
fehlende Angaben	788	323	1 111	88	46	134	219	38	257	334	80	414	174	535	709	1 826	1 126	2 952	2 952			
Urbanitätsgrad*																						
Grossstadtzentren	14.1	12.1	13.4	1.6	0.0	1.1	14.5	25.0	16.3	2.6	4.5	3.1	19.3	20.5	20.2	9.6	12.1	10.5	383			
Umland der Grossstadtzentren	16.4	15.4	16.1	11.3	0.0	8.0	18.1	7.1	16.3	4.6	1.7	4.0	0.0	2.5	2.0	11.2	7.5	9.9	359			
Mittelzentren	13.3	16.0	14.1	1.6	12.0	4.6	17.4	17.9	17.5	29.4	23.9	28.2	23.9	24.6	24.4	19.3	20.3	19.7	717			
Kleinzentren	29.2	28.7	29.1	41.9	68.0	49.4	33.3	28.6	32.5	31.3	33.5	31.8	28.4	24.8	25.6	31.0	30.0	30.6	1 116			
rural	27.1	27.7	27.3	43.5	20.0	36.8	16.7	21.4	17.5	32.1	36.4	33.0	28.4	27.6	27.8	28.9	30.0	29.3	1 067			
N**	1 109	505	1 614	62	25	87	138	28	166	608	176	784	109	395	504	2 325	1 317	3 642	3 642			
fehlende Angaben	632	261	893	75	42	117	194	32	226	261	60	321	144	444	588	1 483	916	2 399	2 399			

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	42.0	34.4	39.7	54.9	47.4	52.5	33.2	31.4	32.9	9.4	16.0	10.8	13.6	12.5	12.7	31.3	26.2	29.6	1 140
mit Herkunftsfamilie	5.9	5.2	5.7	11.0	5.3	9.2	17.3	8.6	16.1	70.3	52.1	66.5	12.3	9.5	10.1	25.4	15.8	22.2	855
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	43.7	55.5	47.3	22.0	39.5	27.5	36.9	51.4	39.0	8.9	12.9	9.7	64.2	74.7	72.4	33.4	51.0	39.2	1 511
mit Freunden/anderen Personen	2.6	2.3	2.5	4.9	0.0	3.3	3.3	2.9	3.2	2.4	3.1	2.6	3.7	2.4	2.7	2.7	2.4	2.6	101
Haft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
therap. Einrichtung/Wohnheim	3.3	0.9	2.5	4.9	2.6	4.2	5.1	0.0	4.4	3.6	6.7	4.2	1.2	0.7	0.8	3.3	1.7	2.8	108
Spital/Klinik	0.4	0.5	0.4	0.0	2.6	0.8	0.5	2.9	0.8	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	16
anderes	2.1	1.1	1.8	2.4	2.6	2.5	3.3	2.9	3.2	5.0	9.2	5.9	4.9	0.3	1.3	3.5	2.3	3.1	119
N**	1 258	555	1 813	82	38	120	214	35	249	617	163	780	81	296	377	2 576	1 276	3 852	3 852
fehlende Angaben	483	211	694	55	29	84	118	25	143	252	73	325	172	543	715	1 232	957	2 189	2 189
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	95.2	96.0	95.5	90.5	83.3	88.3	92.7	97.4	93.4	92.7	91.2	92.4	94.8	97.5	97.0	94.2	95.5	94.6	3 833
instabile Wohnsituation	2.5	2.1	2.4	7.1	8.3	7.5	2.3	0.0	1.9	2.8	3.5	3.0	4.2	1.9	2.4	2.7	2.3	2.6	105
Haft	0.1	0.0	0.1	0.0	2.8	0.8	1.4	0.0	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	9
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.1	1.9	2.1	2.4	5.6	3.3	3.7	2.6	3.5	4.3	5.3	4.5	1.0	0.5	0.6	2.8	2.1	2.5	103
N**	1 305	570	1 875	84	36	120	219	39	258	632	170	802	96	366	462	2 673	1 377	4 050	4 050
fehlende Angaben	436	196	632	53	31	84	113	21	134	237	66	303	157	473	630	1 135	856	1 991	1 991
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	39.8	39.9	39.9	69.2	42.9	60.0	38.4	41.2	38.8	73.3	56.5	69.7	26.5	25.9	26.0	49.9	38.7	45.9	1 184
zeitweilige Beziehung(en)	3.0	3.6	3.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.6	4.0	3.7	4.0	4.4	1.2	1.9	3.1	3.1	3.1	80
feste Beziehung, getrennt lebend	10.2	7.8	9.4	5.1	4.8	5.0	16.1	11.8	15.5	12.8	21.3	14.7	7.4	11.4	10.5	10.6	10.8	10.7	275
feste Beziehung, zus. lebend	47.0	48.7	47.5	25.6	52.4	35.0	43.8	47.1	44.2	9.8	18.5	11.7	61.8	61.6	61.6	36.4	47.5	40.3	1 039
N**	856	386	1 242	39	21	60	112	17	129	397	108	505	68	255	323	1 668	910	2 578	2 578
fehlende Angaben	885	380	1 265	98	46	144	220	43	263	472	128	600	185	584	769	2 140	1 323	3 463	3 463

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlichlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	57.7	45.7	54.0	31.9	25.0	29.9	66.1	70.8	66.9	23.9	21.9	23.5	59.1	66.8	65.2	46.9	49.2	47.7	1 505
Ersparnisse	1.1	0.5	0.9	4.3	5.0	4.5	0.8	0.0	0.7	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.7	21
Rente (AHV/IV u.a.)	17.8	23.9	19.7	27.7	25.0	26.9	3.2	8.3	4.1	2.0	4.0	2.4	19.4	11.3	12.9	12.1	16.2	13.6	430
Sozialhilfe/Fürsorge	13.7	9.4	12.4	23.4	35.0	26.9	8.9	16.7	10.1	7.4	11.3	8.2	3.2	1.4	1.8	11.1	7.3	9.7	307
Arbeitslosenversicherung	4.8	3.7	4.5	2.1	0.0	1.5	6.5	0.0	5.4	0.9	2.0	1.2	1.1	1.7	1.6	3.3	2.2	2.9	92
durch PartnerIn	1.5	10.8	4.4	2.1	0.0	1.5	3.2	4.2	3.4	2.4	1.3	2.2	1.1	10.4	8.5	1.8	8.5	4.2	133
durch Eltern/Angehörige	1.7	3.9	2.4	6.4	5.0	6.0	4.8	0.0	4.1	61.9	56.3	60.7	15.1	7.9	9.4	22.1	14.8	19.4	612
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Prostitution	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	4
Taggeldversicherung	0.6	0.7	0.7	0.0	5.0	1.5	1.6	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.5	16
anderes	0.9	1.1	1.0	2.1	0.0	1.5	4.8	0.0	4.1	0.6	2.0	0.9	1.1	0.6	0.7	1.1	0.9	1.0	32
N**	949	435	1 384	47	20	67	124	24	148	544	151	695	93	355	448	2 009	1 145	3 154	3 154
fehlende Angaben	792	331	1 123	90	47	137	208	36	244	325	85	410	160	484	644	1 799	1 088	2 887	2 887
Hauptsächlichlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	54.1	30.6	46.8	18.6	16.7	18.0	55.3	58.8	55.8	12.6	12.4	12.6	51.3	45.0	46.3	39.4	32.5	37.0	1 027
Teilzeitarbeit	5.8	23.3	11.2	11.6	5.6	9.8	3.9	17.6	5.8	2.9	7.3	3.8	6.4	30.2	25.0	4.8	20.9	10.4	288
Gelegenheitsjobs	2.0	0.0	1.4	2.3	5.6	3.3	1.9	0.0	1.7	0.6	0.7	0.6	0.0	0.4	0.3	1.3	0.4	1.0	27.0
in Ausbildung	2.8	4.6	3.3	2.3	5.6	3.3	5.8	11.8	6.7	70.7	62.8	69.0	15.4	10.4	11.5	26.9	18.9	24.2	670
arbeitslos und aktive Stellensuche	8.3	8.3	8.3	9.3	5.6	8.2	13.6	5.9	12.5	3.3	4.4	3.5	3.8	1.4	2.0	6.3	4.8	5.8	160
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	6.0	5.9	6.0	14.0	22.2	16.4	6.8	0.0	5.8	2.7	4.4	3.0	0.0	0.4	0.3	4.9	3.8	4.5	125
Rentner/Rentnerin	10.5	13.9	11.5	4.7	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	7.6	9.3	6.0	8.5	6.9	191
Arbeitsunfähigkeit	6.0	5.4	5.8	20.9	22.2	21.3	7.8	0.0	6.7	1.3	2.9	1.7	3.8	1.1	1.7	4.9	4.3	4.7	131
Hausfrau/-mann	0.1	3.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	0.1	2.0	0.7	20.0
anderes	4.4	4.8	4.6	16.3	16.7	16.4	4.9	5.9	5.0	5.9	5.1	5.8	3.8	1.4	2.0	5.4	3.8	4.9	135
N**	832	373	1 205	43	18	61	103	17	120	522	137	659	78	278	356	1 808	966	2 774	2 774
fehlende Angaben	909	393	1 302	94	49	143	229	43	272	347	99	446	175	561	736	2 000	1 267	3 267	3 267

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	28.6	36.7	31.2	35.7	75.0	44.4	23.4	10.0	21.6	17.6	13.0	16.5	25.0	26.7	26.3	25.5	32.3	27.5	309
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	1.5	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	4.7	20.0	6.8	31.8	15.2	27.8	0.0	0.0	0.0	8.5	4.6	7.4	83
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.0	2.7	2.9	3.6	0.0	2.8	6.3	0.0	5.4	2.7	2.2	2.6	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	2.8	31
angelernete(r) ArbeiterIn	4.5	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.7	0.0	0.5	0.0	6.7	5.3	3.4	1.5	2.8	32
gelernte(r) ArbeiterIn	11.5	10.0	11.0	17.9	12.5	16.7	23.4	10.0	21.6	8.8	8.7	8.8	0.0	0.0	0.0	12.8	9.5	11.8	133
VorarbeiterIn	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.4	2.0	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	1.4	16
einfache(r) Angestellte(r)	17.7	26.7	20.6	21.4	12.5	19.4	14.1	50.0	18.9	11.5	15.2	12.4	25.0	33.3	31.6	15.8	25.6	18.7	210
mittlere Angestellte® / Kader	14.5	12.7	13.9	10.7	0.0	8.3	7.8	10.0	8.1	4.7	2.2	4.1	25.0	26.7	26.3	11.5	11.0	11.4	128
leitende/r Angestellte(r)/Kader	5.8	1.4	4.3	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	3.6	1.2	2.9	33
selbständig	9.2	4.5	7.7	7.1	0.0	5.6	9.4	0.0	8.1	1.4	2.2	1.5	25.0	0.0	5.3	7.3	4.3	6.4	72
SchülerIn/StudentIn	0.9	0.5	0.7	3.6	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	18.2	30.4	21.1	0.0	6.7	5.3	5.4	4.9	5.2	59
andere Stellung	1.5	1.8	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.7	6.5	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.7	19
N**	469	221	690	28	8	36	64	10	74	148	46	194	4	15	19	797	328	1 125	1 125
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 272</i>	<i>545</i>	<i>1 817</i>	<i>109</i>	<i>59</i>	<i>168</i>	<i>268</i>	<i>50</i>	<i>318</i>	<i>721</i>	<i>190</i>	<i>911</i>	<i>249</i>	<i>824</i>	<i>1 073</i>	<i>3 011</i>	<i>1 905</i>	<i>4 916</i>	<i>4 916</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	48.3	50.8	49.1	26.3	22.4	25.0	41.3	40.7	41.2	62.4	56.8	61.2	65.2	74.3	72.2	52.2	60.2	55.1	3 322
planm. Beendigung mit Übertritt	6.7	7.3	6.9	16.1	6.0	12.7	5.7	10.2	6.4	4.6	6.8	5.1	4.0	2.7	3.0	6.3	5.8	6.1	369
Wohnortwechsel	2.5	2.5	2.5	2.9	9.0	4.9	3.6	5.1	3.8	1.0	0.0	0.8	0.8	0.6	0.6	2.0	1.5	1.8	111
Hospitalisierung	0.9	0.9	0.9	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.5	31
Inhaftierung	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
Kontaktverlust	31.6	28.8	30.7	29.2	41.8	33.3	38.0	33.9	37.3	21.7	25.0	22.4	19.0	16.1	16.8	28.5	23.1	26.5	1 598
expliziter Abbruch	6.2	6.6	6.3	14.6	9.0	12.7	8.4	6.8	8.2	6.4	8.1	6.8	4.0	3.1	3.3	6.5	5.5	6.1	370
Tod	2.2	2.0	2.1	5.1	7.5	5.9	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	1.4	1.0	1.3	78
anderer Grund	1.5	1.2	1.4	2.9	4.5	3.4	1.8	3.4	2.0	3.5	2.5	3.3	6.7	3.0	3.8	2.3	2.3	2.3	139
N**	1 737	758	2 495	137	67	204	332	59	391	869	236	1 105	253	838	1 091	3 804	2 223	6 027	6 027
fehlende Angaben	4	8	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	10	14	14

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stationäre Therapie	43.9	33.3	40.5	25.0	0.0	21.1	50.0	100.0	54.5	29.2	12.5	25.0	0.0	25.0	20.0	37.4	29.7	34.9	80
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.2	5.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.7	4
ambulante Behandlung	43.9	48.7	45.5	56.3	100.0	63.2	40.0	0.0	36.4	50.0	50.0	50.0	100.0	37.5	50.0	46.5	48.6	47.2	108
Aussenwohngruppe	1.2	2.6	1.7	6.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.7	4
andere Stelle/Institution	9.8	10.3	9.9	12.5	0.0	10.5	10.0	0.0	9.1	20.8	37.5	25.0	0.0	37.5	30.0	13.5	16.2	14.4	33
N**	82	39	121	16	3	19	10	1	11	24	8	32	2	8	10	155	74	229	229
fehlende Angaben	35	16	51	6	1	7	9	5	14	16	8	24	8	15	23	86	54	140	140

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

Todesursache****	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	9.1	50.0	17.9	25.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	16.1	30.0	19.5	8
Unfall	4.5	0.0	3.6	25.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	4.9	2
Krankheit	72.7	50.0	67.9	50.0	100.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	61.3	70.0	63.4	26
Überdosis bzw. Vergiftung	4.5	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	4.9	2
andere Todesursache	9.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	7.3	3
N**	22	6	28	4	3	7	2	0	2	0	0	0	1	1	2	31	10	41	41
fehlende Angaben	16	9	25	3	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	13	37	37

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dauer der Behandlung (%)*																			
1 Woche oder weniger	3.9	4.4	4.1	2.9	1.5	2.5	4.5	8.3	5.1	4.3	5.5	4.5	10.7	9.7	9.9	4.4	6.2	5.1	308
> 1 Woche bis 1 Monat	3.3	2.3	3.0	3.6	3.0	3.4	1.8	0.0	1.5	9.9	9.3	9.8	5.9	5.0	5.2	4.9	4.2	4.6	278
> 1 Monat bis 2 Monate	4.6	3.7	4.3	3.6	0.0	2.5	4.2	3.3	4.1	9.1	12.3	9.8	2.8	6.4	5.6	5.5	5.5	5.5	330
> 2 bis 3 Monate	4.7	3.7	4.4	8.0	1.5	5.9	4.8	6.7	5.1	9.4	6.4	8.8	6.7	5.1	5.5	6.0	4.5	5.4	328
> 3 bis 6 Monate	12.2	12.7	12.3	8.0	11.9	9.3	13.9	16.7	14.3	15.2	15.7	15.3	18.2	15.7	16.3	13.2	14.2	13.5	817
> 6 Monate bis 1 Jahr	29.5	29.9	29.6	16.8	19.4	17.6	34.3	30.0	33.7	30.6	28.4	30.1	34.0	30.6	31.4	30.8	30.5	30.7	1 853
> 1 Jahr bis 2 Jahre	21.6	22.3	21.8	16.1	20.9	17.6	22.0	21.7	21.9	14.7	16.9	15.2	17.8	18.6	18.4	19.8	20.8	20.2	1 217
> 2 bis 3 Jahre	8.8	8.4	8.7	13.1	7.5	11.3	6.6	10.0	7.1	3.2	3.0	3.2	2.0	3.9	3.5	6.8	5.8	6.4	387
> 3 bis 5 Jahre	5.8	6.9	6.1	11.7	14.9	12.7	5.1	1.7	4.6	2.8	1.3	2.4	1.6	3.2	2.8	4.9	4.8	4.8	292
> 5 bis 10 Jahre	4.0	4.8	4.3	10.2	13.4	11.3	1.8	1.7	1.8	0.7	1.3	0.8	0.4	1.0	0.8	2.8	2.8	2.8	168
mehr als 10 Jahre	1.6	0.9	1.4	5.8	6.0	5.9	0.9	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.5	1.1	0.8	1.0	58
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 804	2 232	6 036	6 036
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	77.1	77.4	77.2	140.2	162.5	147.5	63.1	51.7	61.3	38.6	35.3	37.9	36.5	48.2	45.5	64.4	62.0	63.5	
Standardabweichung	110.3	99.4	107.1	195.6	178.8	190.1	80.8	51.5	77.1	51.8	45.1	50.5	38.6	82.9	75.2	96.3	91.5	94.5	
1. Quartil	20.7	21.6	20.9	20.1	29.9	25.4	20.9	15.9	20.0	8.4	7.7	8.3	11.1	11.1	11.1	15.4	15.3	15.4	
Medianwert	43.9	44.5	44.0	65.9	84.3	72.1	41.8	33.8	40.4	25.9	24.6	25.6	26.9	28.9	28.2	37.4	35.9	37.0	
3. Quartil	87.3	88.7	88.1	169.7	229.4	226.0	72.5	72.4	72.4	47.6	49.9	48.6	47.1	55.1	53.5	70.6	71.0	70.9	
N**	1 741	766	2 507	137	67	204	332	60	392	869	236	1 105	253	839	1 092	3 804	2 232	6 036	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	99.4	99.5	99.5	83.6	90.9	85.7	99.1	100.0	99.2	100.0	100.0	100.0	99.1	99.3	99.2	2 579
ja	0.6	0.5	0.5	16.4	9.1	14.3	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	21
N**	883	398	1 281	55	22	77	106	19	125	553	146	699	1 849	751	2 600	2 600
fehlende Angaben	858	368	1 226	82	45	127	226	41	267	316	90	406	1 706	643	2 349	2 349
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
Methadon	40.0	100.0	57.1	77.8	100.0	81.8	100.0	-	100.0	-	-	-	66.7	100.0	73.7	14
andere Opiate	20.0	0.0	14.3	22.2	0.0	18.2	0.0	-	0.0	-	-	-	20.0	0.0	15.8	3
andere Substanzen	40.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	13.3	0.0	10.5	2
N**	5	2	7	9	2	11	1	0	1	0	0	0	15	4	19	19
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.8	99.2	99.6	71.8	82.4	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2	99.1	99.2	2 343
ja	0.2	0.8	0.4	28.2	17.6	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	19
N**	815	369	1 184	39	17	56	89	18	107	507	130	637	1 680	682	2 362	2 362
fehlende Angaben	926	397	1 323	98	50	148	243	42	285	362	106	468	1 875	712	2 587	2 587
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	0.0	33.3	20.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	16.7	5.3	1
Substitution	100.0	66.7	80.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	83.3	94.7	18
N**	2	3	5	11	3	14	0	0	0	0	0	0	13	6	19	19
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	90.4	85.8	89.0	91.5	85.7	90.2	91.2	71.4	89.3	97.8	92.9	96.6	92.6	87.1	91.1	1 158
ja	9.6	14.2	11.0	8.5	14.3	9.8	8.8	28.6	10.7	2.2	7.1	3.4	7.4	12.9	8.9	113
N**	531	233	764	47	14	61	68	7	75	180	56	236	922	349	1 271	1 271
fehlende Angaben	1 210	533	1 743	90	53	143	264	53	317	689	180	869	2 633	1 045	3 678	3 678
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	0.0	3.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.0	1
fremde Aussenwohngruppe	6.4	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	3.9	4
fremde Nachsorgestelle	34.0	25.8	30.8	50.0	0.0	33.3	75.0	100.0	80.0	50.0	0.0	28.6	37.1	22.0	31.1	32
Alkoholberatungsstelle	25.5	35.5	29.5	25.0	50.0	33.3	25.0	0.0	20.0	25.0	33.3	28.6	24.2	31.7	27.2	28
Drogenberatungsstelle	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	14.3	6.5	0.0	3.9	4
andere Beratungsstelle	14.9	12.9	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	12.9	19.5	15.5	16
Selbsthilfegruppe	8.5	3.2	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	20.0	0.0	0.0	0.0	6.5	4.9	5.8	6
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	14.9	16.1	15.4	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	12.9	19.5	15.5	16
N**	47	31	78	4	2	6	4	1	5	4	3	7	62	41	103	103
fehlende Angaben	4	2	6	0	0	0	2	1	3	0	1	1	6	4	10	10

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2020)

Suchtprobleme bei Austritt*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	78.4	82.4	79.6	23.9	35.5	27.5	23.4	7.1	21.2	13.1	16.0	13.7	52.5	61.6	55.0	1 257
Heroin	1.1	1.9	1.4	57.7	48.4	54.9	2.3	3.6	2.5	0.4	2.7	0.8	3.8	4.2	3.9	89
Methadon	0.4	1.0	0.6	8.5	9.7	8.8	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.7	1.3	0.8	19
Buprenorphin	0.3	0.7	0.4	1.4	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.3	0.6	0.4	9
Fentanyl	0.3	0.7	0.4	0.0	3.2	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.3	0.8	0.4	10
andere Opioide	0.6	0.7	0.7	7.0	6.5	6.9	0.6	0.0	0.5	0.7	1.3	0.8	1.1	1.0	1.0	24
Kokain-Pulver	5.1	3.6	4.6	22.5	25.8	23.5	74.3	67.9	73.4	4.6	6.7	5.0	13.2	8.1	11.8	270
Crack-Kokain	0.3	0.7	0.4	1.4	0.0	1.0	4.0	3.6	3.9	0.0	1.3	0.3	0.7	0.8	0.7	16
anderer Kokain-Typ	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.3	0.3	0.2	0.6	0.3	8
Amphetamine	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	3.9	1.1	1.3	1.1	1.5	1.1	1.4	32
Metamphetamine	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.4	1.0	0.5	12
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	2.5	5.3	3.1	1.1	1.5	1.2	28
synthetische Cathinone	0.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	1.3	0.6	0.2	0.8	0.4	9
andere Stimulanzien	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.2	1.0	0.4	9
Barbiturate	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.2	0.6	0.3	8
Benzodiazepine	1.0	1.4	1.2	16.9	16.1	16.7	1.1	0.0	1.0	0.7	4.0	1.4	2.2	4.5	2.8	64
GHB/GBL	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.4	0.6	0.4	10
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	0.7	0.4	0.0	3.2	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.4	1.1	0.6	14
LSD	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.5	1.1	1.3	1.1	0.7	0.8	0.7	17
Ketamin	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.3	0.3	0.4	0.6	0.4	10
andere Halluzinogene	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	1.3	0.6	0.4	0.6	0.4	10
flüchtige Stoffe	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	8
Cannabis	4.7	3.9	4.4	11.3	32.3	17.6	12.6	7.1	11.8	70.9	80.0	72.8	17.6	15.3	17.0	389
Tabak	9.4	10.6	9.8	7.0	19.4	10.8	8.0	7.1	7.9	8.9	16.0	10.4	9.2	11.1	9.7	222
andere Substanz(en)	0.6	0.5	0.6	1.4	0.0	1.0	1.1	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	1.0	0.8	1.0	22
Glücksspielsucht	0.6	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	3.0	2.3	2.8	64
Computer-bzw. Internetsucht	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.8	2.5	1.3	2.2	50
Essstörungen	0.5	2.2	1.0	0.0	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.6	0.4	3.5	1.2	28
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.4	1.0	0.6	0.0	3.2	1.0	1.7	0.0	1.5	0.0	1.3	0.3	1.0	1.3	1.1	25
keine	19.0	16.7	18.3	12.7	6.5	10.8	17.1	14.3	16.7	23.4	10.7	20.7	19.5	15.6	18.5	422
N**	966	414	1 380	71	31	102	175	28	203	282	75	357	1 667	620	2 287	2 287
fehlende Angaben	775	352	1 127	66	36	102	157	32	189	587	161	748	1 888	774	2 662	2 662

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	51.5	37.2	47.3	50.0	33.3	45.0	45.5	66.7	47.2	65.9	61.1	65.1	54.1	38.3	50.0	368
einmal	7.8	8.8	8.1	7.1	16.7	10.0	3.0	0.0	2.8	12.5	0.0	10.4	8.3	8.8	8.4	62
zweimal	10.0	8.1	9.4	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	16.7	2.3	0.0	1.9	8.3	6.7	7.9	58
drei- oder viermal	11.4	18.9	13.6	7.1	0.0	5.0	9.1	0.0	8.3	6.8	5.6	6.6	10.5	18.1	12.5	92
fünfmal oder mehr	19.4	27.0	21.6	35.7	50.0	40.0	24.2	33.3	25.0	12.5	33.3	16.0	18.8	28.0	21.2	156
N**	361	148	509	14	6	20	33	3	36	88	18	106	543	193	736	736
fehlende Angaben	1 380	618	1 998	123	61	184	299	57	356	781	218	999	3 012	1 201	4 213	4 213
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	97.5	97.6	97.6	20.0	33.3	25.0	35.3	0.0	33.3	23.1	33.3	25.0	77.7	86.8	80.6	266
Opioide	1.9	2.4	2.0	80.0	33.3	62.5	5.9	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	4.0	2.8	3.6	12
Kokain oder Derivate	5.6	4.7	5.3	0.0	66.7	25.0	88.2	100.0	88.9	19.2	16.7	18.8	12.9	8.5	11.5	38
andere Stimulanzien	1.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	7.7	0.0	6.3	3.1	0.9	2.4	8
Hypnotika/Sedativa	1.2	0.0	0.8	0.0	33.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.5	5
Halluzinogene	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	3.8	0.0	3.1	1.3	0.0	0.9	3
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	3.7	2.4	3.3	0.0	33.3	12.5	17.6	0.0	16.7	84.6	100.0	87.5	15.6	11.3	14.2	47
Tabak	0.6	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.5	5
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.1	1.8	0.9	1.5	5
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	2.2	0.9	1.8	6
Essstörungen	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	3
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	1.5	5
N**	161	85	246	5	3	8	17	1	18	26	6	32	224	106	330	330
fehlende Angaben	14	8	22	2	1	3	1	0	1	4	1	5	25	13	38	38

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	46.8	49.0	47.5	35.7	14.3	28.6	28.9	25.0	28.6	20.0	17.4	19.4	41.3	42.8	41.7	289
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	0.7	0.8	7.1	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.0	1.4	0.5	1.2	8
2 bis 3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.8	6.7	0.0	5.1	1.6	0.0	1.2	8
4 bis 6 Tage pro Woche	1.2	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	3.1	1.2	1.5	1.3	9
einmal täglich	2.4	0.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	3.1	2.0	1.0	1.7	12
mehrmals täglich	48.6	48.3	48.5	57.1	85.7	66.7	65.8	75.0	66.7	65.3	73.9	67.3	52.5	54.1	53.0	367
N**	327	145	472	14	7	21	38	4	42	75	23	98	499	194	693	693
fehlende Angaben	1 414	621	2 035	123	60	183	294	56	350	794	213	1 007	3 056	1 200	4 256	4 256
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	21.6	27.1	23.2	28.6	40.0	33.3	25.0	66.7	29.6	50.0	37.5	47.1	29.5	31.9	30.1	100
11-20 Zigaretten pro Tag	48.2	54.2	50.0	57.1	20.0	41.7	62.5	33.3	59.3	42.6	43.8	42.9	48.1	48.4	48.2	160
21-30 Zigaretten pro Tag	20.1	18.6	19.7	14.3	20.0	16.7	12.5	0.0	11.1	3.7	12.5	5.7	14.9	16.5	15.4	51
31 und mehr Zigaretten pro Tag	10.1	0.0	7.1	0.0	20.0	8.3	0.0	0.0	0.0	3.7	6.3	4.3	7.5	3.3	6.3	21
N**	139	59	198	7	5	12	24	3	27	54	16	70	241	91	332	332
fehlende Angaben	35	15	50	2	1	3	3	0	3	6	3	9	52	20	72	72

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2020)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	37.6	36.8	37.3	57.1	37.5	51.7	54.3	50.0	53.8	40.2	50.0	42.4	39.7	38.9	39.5	374
zeitlich begrenzte Abstinenz	13.4	13.5	13.4	9.5	0.0	6.9	4.3	0.0	3.8	6.5	3.1	5.8	11.2	10.7	11.1	105
kontrollierter Konsum	37.4	42.0	38.7	14.3	25.0	17.2	26.1	50.0	28.8	29.9	25.0	28.8	35.0	40.1	36.4	345
keine Beschränkung beabsichtigt	1.9	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.9	3.7	3.1	3.6	2.0	1.5	1.9	18
bis jetzt nicht festgelegt	9.7	5.2	8.4	9.5	25.0	13.8	13.0	0.0	11.5	18.7	18.8	18.7	10.9	7.3	9.9	94
andere	0.0	1.0	0.3	9.5	12.5	10.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	1.0	1.5	1.2	11
N**	463	193	656	21	8	29	46	6	52	107	32	139	685	262	947	947
<i>fehlende Angaben</i>	1 278	573	1 851	116	59	175	286	54	340	762	204	966	2 870	1 132	4 002	4 002
Prognose*																
sehr gute Prognose	17.3	19.6	18.0	14.3	16.7	14.8	19.0	16.7	18.8	22.5	30.4	24.0	18.6	21.2	19.3	167
gute Prognose	46.0	41.7	44.7	47.6	16.7	40.7	33.3	66.7	37.5	55.9	47.8	54.4	47.1	41.9	45.8	397
eher ungünstige Prognose	24.9	28.6	25.9	33.3	66.7	40.7	33.3	16.7	31.3	16.7	21.7	17.6	23.7	28.4	24.9	216
ungünstige Prognose	11.8	10.1	11.4	4.8	0.0	3.7	14.3	0.0	12.5	4.9	0.0	4.0	10.5	8.6	10.0	87
N**	422	168	590	21	6	27	42	6	48	102	23	125	645	222	867	867
<i>fehlende Angaben</i>	1 319	598	1 917	116	61	177	290	54	344	767	213	980	2 910	1 172	4 082	4 082

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein