

Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2016

Recueil de tableaux statistiques

Etienne Maffli & Eva Schneider

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Etienne Maffli & Eva Schneider
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2018

Citation recommandée: Maffli, E. & Schneider, E. (2018). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2016 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2016)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2016)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2016)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2016)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2016)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2016)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2016)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2016)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2016)
- A2 Problème principal à l'admission (2016)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits le 1^{er} janvier 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. De façon à répondre aux différents besoins, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2016, 67 des 188 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring *act-info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). 20 institutions ont répondu à cette demande. Les données de ces institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes			70.9			77.6			81.1			80.9			23.3			65.1	4 270
femmes			29.1			22.4			18.9			19.1			76.7			34.9	2 288
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	227	749	976	4 270	2 288	6 558	6 558
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.4	3.0	4.9	1.2	2.1	1.7	1.3	1.6	102
15-19	2.4	2.0	2.2	2.9	8.3	4.1	2.2	15.1	4.6	56.1	57.3	56.3	4.5	1.7	2.4	16.1	9.9	13.9	911
20-24	4.0	2.9	3.7	3.8	10.0	5.2	12.3	20.8	13.9	14.4	13.7	14.3	4.0	3.5	3.6	7.6	5.9	7.0	460
25-29	7.6	6.2	7.2	14.4	15.0	14.6	22.8	17.0	21.7	11.1	8.8	10.7	3.1	7.8	6.7	9.8	8.4	9.3	611
30-34	10.9	8.5	10.2	18.3	21.7	19.0	19.7	5.7	17.1	6.2	6.6	6.3	4.5	8.6	7.6	10.2	9.0	9.8	642
35-39	12.0	10.7	11.6	14.9	11.7	14.2	18.0	15.1	17.4	4.5	2.6	4.1	8.0	11.0	10.3	10.6	9.8	10.3	676
40-44	11.4	11.5	11.4	18.3	11.7	16.8	12.3	3.8	10.7	2.6	2.2	2.5	8.9	12.4	11.6	9.3	10.0	9.5	625
45-49	13.2	15.2	13.8	13.9	10.0	13.1	6.6	13.2	7.8	1.1	2.6	1.4	13.4	17.3	16.4	9.5	13.4	10.9	712
50-54	15.1	15.8	15.3	7.7	10.0	8.2	5.7	7.5	6.0	0.6	0.9	0.7	15.6	15.7	15.7	10.1	12.8	11.0	722
55-59	10.1	11.1	10.4	4.8	1.7	4.1	0.4	1.9	0.7	0.5	0.9	0.6	12.9	8.2	9.3	6.7	7.9	7.1	466
60-64	5.9	7.9	6.5	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.8	5.7	3.9	5.1	4.3	282
65-69	3.3	4.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.0	4.3	2.1	3.7	2.7	174
70-74	2.6	2.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	1.6	1.9	1.7	112
75 et plus	1.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	1.5	0.8	0.8	0.8	53
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	224	744	968	4 267	2 281	6 548	6 548
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	7	10	10
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.0	46.9	45.6	38.7	35.0	37.9	34.2	32.8	33.9	22.3	22.1	22.2	48.7	45.2	46.0	38.0	41.8	39.3	
écart-type	13.4	13.1	13.3	9.7	10.7	10.1	8.7	11.6	9.3	8.2	8.8	8.3	30.6	13.3	18.8	16.7	15.3	16.3	
1er quartile	34.9	37.0	35.5	31.5	26.2	30.3	27.4	23.3	27.0	16.9	16.7	16.9	36.7	35.8	35.9	24.8	29.8	26.4	
valeur médiane	45.6	48.0	46.3	38.8	34.1	38.2	33.1	29.6	32.7	18.2	18.0	18.1	49.6	46.0	46.5	36.9	42.8	39.1	
3e quartile	54.4	56.2	54.8	45.6	42.8	45.4	40.17	43.8	40.5	25.9	24.9	25.8	56.8	53.6	54.5	50.0	52.9	51.0	
N**	2 212	907	3 119	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	224	744	968	4 267	2 281	6 548	
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	7	10	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	46.2	34.4	42.8	68.0	62.7	66.9	67.1	73.5	68.3	88.9	86.9	88.5	30.2	24.3	25.7	59.1	41.6	53.0	3 211
marié-e	31.4	29.0	30.8	14.4	19.6	15.5	17.1	8.2	15.5	4.4	3.9	4.3	54.1	53.5	53.6	24.1	32.5	27.0	1 636
séparé-e	4.3	3.8	4.2	5.2	5.9	5.3	3.7	2.0	3.4	0.4	1.5	0.6	2.4	2.8	2.7	3.1	3.2	3.2	192
divorcé-e	15.7	28.6	19.4	10.3	7.8	9.8	10.6	14.3	11.3	2.1	5.3	2.7	8.3	16.5	14.6	10.8	19.0	13.6	825
veuf/veuve	1.7	4.0	2.4	1.0	2.0	1.2	0.5	0.0	0.4	3.9	1.9	3.5	2.0	2.2	2.1	2.2	3.1	2.5	153
partenariat enregistré	0.7	0.1	0.5	1.0	2.0	1.2	0.9	2.0	1.1	0.2	0.5	0.3	2.9	0.7	1.2	0.7	0.5	0.6	38
N**	2 051	840	2 891	194	51	245	216	49	265	902	206	1 108	205	686	891	3 961	2 094	6 055	6 055
données manquantes	161	67	228	14	9	23	12	4	16	60	21	81	22	63	85	309	194	503	503
Nationalité*																			
CH	80.4	86.2	82.1	62.6	85.2	67.5	71.8	83.7	74.0	84.1	87.6	84.7	87.4	86.7	86.9	79.8	86.4	82.2	4 960
UE	15.0	9.5	13.4	28.8	13.0	25.4	17.2	10.2	15.9	10.0	8.6	9.8	10.7	8.8	9.2	14.4	9.2	12.6	758
autre	4.6	4.3	4.5	8.6	1.9	7.1	11.0	6.1	10.1	5.9	3.8	5.5	1.9	4.5	3.9	5.8	4.4	5.3	319
N**	2 002	839	2 841	198	54	252	209	49	258	897	210	1 107	206	693	899	3 914	2 123	6 037	6 037
données manquantes	210	68	278	10	6	16	19	4	23	65	17	82	21	56	77	356	165	521	521

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	10.1	9.8	10.0	2.0	0.0	1.5	1.4	3.9	1.9	1.4	0.0	1.1	8.0	8.3	8.3	6.4	6.9	6.5	411
périphérie des grands centres	16.6	15.7	16.3	4.5	6.9	5.0	15.0	13.7	14.8	12.3	12.8	12.4	17.4	16.4	16.6	14.5	14.2	14.4	903
villes de moyenne importance	13.3	17.6	14.5	14.9	19.0	15.8	20.7	15.7	19.7	22.3	26.9	23.2	14.6	18.8	17.8	16.9	20.7	18.2	1 144
petites villes	30.5	30.8	30.6	50.7	46.6	49.8	42.7	43.1	42.8	32.5	35.2	33.0	34.7	32.1	32.7	33.6	32.9	33.3	2 096
campagne	29.5	26.1	28.5	27.9	27.6	27.8	20.2	23.5	20.8	31.5	25.1	30.3	25.4	24.4	24.6	28.7	25.3	27.5	1 731
N**	2 113	877	2 990	201	58	259	213	51	264	928	219	1 147	213	708	921	4 087	2 198	6 285	6 285
données manquantes	99	30	129	7	2	9	15	2	17	34	8	42	14	41	55	183	90	273	273
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	34.6	33.5	34.3	36.6	18.4	32.6	33.5	32.6	33.3	14.5	13.0	14.2	12.5	10.4	10.8	27.6	25.2	26.8	1 389
avec famille d'origine	9.5	4.9	8.1	12.6	14.3	12.9	20.5	13.0	19.1	63.8	55.4	62.2	14.8	7.1	8.7	26.3	14.7	22.6	1 170
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.6	54.4	48.2	28.0	38.8	30.4	35.0	30.4	34.1	9.5	16.6	10.8	69.3	80.7	78.3	34.7	51.3	40.1	2 078
avec des amis ou d'autres personnes	3.3	2.3	3.0	5.1	10.2	6.3	3.5	4.3	3.7	3.4	2.6	3.2	0.0	1.5	1.2	3.3	3.1	3.2	167
en prison	0.2	0.0	0.2	1.1	2.0	1.3	2.0	2.2	2.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	16
institution/foyer	2.2	1.9	2.1	6.3	8.2	6.7	3.0	6.5	3.7	2.7	1.6	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	1.6	2.2	113
hôpital/clinique	1.7	0.8	1.4	4.0	0.0	3.1	1.0	4.3	1.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	1.1	59
autre	3.0	2.1	2.7	6.3	8.2	6.7	1.5	6.5	2.4	5.5	10.4	6.4	3.4	0.3	0.9	3.9	3.2	3.7	190
N**	1 802	770	2 572	175	49	224	200	46	246	861	193	1 054	88	336	424	3 511	1 671	5 182	5 182
données manquantes	410	137	547	33	11	44	28	7	35	101	34	135	139	413	552	759	617	1 376	1 376
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
logement stable	92.2	94.9	93.0	77.7	80.9	78.4	90.1	88.1	89.7	92.6	90.8	92.2	95.8	97.5	97.1	91.4	94.5	92.4	4 516
logement instable/SDF	4.0	2.6	3.6	9.6	6.4	8.9	2.9	4.8	3.3	3.9	3.5	3.8	2.1	2.5	2.4	4.2	3.0	3.8	187
en prison	0.2	0.0	0.2	1.8	2.1	1.9	2.9	0.0	2.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	17
institution/foyer/hôpital/autre	3.6	2.5	3.3	10.8	10.6	10.8	4.1	7.1	4.7	3.3	5.8	3.8	2.1	0.0	0.4	3.9	2.5	3.4	167
N**	1 722	728	2 450	166	47	213	171	42	213	779	173	952	96	360	456	3 282	1 605	4 887	4 887
données manquantes	490	179	669	42	13	55	57	11	68	183	54	237	131	389	520	988	683	1 671	1 671

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	39.9	41.5	40.4	56.0	30.8	50.0	45.2	52.4	46.5	70.6	55.8	67.8	21.8	17.7	18.6	47.2	37.8	43.9	1 499
relations temporaires	3.0	3.7	3.2	6.0	7.7	6.4	7.5	0.0	6.1	3.4	6.7	4.0	0.0	0.7	0.5	3.2	3.0	3.1	107
partenaire fixe, vivant séparé	9.2	11.3	9.8	3.6	15.4	6.4	10.8	23.8	13.2	14.1	25.0	16.2	10.3	12.7	12.2	10.2	13.7	11.4	390
partenaire fixe, ménage commun	47.8	43.5	46.5	34.5	46.2	37.3	36.6	23.8	34.2	11.9	12.5	12.0	67.9	68.9	68.7	39.4	45.5	41.5	1 416
N**	1 267	542	1 809	84	26	110	93	21	114	446	104	550	78	299	377	2 226	1 186	3 412	3 412
données manquantes	945	365	1 310	124	34	158	135	32	167	516	123	639	149	450	599	2 044	1 102	3 146	3 146
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	43.2	36.6	41.2	62.5	56.5	61.2	65.6	61.1	64.9	91.0	85.2	89.9	32.3	30.3	30.7	57.2	44.4	52.5	1 874
1 enfant	17.0	20.5	18.1	17.5	13.0	16.5	20.4	16.7	19.8	4.3	3.5	4.1	8.3	15.4	13.9	13.3	15.5	14.1	504
2 enfants	26.2	29.6	27.3	13.8	21.7	15.5	12.9	16.7	13.5	3.9	7.8	4.6	36.5	37.0	36.9	19.5	27.5	22.4	798
3 enfants ou plus	13.6	13.3	13.5	6.3	8.7	6.8	1.1	5.6	1.8	0.8	3.5	1.3	22.9	17.4	18.5	10.0	12.6	11.0	391
N**	1 269	565	1 834	80	23	103	93	18	111	488	115	603	96	357	453	2 278	1 289	3 567	3 567
données manquantes	943	342	1 285	128	37	165	135	35	170	474	112	586	131	392	523	1 992	999	2 991	2 991
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	72.5	66.5	70.7	78.9	72.0	77.1	86.6	92.9	87.7	84.7	78.6	83.6	55.1	47.0	48.7	75.3	64.0	71.2	2 250
1 enfant	11.7	17.5	13.5	11.3	12.0	11.5	6.0	0.0	4.9	4.2	8.2	4.9	14.6	18.0	17.3	9.8	15.0	11.7	370
2 enfants	11.1	12.2	11.5	8.5	8.0	8.3	7.5	7.1	7.4	9.0	12.2	9.6	21.3	24.3	23.6	10.9	15.3	12.5	396
3 enfants ou plus	4.6	3.8	4.4	1.4	8.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.9	9.0	10.8	10.4	3.9	5.7	4.6	144
N**	1 124	498	1 622	71	25	96	67	14	81	431	98	529	89	334	423	2 003	1 157	3 160	3 160
données manquantes	1 088	409	1 497	137	35	172	161	39	200	531	129	660	138	415	553	2 267	1 131	3 398	3 398

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	4.6	3.2	4.2	3.9	7.3	4.6	3.7	2.4	3.5	14.9	19.1	15.8	2.4	1.6	1.8	7.6	5.6	6.9	327
école obligatoire	8.5	11.4	9.4	18.8	29.3	21.0	13.2	23.8	15.2	51.8	53.7	52.2	8.0	7.5	7.6	21.1	17.5	19.9	935
formation de transition	2.1	3.2	2.4	0.6	7.3	2.1	1.6	2.4	1.7	3.6	2.7	3.4	0.0	1.4	1.1	2.3	2.9	2.5	119
formation générale sans maturité	10.6	6.3	9.3	14.3	4.9	12.3	9.0	2.4	7.8	4.2	2.1	3.8	12.8	8.2	9.3	9.0	5.9	7.9	374
formation prof. de base et apprentissage	50.7	54.4	51.8	50.6	36.6	47.7	56.1	45.2	54.1	20.1	17.6	19.6	39.2	48.4	46.3	41.8	44.7	42.7	2 012
maturité ou école normale	4.1	5.2	4.4	1.9	2.4	2.1	4.2	7.1	4.8	2.5	2.7	2.5	4.8	7.7	7.1	3.8	6.5	4.7	220
formation prof. supérieure	8.9	8.1	8.7	5.8	4.9	5.6	7.9	2.4	6.9	1.6	1.1	1.5	14.4	9.4	10.5	6.9	7.3	7.1	332
haute école spécialisée et université	8.9	7.8	8.6	3.2	7.3	4.1	3.2	14.3	5.2	1.3	1.1	1.3	16.8	14.6	15.1	6.5	9.1	7.4	346
doctorat ou habilitation	1.6	0.5	1.3	0.6	0.0	0.5	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	1.3	1.1	0.6	0.9	42
N**	1 577	656	2 233	154	41	195	189	42	231	757	188	945	125	426	551	3 130	1 577	4 707	4 707
données manquantes	635	251	886	54	19	73	39	11	50	205	39	244	102	323	425	1 140	711	1 851	1 851
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	16.6	23.2	18.5	26.4	48.4	30.8	16.5	38.2	21.0	15.4	17.3	15.7	25.0	20.0	20.7	16.9	23.8	18.7	470
apprenti-e, stagiaire	2.1	1.2	1.9	3.2	3.2	3.2	5.3	11.8	6.6	32.6	32.1	32.5	0.0	0.0	0.0	9.5	6.8	8.8	222
manœuvre, aide	3.8	4.6	4.1	5.6	9.7	6.4	3.8	0.0	3.0	3.9	4.9	4.1	0.0	0.0	0.0	3.8	4.3	3.9	99
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.1	9.3	7.0	12.8	6.5	11.5	6.0	0.0	4.8	2.9	4.9	3.3	25.0	8.0	10.3	5.7	7.4	6.1	154
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.7	7.8	13.5	16.0	12.9	15.4	23.3	2.9	19.2	9.8	6.2	9.2	0.0	4.0	3.4	14.8	7.7	13.0	327
contremaître-sse	2.6	0.2	1.9	2.4	0.0	1.9	4.5	0.0	3.6	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.3	0.2	1.7	44
employé-e non qualifié-e	21.1	28.9	23.3	12.8	12.9	12.8	15.0	11.8	14.4	6.1	3.7	5.7	0.0	36.0	31.0	16.1	23.2	18.0	452
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.4	12.0	13.0	8.8	6.5	8.3	11.3	20.6	13.2	5.1	2.5	4.7	25.0	24.0	24.1	11.3	11.8	11.4	288
employé-e, cadre supérieur	5.8	2.4	4.8	0.8	0.0	0.6	3.8	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	3.4	3.8	1.5	3.2	81
indépendant-e	10.4	6.6	9.3	6.4	0.0	5.1	9.8	0.0	7.8	2.2	2.5	2.2	0.0	8.0	6.9	7.6	5.8	7.2	180
écolier/ère, étudiant-e	1.4	0.7	1.2	0.8	0.0	0.6	0.8	5.9	1.8	19.1	24.7	20.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.9	6.2	157
autre statut	1.1	2.9	1.6	4.0	0.0	3.2	0.0	8.8	1.8	1.7	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	1.7	43
N**	1 040	409	1 449	125	31	156	133	34	167	408	81	489	4	25	29	1 867	650	2 517	2 517
données manquantes	1 172	498	1 670	83	29	112	95	19	114	554	146	700	223	724	947	2 403	1 638	4 041	4 041

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	56.0	46.6	53.2	34.1	18.0	30.6	57.3	42.2	54.3	29.5	27.4	29.1	69.0	65.6	66.3	48.5	46.2	47.7	2 378
économies, épargne	2.2	1.1	1.9	2.2	2.0	2.2	1.7	2.2	1.8	1.4	1.1	1.3	1.2	0.9	1.0	1.9	1.2	1.7	85
rente (AVS, AI ou autre)	13.2	19.7	15.1	11.2	10.0	10.9	9.6	20.0	11.7	4.0	5.4	4.3	14.3	11.1	11.8	10.3	15.7	12.0	600
aide sociale	13.7	13.7	13.7	32.4	52.0	36.7	11.2	13.3	11.7	10.4	14.0	11.1	2.4	2.2	2.2	12.8	11.6	12.4	618
assurance-chômage	8.0	4.9	7.1	12.3	4.0	10.5	10.1	4.4	9.0	3.6	2.2	3.4	1.2	0.6	0.7	6.8	3.7	5.8	288
soutien du/de la partenaire	1.5	10.1	4.1	2.2	8.0	3.5	1.7	4.4	2.2	1.5	1.1	1.4	3.6	14.6	12.3	1.6	9.3	4.1	203
soutien parents/proches/amis	2.6	2.4	2.5	2.8	6.0	3.5	3.9	8.9	4.9	48.4	47.8	48.3	8.3	4.6	5.4	15.9	10.9	14.3	712
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	8
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
assurance d'indemnités journalières	1.1	0.7	1.0	1.7	0.0	1.3	1.7	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	34
autre	1.5	0.9	1.3	1.1	0.0	0.9	0.6	2.2	0.9	0.9	1.1	0.9	0.0	0.3	0.2	1.2	0.9	1.1	56
N**	1 762	753	2 515	179	50	229	178	45	223	799	186	985	84	323	407	3 366	1 616	4 982	4 982
données manquantes	450	154	604	29	10	39	50	8	58	163	41	204	143	426	569	904	672	1 576	1 576
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	51.3	33.4	46.1	29.0	10.0	24.9	57.2	26.5	51.4	17.1	12.6	16.3	56.3	40.8	44.2	41.6	29.9	38.0	1 948
activité à temps partiel	5.1	17.9	8.9	6.6	6.0	6.4	3.8	8.2	4.7	3.8	5.1	4.0	8.0	35.9	29.8	4.7	18.8	9.1	466
jobs occasionnels	1.3	1.1	1.2	3.3	0.0	2.6	0.5	2.0	0.8	1.5	1.5	1.5	0.0	1.0	0.8	1.3	0.9	1.2	61
en formation	3.7	3.0	3.5	2.2	0.0	1.7	3.8	18.4	6.6	55.2	53.0	54.8	11.5	6.5	7.6	18.9	14.2	17.5	897
sans travail, en quête d'emploi	13.4	9.9	12.4	24.0	24.0	24.0	18.8	14.3	17.9	9.9	8.1	9.6	2.3	1.6	1.8	12.5	8.2	11.2	575
sans travail, sans recherche d'emploi	4.7	6.8	5.3	16.4	30.0	19.3	4.3	0.0	3.5	3.9	5.1	4.1	2.3	0.3	0.8	5.0	5.3	5.1	262
rentier/rentière	8.0	11.5	9.0	1.6	0.0	1.3	1.9	2.0	1.9	0.2	1.0	0.4	11.5	10.0	10.4	4.9	8.5	6.0	309
incapacité de travail	5.4	6.5	5.7	9.8	12.0	10.3	5.3	18.4	7.8	2.4	2.0	2.3	2.3	1.0	1.3	4.6	5.3	4.9	249
femme/homme au foyer	0.1	3.3	1.0	0.0	2.0	0.4	0.0	4.1	0.8	0.0	0.5	0.1	1.1	1.9	1.8	0.1	2.4	0.8	40
autre	7.0	6.5	6.8	7.1	16.0	9.0	4.3	6.1	4.7	6.0	11.1	7.0	4.6	1.0	1.8	6.4	6.3	6.4	326
N**	1 790	736	2 526	183	50	233	208	49	257	877	198	1 075	87	309	396	3 542	1 591	5 133	5 133
données manquantes	422	171	593	25	10	35	20	4	24	85	29	114	140	440	580	728	697	1 425	1 425

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	45.4	52.9	47.4	66.7	71.4	67.6	42.3	50.0	43.5	58.2	74.3	60.7	95.0	91.2	92.3	53.7	67.1	57.5	824
moins de 1000 fr.	2.3	2.4	2.3	12.3	0.0	9.9	0.0	10.0	1.6	21.7	11.4	20.1	0.0	0.0	0.0	6.5	2.9	5.5	79
de 1001 à 2000 fr.	3.0	5.2	3.6	1.8	14.3	4.2	7.7	0.0	6.5	5.8	2.9	5.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	49
de 2001 à 3000 fr.	4.1	9.0	5.4	0.0	0.0	0.0	13.5	20.0	14.5	1.6	5.7	2.2	0.0	1.0	0.7	3.5	6.1	4.3	61
de 3001 à 4000 fr.	8.1	11.0	8.9	8.8	7.1	8.5	11.5	20.0	12.9	2.1	2.9	2.2	0.0	2.0	1.4	6.3	7.9	6.8	97
de 4001 à 5000 fr.	11.6	8.1	10.7	1.8	7.1	2.8	7.7	0.0	6.5	6.9	2.9	6.3	0.0	2.9	2.1	9.0	5.4	8.0	114
de 5001 à 6000 fr.	8.8	5.7	8.0	1.8	0.0	1.4	3.8	0.0	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.7	3.2	5.0	71
de 6001 à 8000 fr.	6.8	2.4	5.7	3.5	0.0	2.8	3.8	0.0	3.2	1.1	0.0	0.9	2.5	2.9	2.8	4.8	2.0	4.0	57
de 8001 à 10 000 fr.	7.3	3.3	6.3	3.5	0.0	2.8	9.6	0.0	8.1	2.1	0.0	1.8	2.5	0.0	0.7	5.7	2.0	4.6	66
de 10 001 à 15 000 fr.	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	12
plus de 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	3
N**	603	210	813	57	14	71	52	10	62	189	35	224	40	102	142	1 026	407	1 433	1 433
données manquantes	1 609	697	2 306	151	46	197	176	43	219	773	192	965	187	647	834	3 244	1 881	5 125	5 125
Dettes*																			
aucune dette	66.4	76.2	69.1	27.1	41.7	30.0	44.7	66.7	47.1	82.9	89.2	84.0	90.0	92.9	92.5	68.6	80.5	72.1	1 497
jusqu'à 5000 fr.	4.0	5.6	4.5	4.2	0.0	3.3	2.6	11.1	3.5	3.7	2.7	3.6	0.0	2.7	2.3	4.1	5.2	4.4	92
de 5001 à 10 000 fr.	10.4	8.4	9.8	20.8	8.3	18.3	13.2	0.0	11.8	4.3	4.1	4.2	5.0	1.8	2.3	8.6	6.1	7.9	163
de 10 001 à 25 000 fr.	7.7	2.4	6.2	16.7	33.3	20.0	11.8	0.0	10.6	4.5	4.1	4.5	0.0	0.0	0.0	7.2	2.9	5.9	122
de 25 001 à 50 000 fr.	4.7	3.1	4.3	6.3	0.0	5.0	14.5	11.1	14.1	2.9	0.0	2.4	5.0	1.8	2.3	5.4	2.3	4.4	92
de 50 001 à 100 000 fr.	1.9	1.4	1.8	6.3	8.3	6.7	5.3	11.1	5.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	1.1	1.6	34
plus de 100 000 fr.	1.5	0.3	1.2	8.3	0.0	6.7	1.3	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.5	0.6	1.3	26
montant inconnu	3.4	2.4	3.1	10.4	8.3	10.0	6.6	0.0	5.9	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.4	49
N**	741	286	1 027	48	12	60	76	9	85	375	74	449	20	113	133	1 454	621	2 075	2 075
données manquantes	1 471	621	2 092	160	48	208	152	44	196	587	153	740	207	636	843	2 816	1 667	4 483	4 483

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	92.5	98.8	94.4	40.0	66.7	47.1	67.5	80.0	68.9	94.9	100.0	95.6	89.0	97.1	91.3	897
emprisonnement	2.6	0.4	1.9	28.0	11.1	23.5	5.0	20.0	6.7	1.7	0.0	1.5	3.6	1.4	3.0	29
détention préventive	2.7	0.8	2.1	16.0	22.2	17.6	17.5	0.0	15.6	1.7	0.0	1.5	4.3	1.4	3.5	34
emprisonnement et détention préventive	2.2	0.0	1.5	16.0	0.0	11.8	10.0	0.0	8.9	1.7	0.0	1.5	3.1	0.0	2.2	22
N**	548	243	791	25	9	34	40	5	45	59	9	68	702	280	982	982
<i>données manquantes</i>	1 664	664	2 328	183	51	234	188	48	236	903	218	1 121	3 341	1 259	4 600	4 600
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	35.0	0.0	35.0	50.0	100.0	57.1	55.6	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	40.5	50.0	41.0	16
> 1 à 2 mois	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
> 2 à 6 mois	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
> 6 à 12 mois	10.0	0.0	10.0	33.3	0.0	28.6	11.1	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	12.8	5
plus de 1 an	15.0	0.0	15.0	16.7	0.0	14.3	11.1	100.0	20.0	100.0	0.0	100.0	18.9	50.0	20.5	8
N**	20	0	20	6	1	7	9	1	10	1	0	1	37	2	39	39
<i>données manquantes</i>	21	3	24	9	2	11	4	0	4	2	0	2	40	6	46	46

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	19.5	7.5	16.0	7.9	5.7	7.4	20.0	7.8	17.7	49.0	46.8	48.6	3.5	2.6	2.8	23.8	9.0	18.7	1 123
cabinet médical	9.0	13.2	10.2	8.4	15.1	9.9	4.7	11.8	6.0	2.1	3.0	2.3	1.5	4.6	3.8	6.5	9.2	7.5	449
institution spécialisée dans les addictions	5.1	6.8	5.6	10.5	11.3	10.7	7.0	3.9	6.4	2.2	2.0	2.2	3.0	2.4	2.6	4.5	4.4	4.5	270
autre service médical/social/de santé	17.0	17.1	17.0	15.3	17.0	15.6	8.4	11.8	9.0	6.5	10.0	7.1	5.5	3.5	4.0	12.8	11.7	12.4	747
institution formatrice/éducative	0.7	0.0	0.5	0.5	1.9	0.8	0.0	3.9	0.8	3.4	2.5	3.3	2.5	1.5	1.7	1.8	1.2	1.6	96
employeur/employeuse	4.0	2.7	3.6	1.1	5.7	2.1	1.4	3.9	1.9	1.5	2.0	1.6	2.5	1.1	1.4	3.0	2.1	2.7	160
initiative personnelle/famille/amis	43.3	49.8	45.2	53.2	43.4	51.0	54.9	51.0	54.1	32.9	30.8	32.5	80.6	83.4	82.8	45.4	59.9	50.4	3 031
autre	1.4	2.9	1.9	3.2	0.0	2.5	3.7	5.9	4.1	2.3	3.0	2.4	1.0	0.9	0.9	2.2	2.5	2.3	140
N**	2 023	840	2 863	190	53	243	215	51	266	905	201	1 106	201	658	859	3 940	2 076	6 016	6 016
données manquantes	189	67	256	18	7	25	13	2	15	57	26	83	26	91	117	330	212	542	542

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	86.9	95.6	89.4	95.1	97.5	95.6	91.5	97.1	92.6	72.8	81.7	74.3	85.2	94.1	87.4	2 601
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	3.8	0.9	0.5	0.8	23
oui, consécutive à une mesure	12.9	4.4	10.5	4.9	2.5	4.4	8.5	2.9	7.4	23.5	14.0	21.9	14.0	5.3	11.8	351
N**	1 300	503	1 803	142	40	182	141	34	175	460	93	553	2 224	751	2 975	2 975
données manquantes	912	404	1 316	66	20	86	87	19	106	502	134	636	1 819	788	2 607	2 607
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
traitement résidentiel (art 60 CP)	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	2
prise en charge ambulatoire	26.7	42.9	28.3	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	54.5	66.7	55.7	36.4	47.6	37.4	85
placement dans institution pour jeunes adultes	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.9	1.9	0.0	1.8	4
en attente d'un jugement	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	20.0	0.0	20.0	7.3	0.0	6.6	3.4	0.0	3.1	7
autre	72.5	57.1	71.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	34.5	33.3	34.4	58.3	52.4	57.7	131
N**	131	14	145	2	0	2	5	0	5	55	6	61	206	21	227	227
données manquantes	38	8	46	5	1	6	7	1	8	70	11	81	123	23	146	146

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Prises en charge antérieures*																			
non	50.1	44.3	48.4	16.1	20.0	17.0	46.2	44.7	45.9	73.8	77.1	74.4	71.7	77.4	76.3	56.0	54.6	55.6	2 906
oui	49.9	55.7	51.6	83.9	80.0	83.0	53.8	55.3	54.1	26.2	22.9	25.6	28.3	22.6	23.7	44.0	45.4	44.4	2 319
N**	1 937	795	2 732	192	55	247	199	47	246	860	192	1 052	53	234	287	3 631	1 594	5 225	5 225
<i>données manquantes</i>	275	112	387	16	5	21	29	6	35	102	35	137	174	515	689	639	694	1 333	1 333
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	0.8	0.7	0.8	7.1	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	2.0	1.6	1.2	0.6	1.0	14
substitution (méthadone, subutex)	4.3	5.3	4.6	55.7	60.9	57.0	11.8	40.0	16.4	2.0	4.2	2.4	0.0	4.1	3.1	8.2	7.9	8.1	116.0
autre traitement médicamenteux	8.7	9.0	8.8	14.3	8.7	12.9	9.8	10.0	9.8	2.0	0.0	1.6	0.0	2.0	1.6	8.4	7.3	8.0	115.0
prise en charge ambulatoire	73.0	78.3	74.7	64.3	60.9	63.4	84.3	80.0	83.6	92.1	91.7	92.0	93.3	87.8	89.1	76.5	79.0	77.3	1 109
structure/clinique de jour	1.6	1.7	1.6	1.4	0.0	1.1	3.9	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.3	19
traitement résidentiel	49.1	49.7	49.3	40.0	26.1	36.6	43.1	40.0	42.6	16.8	16.7	16.8	20.0	8.2	10.9	42.2	39.9	41.4	594
sevrage	38.1	42.7	39.5	37.1	26.1	34.4	39.2	50.0	41.0	7.9	4.2	7.2	0.0	10.2	7.8	32.7	32.2	32.5	466
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.7	4.3	5.3	4.3	0.0	3.2	5.9	0.0	4.9	1.0	8.3	2.4	0.0	4.1	3.1	4.9	4.7	4.8	69
autre(s)	2.1	2.0	2.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	1.6	0.0	8.2	6.3	1.9	3.5	2.4	35
N**	633	300	933	70	23	93	51	10	61	101	24	125	15	49	64	943	491	1 434	1 434
<i>données manquantes</i>	342	146	488	91	21	112	56	16	72	125	21	146	0	7	7	664	242	906	906

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	98.3	97.3	98.0	38.0	52.4	42.3	94.2	87.5	92.9	100.0	100.0	100.0	96.8	96.8	96.8	2 474
oui	1.7	2.7	2.0	62.0	47.6	57.7	5.8	12.5	7.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	2 555
N**	1 049	473	1 522	50	21	71	69	16	85	410	103	513	1 766	789	2 555	2 555
données manquantes	1 163	434	1 597	158	39	197	159	37	196	552	124	676	2 277	750	3 027	3 027
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.5	2
méthadone	64.7	84.6	73.3	66.7	90.0	72.5	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	88.0	73.4	58
autres opiacés	11.8	7.7	10.0	16.7	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	8.0	13.9	11
autres substances	23.5	7.7	16.7	10.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	4.0	10.1	8
N**	17	13	30	30	10	40	4	2	6	0	0	0	54	25	79	79
données manquantes	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	96.9	96.5	96.8	35.6	36.4	35.7	91.1	74.3	88.0	99.2	99.0	99.1	92.6	92.6	92.6	2 997
oui	3.1	3.5	3.2	64.4	63.6	64.3	8.9	25.7	12.0	0.8	1.0	0.9	7.4	7.4	7.4	241
N**	1 328	565	1 893	163	44	207	157	35	192	490	97	587	2 351	887	3 238	3 238
données manquantes	884	342	1 226	45	16	61	71	18	89	472	130	602	1 692	652	2 344	2 344
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	24.9	31.0	27.3	26.9	24.5	26.3	24.2	20.3	21.9	19.5	-	19.5	25.7	24.4	25.4	
Ecart-type	3.0	8.5	6.4	7.9	6.3	7.6	6.0	4.7	5.5	2.1	-	2.1	6.8	7.3	7.0	
25 centile	25.0	25.0	25.0	22.0	20.0	21.0	20.0	18.0	18.0	18.0	-	18.0	21.0	18.0	20.0	
Médiane	25.0	30.0	27.0	25.0	22.5	25.0	23.5	18.0	19.5	19.5	-	19.5	25.0	22.0	25.0	
75 centile	27.0	38.0	28.0	30.0	29.0	30.0	25.0	22.0	25.0	21.0	-	21.0	28.0	30.0	28.0	
N**	9	6	15	39	12	51	6	8	14	2	0	2	63	27	90	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2016)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	54.7	58.9	55.9	3 119	alcool	54.7	58.9	55.9	3 119
héroïne	4.3	2.9	3.9	217					
méthadone	0.4	0.5	0.4	23					
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	1	opioïdes	5.1	3.9	4.8	268
fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
autres opioïdes	0.4	0.6	0.5	26					
cocaïne en poudre	5.4	3.2	4.8	267					
crack	0.2	0.2	0.2	12	cocaïne ou dérivés	5.6	3.4	5.0	281
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	2					
amphétamines	0.6	1.2	0.8	45					
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	1					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.3	0.3	17	stimulants	1.0	1.6	1.2	66
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	1					
autres stimulants	0.0	0.1	0.0	2					
barbituriques	0.0	0.1	0.0	1					
benzodiazépines	0.5	1.6	0.8	47	hypnotiques/sédatifs	0.6	2.1	1.0	57
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.4	0.1	8					
LSD	0.0	0.1	0.1	3					
kétamine	0.0	0.0	0.0	0	hallucinogènes	0.0	0.1	0.1	3
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0					
cannabis	23.8	14.7	21.3	1 189	cannabis	23.8	14.7	21.3	1 189
tabac	2.6	4.8	3.2	180	tabac	2.6	4.8	3.2	180
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	1					
autre substance	0.4	0.2	0.4	20	autres substances	0.4	0.2	0.4	21
jeu pathologique	2.3	0.6	1.9	104					
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.3	1.2	2.0	113	comportement de type	6.0	10.1	7.1	398
troubles alimentaires	0.4	6.5	2.1	115	addictif				
autre comportement de type addictif	0.9	1.8	1.2	66					
N**	4 043	1 539	5 582	5 582		4 043	1 539	5 582	5 582
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2016)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	8.7	8.8	8.7
non	91.3	91.2	91.3
N**	1 579	524	2 103
<i>données manquantes</i>	2 464	1 015	3 479
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
coc/alc	17.2	7.9	14.6
can/alc	10.1	10.5	10.2
tab/alc	10.1	10.5	10.2
tab/can/alc	7.1	10.5	8.0
coc/op	3.0	2.6	2.9
can/coc/alc	4.0	0.0	2.9
can/coc/op	2.0	5.3	2.9
stim/coc/alc	1.0	5.3	2.2
med/alc	0.0	7.9	2.2
med/op	2.0	2.6	2.2
tab/can/coc/alc	3.0	0.0	2.2
op/alc	1.0	2.6	1.5
med/coc/alc	2.0	0.0	1.5
hal/stim	1.0	2.6	1.5
can/op/alc	1.0	2.6	1.5
can/coc	2.0	0.0	1.5
can/coc/op/alc	0.0	5.3	1.5
can/stim/coc/alc	2.0	0.0	1.5
can/med/coc	0.0	5.3	1.5
can/med/stim/coc/alc	2.0	0.0	1.5
tab/coc/alc	2.0	0.0	1.5
tab/med/alc	1.0	2.6	1.5
tab/med/op/alc	2.0	0.0	1.5
tab/can/coc/alc	2.0	0.0	1.5
tab/can/coc/op	2.0	0.0	1.5
tab/can/med/stim/coc	2.0	0.0	1.5
autres combinaisons	18.2	15.8	17.5
N**	99	37	136
<i>données manquantes</i>	38	9	47

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	38.7	46.4	16.2	12.9	62.5	0.0	33.8	87.0	66.7
4 à 6 jours par semaine	12.7	10.5	14.5	9.7	0.0	0.0	8.0	2.2	8.3
2 à 3 jours par semaine	14.2	11.1	24.0	12.9	0.0	0.0	15.9	2.2	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.2	8.5	19.6	22.6	6.3	0.0	19.9	0.0	16.7
aucune consommation	26.2	23.5	25.7	41.9	31.3	0.0	22.4	8.7	8.3
N**	1 689	153	179	31	16	0	825	92	12
<i>données manquantes</i>	523	55	49	10	9	1	137	14	6

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	43.9	51.4	10.3	21.1	69.6	0.0	36.0	89.9	0.0
4 à 6 jours par semaine	13.5	5.4	10.3	0.0	4.3	0.0	7.9	1.4	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.4	5.4	23.1	21.1	4.3	0.0	15.3	1.4	0.0
1 jour par semaine ou moins	7.8	10.8	20.5	31.6	8.7	100.0	16.4	4.3	0.0
aucune consommation	20.4	27.0	35.9	26.3	13.0	0.0	24.3	2.9	0.0
N**	716	37	39	19	23	1	189	69	0
<i>données manquantes</i>	191	23	14	6	9	1	38	5	3

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	40.2	47.4	15.1	16.0	66.7	0.0	34.2	88.2	66.7
4 à 6 jours par semaine	12.9	9.5	13.8	6.0	2.6	0.0	8.0	1.9	8.3
2 à 3 jours par semaine	14.3	10.0	23.9	16.0	2.6	0.0	15.8	1.9	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.1	8.9	19.7	26.0	7.7	100.0	19.2	1.9	16.7
aucune consommation	24.4	24.2	27.5	36.0	20.5	0.0	22.8	6.2	8.3
N**	2 405	190	218	50	39	1	1 014	161	12
<i>données manquantes</i>	714	78	63	16	18	2	175	19	9

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	9.4	57.1	46.2	31.0
4 à 6 jours par semaine	7.8	17.9	23.1	6.9
2 à 3 jours par semaine	10.9	7.1	23.1	20.7
1 jour par semaine ou moins	25.0	7.1	0.0	20.7
aucune manifestation	46.9	10.7	7.7	20.7
N**	64	28	13	29
<i>données manquantes</i>	30	67	2	9

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	14.3	50.0	63.4	11.8
4 à 6 jours par semaine	14.3	0.0	12.2	23.5
2 à 3 jours par semaine	28.6	16.7	12.2	17.6
1 jour par semaine ou moins	0.0	16.7	9.8	47.1
aucune manifestation	42.9	16.7	2.4	0.0
N**	7	6	82	17
<i>données manquantes</i>	3	12	18	11

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2016), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	9.9	55.9	61.1	23.9
4 à 6 jours par semaine	8.5	14.7	13.7	13.0
2 à 3 jours par semaine	12.7	8.8	13.7	19.6
1 jour par semaine ou moins	22.5	8.8	8.4	30.4
aucune manifestation	46.5	11.8	3.2	13.0
N**	71	34	95	46
<i>données manquantes</i>	33	79	20	20

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Âge lors de la première consommation										
moyenne	16.1	21.3	22.1	20.5	24.0	-	15.1	18.3	27.3	
écart-type	4.0	7.0	6.6	5.9	13.1	-	2.3	7.1	13.3	
1er quartile	14.0	18.0	18.0	16.5	18.0	-	14.0	15.0	18.0	
valeur médiane	16.0	19.5	20.0	18.5	20.0	-	15.0	16.0	24.0	
3e quartile	17.0	23.0	24.5	24.0	23.0	-	16.0	20.0	30.5	
N*	1 147	108	152	28	9	0	640	55	12	
données manquantes	1 065	100	76	13	16	1	322	51	6	
Âge lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.0	22.6	24.1	19.4	18.8	-	16.0	20.4	44.0	
écart-type	8.9	7.2	8.0	4.6	4.1	-	3.8	8.6	13.3	
1er quartile	18.0	18.0	19.0	16.0	15.5	-	15.0	16.0	44.0	
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	19.0	18.0	-	16.0	18.0	44.0	
3e quartile	25.0	25.0	27.0	20.0	22.0	-	17.0	20.0	44.0	
N*	878	61	69	15	4	0	350	48	1	
données manquantes	1 334	147	159	26	21	1	612	58	17	
Âge lors du début de la consommation problématique										
moyenne	31.1	24.0	25.7	23.2	31.6	-	17.4	25.1	31.5	
écart-type	12.4	7.8	7.5	7.2	13.7	-	4.8	12.8	12.8	
1er quartile	21.0	19.0	20.0	18.0	20.0	-	15.0	16.0	27.0	
valeur médiane	30.0	22.0	25.0	20.0	28.0	-	16.0	20.0	29.0	
3e quartile	40.0	27.0	28.5	28.0	34.0	-	18.0	30.0	34.0	
N*	1 128	106	144	25	14	0	629	68	11	
données manquantes	1 084	102	84	16	11	1	333	38	7	
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.5	8.9	8.4	5.0	7.2	-	5.4	18.9	7.8	
écart-type	13.1	7.1	6.6	5.2	8.6	-	6.2	16.2	6.5	
1er quartile	15.7	2.9	3.8	1.0	0.2	-	1.6	2.8	2.4	
valeur médiane	24.5	7.7	6.6	1.7	4.6	-	2.8	17.9	6.8	
3e quartile	35.1	12.6	10.8	8.4	16.8	-	6.5	26.9	10.7	
N*	558	21	67	15	3	0	469	32	6	
données manquantes	409	10	25	7	4	0	166	33	4	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), femmes

Patientes: principale substance posant problème									
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	18.3	20.7	20.3	18.6	31.2	20.0	15.2	17.1	-
écart-type	7.2	5.8	7.3	4.2	16.8	-	2.2	5.0	-
1er quartile	15.0	17.0	16.0	15.0	21.0	20.0	14.0	14.0	-
valeur médiane	16.0	19.5	17.0	17.0	24.5	20.0	15.0	16.0	-
3e quartile	20.0	23.0	22.0	21.0	38.5	20.0	16.0	19.0	-
N*	441	30	33	19	12	1	157	49	0
données manquantes	466	30	20	6	20	1	70	25	3
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	25.9	18.9	23.4	18.9	28.8	-	16.2	20.2	-
écart-type	11.4	6.3	11.5	3.8	19.3	-	3.3	5.6	-
1er quartile	18.0	17.0	16.0	16.0	22.0	-	15.0	16.0	-
valeur médiane	22.0	19.0	19.0	17.0	28.0	-	16.0	19.0	-
3e quartile	30.0	23.0	29.0	23.0	42.0	-	17.0	23.5	-
N*	366	19	14	11	6	0	84	40	0
données manquantes	541	41	39	14	26	2	143	34	3
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	34.6	22.6	25.2	21.2	39.3	20.0	17.0	22.5	-
écart-type	12.6	7.0	10.7	4.8	15.9	-	3.9	8.4	-
1er quartile	25.0	17.5	17.0	17.0	28.5	20.0	15.0	17.0	-
valeur médiane	33.0	21.5	20.0	22.0	38.0	20.0	16.0	20.0	-
3e quartile	44.0	24.0	31.0	24.0	47.0	20.0	18.0	29.0	-
N*	515	28	33	17	16	1	148	46	0
données manquantes	392	32	20	8	16	1	79	28	3
Période de latence (en années)**									
moyenne	27.2	2.9	8.0	7.3	2.1	6.2	6.0	20.2	-
écart-type	13.7	3.8	6.6	7.0	0.5	-	7.8	15.7	-
1er quartile	16.6	0.5	2.3	1.5	1.8	6.2	1.3	6.1	-
valeur médiane	27.4	1.2	6.5	3.8	2.1	6.2	2.8	19.0	-
3e quartile	39.4	4.2	12.2	12.7	2.5	6.2	6.7	31.2	-
N*	191	7	14	12	2	1	116	34	0
données manquantes	160	4	7	1	8	1	32	14	2

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2016), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.7	21.2	21.8	19.8	28.1	20.0	15.1	17.7	27.3	
écart-type	5.2	6.8	6.7	5.3	15.4	-	2.3	6.2	13.3	
1er quartile	15.0	17.0	18.0	16.0	18.0	20.0	14.0	14.0	18.0	
valeur médiane	16.0	19.5	20.0	18.0	23.0	20.0	15.0	16.0	24.0	
3e quartile	18.0	23.0	24.0	22.0	30.0	20.0	16.0	19.0	30.5	
N*	1 588	138	185	47	21	1	797	104	12	
données manquantes	1 531	130	96	19	36	2	392	76	9	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	23.1	21.7	24.0	19.2	24.8	-	16.1	20.3	44.0	
écart-type	9.8	7.2	8.6	4.2	15.5	-	3.7	7.4	13.3	
1er quartile	18.0	18.0	18.0	16.0	16.0	-	15.0	16.0	44.0	
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	18.5	23.0	-	16.0	18.0	44.0	
3e quartile	26.0	24.0	27.0	22.0	30.0	-	17.0	21.5	44.0	
N*	1 244	80	83	26	10	0	434	88	1	
données manquantes	1 875	188	198	40	47	3	755	92	20	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.2	23.7	25.6	22.4	35.7	20.0	17.3	24.0	31.5	
écart-type	12.6	7.7	8.2	6.4	15.2	-	4.7	11.3	12.8	
1er quartile	22.0	19.0	20.0	17.0	25.0	20.0	15.0	16.0	27.0	
valeur médiane	30.0	22.0	25.0	20.5	32.5	20.0	16.0	20.0	29.0	
3e quartile	40.0	27.0	29.0	25.0	44.0	20.0	18.0	30.0	34.0	
N*	1 643	134	177	42	30	1	777	114	11	
données manquantes	1 476	134	104	24	27	2	412	66	10	
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.9	7.4	8.4	6.0	5.2	6.2	5.6	19.6	7.8	
écart-type	13.3	6.9	6.5	6.1	6.7	-	6.6	15.8	6.5	
1er quartile	16.1	2.0	3.5	1.0	1.8	6.2	1.6	3.4	2.4	
valeur médiane	24.9	4.1	6.6	3.6	2.5	6.2	2.8	17.9	6.8	
3e quartile	35.6	12.0	10.9	10.0	4.6	6.2	6.5	30.3	10.7	
N*	749	28	81	27	5	1	585	66	6	
données manquantes	569	14	32	8	12	1	198	47	6	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	21.9	13.8	16.0	21.6
écart-type	6.2	4.4	2.3	14.6
1er quartile	18.0	12.0	14.0	15.5
valeur médiane	20.0	13.0	15.5	18.5
3e quartile	26.0	15.0	17.0	21.0
N*	31	41	6	20
<i>données manquantes</i>	63	54	9	18
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	25.7	15.7	18.7	19.1
écart-type	9.6	8.2	4.0	5.4
1er quartile	18.0	13.0	16.0	15.5
valeur médiane	21.5	15.0	18.0	18.0
3e quartile	30.0	17.0	20.0	21.5
N*	22	41	7	12
<i>données manquantes</i>	72	54	8	26
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28.5	16.9	18.2	25.4
écart-type	9.7	6.5	4.2	14.2
1er quartile	21.0	14.0	16.0	18.0
valeur médiane	26.0	16.0	18.0	22.0
3e quartile	33.0	18.0	20.0	26.0
N*	45	54	9	21
<i>données manquantes</i>	49	41	6	17
Période de latence (en années)**				
moyenne	8.7	7.2	16.3	7.6
écart-type	7.3	9.1	18.1	6.6
1er quartile	2.2	2.1	2.5	2.6
valeur médiane	7.2	4.0	9.7	5.1
3e quartile	14.9	6.3	36.7	11.1
N*	18	36	3	15
<i>données manquantes</i>	38	35	9	11

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	37.5	15.8	17.3	22.5	
écart-type	7.8	4.1	6.2	8.2	
1er quartile	32.0	13.5	14.0	16.0	
valeur médiane	37.5	14.5	16.0	19.5	
3e quartile	43.0	17.0	20.5	25.0	
N*	2	12	56	10	
données manquantes	8	6	44	18	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	35.5	15.8	18.0	22.5	
écart-type	10.6	2.9	6.2	9.5	
1er quartile	28.0	14.0	14.0	16.0	
valeur médiane	35.5	15.0	16.0	17.5	
3e quartile	43.0	17.0	21.0	28.5	
N*	2	10	46	8	
données manquantes	8	8	54	20	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	37.3	16.9	19.8	25.6	
écart-type	4.9	3.7	6.8	12.4	
1er quartile	34.0	15.0	15.0	18.0	
valeur médiane	35.0	16.0	19.0	20.0	
3e quartile	43.0	19.0	22.0	32.0	
N*	3	13	58	11	
données manquantes	7	5	42	17	
Période de latence (en années)**					
moyenne	5.5	3.0	5.6	10.0	
écart-type	2.2	1.6	7.2	11.2	
1er quartile	3.9	2.0	1.6	5.3	
valeur médiane	5.5	2.6	3.4	6.8	
3e quartile	7.0	4.0	4.9	8.6	
N*	2	11	24	6	
données manquantes	4	4	21	11	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2016), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal					
<i>Hommes et femmes</i>	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Âge lors de la première apparition					
moyenne	22.8	14.2	17.1	21.9	
écart-type	7.2	4.4	5.9	12.7	
1er quartile	18.0	12.0	14.0	16.0	
valeur médiane	20.0	14.0	16.0	18.5	
3e quartile	26.0	15.0	20.0	25.0	
N*	33	53	62	30	
<i>données manquantes</i>	71	60	53	36	
Âge lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	26.5	15.7	18.1	20.5	
écart-type	9.8	7.4	5.9	7.3	
1er quartile	18.5	13.0	14.0	16.0	
valeur médiane	24.5	15.0	17.0	18.0	
3e quartile	31.5	17.0	20.0	23.5	
N*	24	51	53	20	
<i>données manquantes</i>	80	62	62	46	
Âge lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	29.1	16.9	19.6	25.5	
écart-type	9.7	6.1	6.5	13.4	
1er quartile	21.0	14.0	15.0	18.0	
valeur médiane	26.5	16.0	19.0	21.5	
3e quartile	34.5	18.0	22.0	26.5	
N*	48	67	67	32	
<i>données manquantes</i>	56	46	48	34	
Période de latence (en années)**					
moyenne	8.4	6.2	6.8	8.3	
écart-type	7.0	8.2	9.1	7.9	
1er quartile	2.4	2.0	1.7	4.3	
valeur médiane	6.8	3.0	3.5	5.7	
3e quartile	12.7	6.0	9.7	10.8	
N*	20	47	27	21	
<i>données manquantes</i>	42	39	30	22	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2016)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	28.8	20.0	27.1	5.3	11.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	8.3	0.0	3.4
fumée/inhalation	47.1	40.0	45.7	16.7	17.6	16.9	6.7	15.4	10.7	98.2	99.4	98.4	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	46.7	23.1	35.7	0.9	0.6	0.8	91.7	88.2	89.7
sniff	21.2	36.0	24.0	77.3	67.6	75.3	46.7	61.5	53.6	0.1	0.0	0.1	0.0	5.9	3.4
autre	1.0	4.0	1.6	0.8	2.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	5.9	3.4
N**	104	25	129	132	34	166	15	13	28	813	181	994	12	17	29
<i>données manquantes</i>	69	19	88	85	16	101	11	6	17	149	46	195	10	8	18

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injections au cours de la vie*																
oui	4.0	2.8	3.6	55.9	45.9	53.9	12.2	30.6	15.5	0.8	0.6	0.8	6.1	4.7	5.7	230
non	94.8	96.6	95.3	40.6	48.6	42.2	86.6	69.4	83.5	98.6	99.4	98.8	92.7	94.7	93.3	3 767
ne veut pas répondre	1.2	0.6	1.0	3.5	5.4	3.9	1.2	0.0	1.0	0.6	0.0	0.4	1.2	0.6	1.0	42
N**	1 562	668	2 230	143	37	180	164	36	200	726	165	891	2 902	1 137	4 039	4 039
données manquantes	650	239	889	65	23	88	64	17	81	236	62	298	1 141	402	1 543	1 543
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	4.2	1.2	3.5	49.3	50.0	49.4	28.1	41.7	31.8	4.5	0.0	3.9	12.7	10.4	12.2	75
non	95.8	98.8	96.5	50.7	50.0	50.6	71.9	58.3	68.2	95.5	100.0	96.1	87.3	89.6	87.8	539
N**	261	81	342	69	14	83	32	12	44	66	10	76	480	134	614	614
données manquantes	1 951	826	2 777	139	46	185	196	41	237	896	217	1 113	3 563	1 405	4 968	4 968
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	4.1	1.2	3.4	44.8	63.6	47.8	19.4	18.2	19.0	4.5	0.0	3.9	10.5	7.5	9.9	60
non	95.9	98.8	96.6	55.2	36.4	52.2	80.6	81.8	81.0	95.5	100.0	96.1	89.5	92.5	90.1	547
N**	268	86	354	58	11	69	31	11	42	67	9	76	474	133	607	607
données manquantes	1 944	821	2 765	150	49	199	197	42	239	895	218	1 113	3 569	1 406	4 975	4 975
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	25.0	33.3	28.6	28.0	40.0	30.0	25.0	50.0	37.5	-	-	-	25.7	42.9	30.6	15
non	75.0	66.7	71.4	68.0	60.0	66.7	50.0	50.0	50.0	-	-	-	68.6	50.0	63.3	31
ne veut pas répondre	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	25.0	0.0	12.5	-	-	-	5.7	7.1	6.1	3
N**	4	3	7	25	5	30	4	4	8	0	0	0	35	14	49	49
données manquantes	50	15	65	47	9	56	14	7	21	3	1	4	120	35	155	155
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
non	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	62
N**	23	11	34	15	4	19	2	4	6	1	0	1	42	20	62	62
données manquantes	31	7	38	57	10	67	16	7	23	2	1	3	113	29	142	142
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
données manquantes	54	18	72	72	14	86	18	11	29	3	1	4	155	49	204	204

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	3.9	0.0	18.2	10.0	50.0	0.0	50.0	3.6	6.7	4.4	5
de 15 à 16 ans	6.7	40.0	11.4	10.3	8.3	9.8	22.2	36.4	30.0	0.0	0.0	0.0	9.6	23.3	13.3	15
de 17 à 18 ans	46.7	40.0	45.7	15.4	50.0	23.5	33.3	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	28.9	30.0	29.2	33
de 19 à 20 ans	23.3	0.0	20.0	23.1	16.7	21.6	22.2	18.2	20.0	0.0	0.0	0.0	21.7	13.3	19.5	22
de 21 à 25 ans	16.7	20.0	17.1	25.6	16.7	23.5	11.1	9.1	10.0	0.0	0.0	0.0	20.5	16.7	19.5	22
de 26 à 30 ans	6.7	0.0	5.7	12.8	8.3	11.8	11.1	9.1	10.0	0.0	0.0	0.0	10.8	6.7	9.7	11
de 31 à 39 ans	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	5.9	0.0	9.1	5.0	50.0	0.0	50.0	4.8	3.3	4.4	5
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	30	5	35	39	12	51	9	11	20	2	0	2	83	30	113	113
<i>données manquantes</i>	32	14	46	41	5	46	11	0	11	4	1	5	94	23	117	117

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	17.1	22.7	5.3	34.8	0.0	10.5	29.4	27.8
héroïne	0.8	2.5	5.5	2.6	8.7	0.0	0.4	2.9	0.0
méthadone	0.3	6.0	0.9	0.0	4.3	0.0	0.1	1.0	0.0
buprénorphine	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
autres opioïdes	0.3	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne en poudre	4.3	19.6	2.7	15.8	17.4	0.0	5.1	4.9	0.0
crack	0.0	0.0	0.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
amphétamines	1.0	1.5	5.9	5.3	4.3	0.0	3.0	0.0	11.1
méthamphétamines	0.1	0.5	1.4	5.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.0	1.5	4.1	13.2	8.7	0.0	3.5	0.0	16.7
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.2	11.1	3.6	7.9	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
GHB/GBL	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.1	1.0	5.6
LSD	0.5	1.0	2.7	2.6	0.0	0.0	1.9	0.0	5.6
kétamine	0.1	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.3	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	6.4	19.1	24.5	18.4	21.7	0.0	-	15.7	11.1
tabac	9.9	17.1	16.4	13.2	26.1	0.0	11.7	-	33.3
autre substance	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	0.0
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0
troubles alimentaires	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	83.5	57.3	55.5	55.3	34.8	100.0	78.4	54.9	61.1
N**	1 982	199	220	38	23	1	913	102	18
<i>données manquantes</i>	230	9	8	3	2	0	49	4	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	10.7	11.3	8.7	24.1	0.0	5.8	12.7	0.0
héroïne	0.7	8.9	13.2	4.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.5	14.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.3	23.2	0.0	4.3	3.4	50.0	4.3	2.8	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	11.3	4.3	0.0	0.0	3.4	2.8	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	3.6	7.5	0.0	0.0	50.0	2.9	1.4	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.0
LSD	0.0	3.6	1.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
kétamine	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	4.8	12.5	20.8	8.7	3.4	50.0	-	8.5	33.3
tabac	8.9	19.6	7.5	8.7	13.8	0.0	11.6	-	0.0
autre substance	0.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.3	46.4	60.4	82.6	65.5	50.0	84.1	78.9	66.7
N**	811	56	53	23	29	2	207	71	3
données manquantes	96	4	0	2	3	0	20	3	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2016), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	15.7	20.5	6.6	28.8	0.0	9.6	22.5	23.8
héroïne	0.8	3.9	7.0	3.3	5.8	0.0	0.4	1.7	0.0
méthadone	0.3	7.8	1.5	0.0	1.9	0.0	0.1	0.6	0.0
buprénorphine	0.1	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
autres opioïdes	0.3	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cocaïne en poudre	4.0	20.4	2.2	11.5	9.6	33.3	5.0	4.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.7	3.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
amphétamines	0.9	1.2	7.0	4.9	1.9	0.0	3.0	1.2	9.5
méthamphétamines	0.1	0.4	1.5	3.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.8	2.0	4.8	8.2	3.8	33.3	3.4	0.6	14.3
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.4	10.6	2.9	4.9	0.0	0.0	0.6	2.9	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.2	1.2	4.8
LSD	0.4	1.6	2.6	1.6	0.0	0.0	1.8	0.0	4.8
kétamine	0.1	0.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	5.9	17.6	23.8	14.8	11.5	33.3	-	12.7	14.3
tabac	9.6	17.6	14.7	11.5	19.2	0.0	11.7	-	28.6
autre substance	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	83.7	54.9	56.4	65.6	51.9	66.7	79.5	64.7	61.9
N**	2 793	255	273	61	52	3	1 120	173	21
<i>données manquantes</i>	326	13	8	5	5	0	69	7	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	6.0	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.4	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	1.2	0.0	0.0
tabac	2.4	0.0	0.0	0.0
autre substance	2.4	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	1.2	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.2	-	0.0	9.7
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	55.8	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	89.3	41.9	100.0	90.3
N**	84	86	13	31
données manquantes	10	9	2	7

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	0.0	0.0	4.7	5.6
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	1.2	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	1.2	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	1.2	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	1.2	0.0
tabac	0.0	0.0	2.4	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	66.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	100.0	33.3	91.8	94.4
N**	8	18	85	18
<i>données manquantes</i>	2	0	15	10

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2016), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	5.4	0.0	4.1	2.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.2	0.0	1.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	1.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	1.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	1.0	1.0	0.0
tabac	2.2	0.0	2.0	0.0
autre substance	2.2	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	1.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.1	-	0.0	6.1
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	57.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	90.2	40.4	92.9	91.8
N**	92	104	98	49
<i>données manquantes</i>	12	9	17	17

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

Patient-e-s: problème principal																Tous problèmes principaux			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	31.0	40.0	32.4	20.9	25.0	21.3	8.5	9.1	8.6	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	37.5	16.6	17.9	16.8	40
4 à 6 jours par semaine	13.8	0.0	11.8	18.6	25.0	19.1	11.0	18.2	11.8	0.0	40.0	16.7	25.0	0.0	12.5	12.6	12.8	12.6	30
2 à 3 jours par semaine	24.1	40.0	26.5	27.9	25.0	27.7	29.3	9.1	26.9	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	24.6	17.9	23.5	56
1 jour par semaine ou moins	20.7	20.0	20.6	20.9	0.0	19.1	36.6	27.3	35.5	42.9	40.0	41.7	25.0	0.0	12.5	28.1	25.6	27.7	66
aucune consomm.	10.3	0.0	8.8	11.6	25.0	12.8	14.6	36.4	17.2	57.1	20.0	41.7	0.0	25.0	12.5	18.1	25.6	19.3	46
N**	29	5	34	43	4	47	82	11	93	7	5	12	4	4	8	199	39	238	238
données manquantes	179	55	234	185	49	234	880	216	1 096	18	27	45	238	153	391	4 071	2 249	6 320	6 320
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	8.3	0.0	6.3	28.6	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	15.0	6
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	16.7	0.0	12.5	28.6	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	10.0	4
1 jour par semaine ou moins	8.3	0.0	6.3	14.3	33.3	23.1	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	13.8	27.3	17.5	7
aucune consomm.	66.7	100.0	75.0	28.6	66.7	46.2	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7	72.7	57.5	23
N**	12	4	16	7	6	13	4	0	4	2	1	3	0	0	0	29	11	40	40
données manquantes	2 200	903	3 103	221	47	268	958	227	1 185	23	31	54	242	157	399	4 241	2 277	6 518	6 518
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	6.0	5.6	5.9	8.0	14.3	9.4	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	6.2	5.1	6.0	11
4 à 6 jours par semaine	4.5	0.0	3.5	8.0	0.0	6.3	5.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	7
2 à 3 jours par semaine	17.9	16.7	17.6	16.0	42.9	21.9	2.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	15.4	13.0	24
1 jour par semaine ou moins	28.4	11.1	24.7	16.0	42.9	21.9	30.8	22.2	29.2	25.0	0.0	20.0	0.0	100.0	50.0	24.8	20.5	23.9	44
aucune consomm.	43.3	66.7	48.2	52.0	0.0	40.6	61.5	77.8	64.6	50.0	100.0	60.0	100.0	0.0	50.0	51.7	59.0	53.3	98
N**	67	18	85	25	7	32	39	9	48	4	1	5	1	1	2	145	39	184	184
données manquantes	2 145	889	3 034	183	53	236	923	218	1 141	21	31	52	241	156	397	4 125	2 249	6 374	6 374
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	33.0	16.1	29.0	22.2	80.0	31.3	32.6	33.3	32.7	25.0	100.0	40.0	0.0	0.0	0.0	29.4	29.6	29.5	74
4 à 6 jours par semaine	3.0	6.5	3.8	18.5	0.0	15.6	7.0	11.1	7.7	25.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.4	7.2	18
2 à 3 jours par semaine	15.0	9.7	13.7	29.6	0.0	25.0	14.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	7.4	15.1	38
1 jour par semaine ou moins	19.0	16.1	18.3	11.1	0.0	9.4	30.2	22.2	28.8	50.0	0.0	40.0	0.0	100.0	50.0	19.8	16.7	19.1	48
aucune consomm.	30.0	51.6	35.1	18.5	20.0	18.8	16.3	33.3	19.2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	26.4	38.9	29.1	73
N**	100	31	131	27	5	32	43	9	52	4	1	5	1	1	2	197	54	251	251
données manquantes	2 112	876	2 988	181	55	236	185	44	229	21	31	52	241	156	397	4 073	2 234	6 307	6 307

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	6.7	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	4.2	5.0	4.4	3
4 à 6 jours par semaine	13.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.1	15.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.4	5.0	8.8	6
2 à 3 jours par semaine	6.7	20.0	10.0	33.3	0.0	33.3	33.3	20.0	28.6	0.0	14.3	3.7	0.0	0.0	0.0	10.4	15.0	11.8	8
1 jour par semaine ou moins	20.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	7.1	25.0	42.9	29.6	0.0	0.0	0.0	18.8	15.0	17.6	12
aucune consomm.	53.3	80.0	60.0	66.7	0.0	66.7	44.4	60.0	50.0	60.0	42.9	55.6	0.0	0.0	0.0	56.3	60.0	57.4	39
N**	15	5	20	3	0	3	9	5	14	20	7	27	0	1	1	48	20	68	68
données manquantes	2 197	902	3 099	205	60	265	219	48	267	942	220	1 162	242	156	398	4 222	2 268	6 490	6 490
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	2
1 jour par semaine ou moins	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	2
aucune consomm.	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	1
N**	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
données manquantes	2 209	907	3 116	208	60	268	226	53	279	962	227	1 189	242	157	399	4 265	2 288	6 553	6 553
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	12.5	0.0	12.5	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	8.6	3
1 jour par semaine ou moins	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	33.3	16.7	0.0	14.3	15.4	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	17.2	16.7	17.1	6
aucune consomm.	62.5	0.0	62.5	0.0	50.0	33.3	83.3	100.0	85.7	76.9	100.0	81.3	0.0	0.0	0.0	72.4	83.3	74.3	26
N**	8	0	8	1	2	3	6	1	7	13	3	16	0	0	0	29	6	35	35
données manquantes	2 204	907	3 111	207	58	265	222	52	274	949	224	1 173	242	157	399	4 241	2 282	6 523	6 523
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
N**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
données manquantes	2 211	907	3 118	208	60	268	228	53	281	962	227	1 189	242	157	399	4 268	2 288	6 556	6 556

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	12.0	9.9	11.4	8.2	23.5	11.5	5.8	8.3	6.2	14.3	10.9	13.6	13.6	13.8	13.6	364
1 fois par mois ou moins	3.9	4.9	4.2	18.0	29.4	20.5	10.1	33.3	13.6	24.5	32.6	26.0	10.4	11.5	10.7	285
2 à 4 fois par mois	7.7	7.2	7.5	16.4	11.8	15.4	30.4	25.0	29.6	45.3	42.4	44.7	18.0	14.0	16.9	451
2 à 3 fois par semaine	16.6	14.8	16.0	27.9	17.6	25.6	29.0	16.7	27.2	11.8	8.7	11.2	16.0	14.7	15.7	418
4 fois ou plus par semaine	59.9	63.3	60.9	29.5	17.6	26.9	24.6	16.7	23.5	4.3	5.4	4.5	42.0	46.1	43.1	1 151
N**	1 226	515	1 741	61	17	78	69	12	81	400	92	492	1 920	749	2 669	2 669
données manquantes	986	392	1 378	147	43	190	159	41	200	562	135	697	2 123	790	2 913	2 913
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.1	4.8	6.4	49.0	66.7	52.4	30.0	44.4	31.9	55.8	59.7	56.6	21.3	20.7	21.1	465
3 ou 4	18.4	18.9	18.5	21.6	16.7	20.6	30.0	33.3	30.4	29.5	27.3	29.0	22.3	20.3	21.8	479
5 ou 6	24.9	23.1	24.3	15.7	8.3	14.3	15.0	11.1	14.5	8.3	11.7	9.0	20.0	19.2	19.8	436
7 à 9	19.6	26.8	21.8	5.9	0.0	4.8	13.3	11.1	13.0	3.2	0.0	2.6	14.5	20.0	16.1	354
10 ou plus	30.0	26.4	28.9	7.8	8.3	7.9	11.7	0.0	10.1	3.2	1.3	2.8	21.9	19.7	21.3	468
N**	1 044	455	1 499	51	12	63	60	9	69	312	77	389	1 573	629	2 202	2 202
données manquantes	1 168	452	1 620	157	48	205	168	44	212	650	150	800	2 470	910	3 380	3 380
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	15.5	14.3	15.1	43.5	56.3	46.8	25.4	40.0	27.5	47.0	66.7	50.8	26.7	31.1	27.9	665
moins d'une fois par mois	12.3	11.8	12.2	21.7	25.0	22.6	27.1	10.0	24.6	35.3	22.2	32.8	18.4	14.1	17.1	408
1 fois par mois	11.9	11.6	11.8	6.5	0.0	4.8	23.7	30.0	24.6	11.1	6.2	10.1	11.6	9.3	11.0	261
1 fois par semaine	23.5	22.7	23.3	13.0	0.0	9.7	15.3	10.0	14.5	6.0	4.9	5.8	18.0	17.4	17.8	424
presque chaque jour	36.8	39.6	37.7	15.2	18.8	16.1	8.5	10.0	8.7	0.6	0.0	0.5	25.3	28.2	26.1	622
N**	1 105	475	1 580	46	16	62	59	10	69	334	81	415	1 691	689	2 380	2 380
données manquantes	1 107	432	1 539	162	44	206	169	43	212	628	146	774	2 352	850	3 202	3 202

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	38.8	41.9	39.7	11.1	23.5	14.1	19.1	23.1	19.8	21.5	12.5	19.7	32.5	38.0	34.1	798
1 jour par semaine ou moins	1.4	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	5.5	4.8	5.4	2.5	1.4	2.2	51
2 à 3 jours par semaine	1.0	1.5	1.1	0.0	5.9	1.4	0.0	0.0	0.0	5.0	6.7	5.4	1.9	2.3	2.0	47
4 à 6 jours par semaine	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	1.9	1.9	1.9	1.1	0.7	1.0	23
1 fois par jour	3.1	3.0	3.0	7.4	5.9	7.0	2.9	15.4	4.9	2.9	6.7	3.6	3.0	3.8	3.2	75
plusieurs fois par jour	55.0	52.3	54.2	81.5	64.7	77.5	73.5	61.5	71.6	63.2	67.3	64.1	59.0	53.8	57.5	1 343
N**	916	396	1 312	54	17	71	68	13	81	419	104	523	1 647	690	2 337	2 337
<i>données manquantes</i>	1 296	511	1 807	154	43	197	160	40	200	543	123	666	2 396	849	3 245	3 245
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	19.7	22.0	20.3	15.6	27.3	17.9	28.8	22.2	27.9	57.8	67.5	59.9	32.1	33.0	32.3	455
11 à 20	47.4	51.5	48.6	46.7	54.5	48.2	50.0	44.4	49.2	34.6	31.3	33.9	43.3	46.2	44.1	621
21 à 30	22.6	22.0	22.5	28.9	9.1	25.0	11.5	33.3	14.8	5.6	1.2	4.6	17.3	16.1	17.0	239
31 ou plus	10.2	4.5	8.6	8.9	9.1	8.9	9.6	0.0	8.2	2.0	0.0	1.5	7.2	4.7	6.5	92
N**	508	200	708	45	11	56	52	9	61	306	83	389	1 022	385	1 407	1 407
<i>données manquantes</i>	53	30	83	3	2	5	3	1	4	23	8	31	89	43	132	132

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	29.5	82.4	81.0	37.5	80.0	0.0	51.9	53.1	0.0
abstinence limitée dans le temps	25.8	0.0	6.9	25.0	0.0	0.0	9.3	12.5	0.0
consommation contrôlée	28.7	5.9	1.7	12.5	20.0	0.0	17.8	25.0	0.0
aucune limitation envisagée	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	50.0
pas déterminé pour l'instant	13.7	7.8	6.9	25.0	0.0	0.0	15.5	6.3	50.0
autre	0.1	3.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
N**	725	51	58	8	5	0	129	32	2
données manquantes	1 487	157	170	33	20	1	833	74	16

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	31.7	82.4	83.3	100.0	42.9	0.0	66.7	42.9	0.0
abstinence limitée dans le temps	19.2	5.9	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
consommation contrôlée	35.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	9.5	28.6	0.0
aucune limitation envisagée	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.2	11.8	8.3	0.0	28.6	0.0	19.0	28.6	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	265	17	12	1	7	0	21	14	0
données manquantes	642	43	41	24	25	2	206	60	3

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2016), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	30.1	82.4	81.4	44.4	58.3	0.0	54.0	50.0	0.0
abstinence limitée dans le temps	24.0	1.5	7.1	22.2	0.0	0.0	8.0	8.7	0.0
consommation contrôlée	30.5	4.4	1.4	11.1	25.0	0.0	16.7	26.1	0.0
aucune limitation envisagée	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	50.0
pas déterminé pour l'instant	13.5	8.8	7.1	22.2	16.7	0.0	16.0	13.0	50.0
autres	0.1	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
N**	990	68	70	9	12	0	150	46	2
données manquantes	2 129	200	211	57	45	3	1 039	134	19

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), hommes

Hommes

	Patients: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	28.8	31.3	15.7	42.9	75.0	0.0	20.9	37.1	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	28.2	45.8	39.2	28.6	75.0	0.0	15.5	40.0	100.0
diffic. compréhension/mémoire	10.6	22.9	3.9	0.0	25.0	0.0	11.8	22.9	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	10.8	22.9	7.8	0.0	25.0	0.0	17.3	22.9	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.6	2.1	0.0	0.0	25.0	0.0	0.9	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	4.7	4.2	2.0	0.0	25.0	0.0	2.7	0.0	0.0
hallucinations	0.8	6.3	3.9	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.4	14.6	11.8	14.3	25.0	0.0	9.1	11.4	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	20.2	27.1	17.6	14.3	75.0	0.0	14.5	31.4	50.0
pensées suicidaires sérieuses	7.5	8.3	11.8	0.0	25.0	0.0	11.8	14.3	50.0
tentatives de suicide	3.1	4.2	3.9	0.0	25.0	0.0	0.9	5.7	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
aucun	42.4	33.3	51.0	42.9	0.0	0.0	50.0	40.0	0.0
N**	510	48	51	7	4	0	110	35	2
<i>données manquantes</i>	<i>1 702</i>	<i>160</i>	<i>177</i>	<i>34</i>	<i>21</i>	<i>1</i>	<i>852</i>	<i>71</i>	<i>16</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), femmes

Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	52.7	60.0	50.0	0.0	80.0	0.0	33.3	53.8	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	42.4	50.0	75.0	0.0	60.0	0.0	27.8	61.5	100.0
diffic. compréhension/mémoire	14.3	0.0	25.0	0.0	40.0	0.0	11.1	15.4	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	10.8	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	11.1	15.4	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	7.9	0.0	12.5	0.0	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0
hallucinations	1.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	6.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	38.9	20.0	50.0	0.0	100.0	0.0	22.2	69.2	0.0
pensées suicidaires sérieuses	9.4	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	30.8	0.0
tentatives de suicide	3.4	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	11.1	23.1	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun	16.7	30.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	23.1	0.0
N**	203	10	8	0	5	0	18	13	1
<i>données manquantes</i>	<i>704</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>25</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>209</i>	<i>61</i>	<i>2</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2016), hommes et femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	35.6	36.2	20.3	42.9	77.8	0.0	22.7	41.7	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	32.3	46.6	44.1	28.6	66.7	0.0	17.2	45.8	100.0
diffic. compréhension/mémoire	11.6	19.0	6.8	0.0	33.3	0.0	11.7	20.8	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	10.8	19.0	6.8	0.0	33.3	0.0	16.4	20.8	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.4	1.7	0.0	0.0	11.1	0.0	0.8	2.1	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	5.6	3.4	3.4	0.0	22.2	0.0	3.9	0.0	0.0
hallucinations	0.8	5.2	5.1	0.0	0.0	0.0	3.9	4.2	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.0	13.8	10.2	14.3	11.1	0.0	7.8	14.6	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	25.5	25.9	22.0	14.3	88.9	0.0	15.6	41.7	33.3
pensées suicidaires sérieuses	8.0	6.9	10.2	0.0	55.6	0.0	10.2	18.8	33.3
tentatives de suicide	3.2	3.4	3.4	0.0	33.3	0.0	2.3	10.4	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
aucun	35.1	32.8	47.5	42.9	0.0	0.0	50.0	35.4	0.0
N**	713	58	59	7	9	0	128	48	3
<i>données manquantes</i>	2 406	210	222	59	48	3	1 061	132	18

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2016)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	41.5	37.8	38.6	363
filles/fils	13.4	10.8	11.4	107
sœur/frère	5.1	4.6	4.7	44
conjoint-e/partenaire	29.0	39.3	36.9	347
autre proche/parent-e	2.3	2.4	2.3	22
collègue/ami-e	2.8	2.2	2.3	22
employeur/se, enseignant-e	2.3	1.0	1.3	12
tuteur/trice, curateur/trice	0.5	0.0	0.1	1
autre	3.2	2.1	2.3	22
N**	217	723	940	940
<i>données manquantes</i>	10	26	36	36

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2016)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	51.8	265
héroïne	4.5	23
méthadone	0.2	1
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.6	3
cocaïne en poudre	7.4	38
crack	0.0	0
autre forme de cocaïne	0.0	0
amphétamines	0.8	4
méthamphétamines	0.4	2
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.2	1
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.2	1
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1
LSD	0.0	0
kétamine	0.2	1
autres hallucinogènes	0.2	1
substances volatiles	0.0	0
cannabis	23.6	121
tabac	1.2	6
autre substance	0.6	3
jeu pathologique	2.0	10
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.9	15
troubles alimentaires	0.8	4
autre comportement de type addictif	1.8	9
N**	512	512
<i>données manquantes</i>	<i>464</i>	<i>464</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	71.6			76.7			83.8			83.3			22.2			65.2			3 935
femmes	28.4			23.3			16.2			16.7			77.8			34.8			2 100
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2 116	839	2 955	197	60	257	191	37	228	837	168	1 005	215	753	968	3 935	2 100	6 035	6 035
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	1.9	1.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	50
15-19	1.8	1.5	1.8	0.0	1.7	0.4	5.8	13.5	7.0	58.9	56.5	58.5	4.2	2.3	2.7	15.7	7.8	13.0	781
20-24	3.6	2.6	3.3	5.1	13.3	7.0	11.0	10.8	11.0	15.6	19.6	16.2	5.2	4.3	4.5	7.5	6.0	7.0	421
25-29	5.7	4.1	5.2	9.1	16.7	10.9	20.9	21.6	21.1	9.2	8.3	9.1	5.7	7.5	7.1	8.0	7.4	7.8	467
30-34	10.4	8.1	9.7	14.7	21.7	16.3	18.3	10.8	17.1	5.0	5.4	5.1	4.7	8.3	7.5	9.5	8.8	9.3	559
35-39	11.3	10.7	11.1	17.3	8.3	15.2	18.3	18.9	18.4	4.1	4.8	4.2	6.6	9.0	8.5	10.0	9.4	9.8	589
40-44	11.1	10.7	11.0	20.8	10.0	18.3	12.0	10.8	11.8	3.1	0.6	2.7	8.0	11.8	11.0	9.6	9.8	9.7	582
45-49	13.0	15.3	13.6	15.7	16.7	16.0	6.3	10.8	7.0	1.1	0.6	1.0	11.8	15.3	14.5	9.7	13.1	10.9	655
50-54	14.4	15.3	14.6	9.6	10.0	9.7	5.8	0.0	4.8	0.6	1.2	0.7	15.6	15.4	15.4	10.1	12.9	11.1	667
55-59	12.2	12.4	12.3	3.0	1.7	2.7	0.5	2.7	0.9	0.5	0.0	0.4	14.6	9.9	11.0	8.1	9.7	8.6	520
60-64	8.0	10.7	8.8	4.6	0.0	3.5	1.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	8.5	5.8	6.4	5.5	6.9	6.0	360
65-69	4.6	4.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	2.9	3.8	3.2	193
70-74	2.6	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.5	3.5	1.6	2.5	1.9	115
75 et plus	1.1	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.0	2.7	1.0	1.2	1.0	63
N**	2 115	839	2 954	197	60	257	191	37	228	836	168	1 004	212	746	958	3 930	2 092	6 022	6 022
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	10	5	8	13	13
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.7	48.2	47.1	40.9	36.7	39.9	34.0	32.7	33.8	22.2	21.5	22.1	48.1	46.2	46.6	39.5	43.6	40.9	
écart-type	13.4	12.8	13.2	9.7	10.6	10.1	9.3	10.0	9.4	8.3	7.4	8.1	16.2	14.2	14.7	15.9	15.3	15.8	
1er quartile	36.4	39.0	36.9	33.9	27.3	32.4	27.0	25.0	26.8	17.1	16.8	17.1	37.1	36.2	36.2	25.6	31.7	27.7	
valeur médiane	47.3	49.1	48.0	40.8	34.8	40.1	33.2	31.5	33.1	18.4	18.2	18.4	50.3	46.9	47.6	39.2	45.1	41.0	
3e quartile	56.4	57.7	56.7	46.9	47.2	47.0	40.1	39.8	40.1	24.2	23.9	24.2	57.5	55.0	55.8	51.9	54.7	52.9	
N**	2 115	839	2 954	197	60	257	191	37	228	836	168	1 004	212	746	958	3 930	2 092	6 022	
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	10	5	8	13	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Etat civil*																			
célibataire	42.6	34.2	40.3	61.3	78.3	65.0	64.5	64.7	64.5	94.0	91.7	93.6	23.1	24.0	23.8	56.7	41.7	51.9	1 854
marié-e	31.8	32.1	31.8	18.8	13.0	17.5	20.4	5.9	18.2	4.7	4.6	4.7	52.6	53.0	52.9	25.3	33.4	27.9	997
séparé-e	4.2	3.8	4.1	3.8	0.0	2.9	2.2	0.0	1.8	0.0	0.9	0.2	7.7	7.0	7.2	3.1	4.0	3.4	122
divorcé-e	20.0	24.8	21.3	16.3	8.7	14.6	12.9	29.4	15.5	1.3	2.8	1.6	14.1	14.4	14.3	13.9	17.8	15.1	541
veuf/veuve	1.2	5.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	1.8	0.8	3.0	1.5	54
partenariat enregistré	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	7
N**	1 392	524	1 916	80	23	103	93	17	110	536	108	644	78	313	391	2 426	1 149	3 575	3 575
<i>données manquantes</i>	724	315	1 039	117	37	154	98	20	118	301	60	361	137	440	577	1 509	951	2 460	2 460
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	12.0	13.2	12.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	12.8	16.5	15.7	7.8	10.9	8.8	367
périphérie des grands centres	15.8	15.5	15.7	4.3	3.7	4.1	17.6	19.0	17.8	10.1	9.2	10.0	4.3	3.8	3.9	13.0	9.8	11.9	497
villes de moyenne importance	14.4	16.6	15.0	7.4	22.2	10.7	12.0	14.3	12.4	20.2	23.1	20.7	12.8	17.6	16.6	15.8	18.3	16.6	691
petites villes	29.3	29.7	29.4	55.3	51.9	54.5	47.2	33.3	45.0	36.2	36.9	36.3	37.2	34.1	34.7	34.0	33.9	33.9	1 412
campagne	28.5	24.9	27.5	33.0	22.2	30.6	22.2	33.3	24.0	32.5	30.8	32.2	33.0	28.1	29.1	29.5	27.1	28.7	1 194
N**	1 637	619	2 256	94	27	121	108	21	129	603	130	733	94	370	464	2 809	1 352	4 161	4 161
<i>données manquantes</i>	479	220	699	103	33	136	83	16	99	234	38	272	121	383	504	1 126	748	1 874	1 874

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.6	36.4	38.6	42.2	35.0	40.5	31.8	48.0	34.4	14.1	15.0	14.2	13.5	11.7	12.0	30.5	27.9	29.6	1 193
avec famille d'origine	6.7	3.3	5.7	11.7	20.0	13.7	18.9	8.0	17.2	64.8	52.0	62.7	13.5	9.0	9.9	24.6	12.4	20.7	832
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	47.3	54.0	49.3	32.8	35.0	33.3	37.9	24.0	35.7	9.1	13.4	9.8	67.6	77.7	75.7	36.1	51.9	41.2	1 660
avec des amis ou d'autres personnes	2.2	1.8	2.1	3.1	2.5	3.0	3.0	8.0	3.8	3.3	3.1	3.3	0.0	1.0	0.8	2.6	2.2	2.5	100
en prison	0.2	0.2	0.2	2.3	0.0	1.8	1.5	4.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
institution/foyer	2.0	0.5	1.5	3.9	5.0	4.2	3.0	8.0	3.8	3.7	2.4	3.5	0.0	0.3	0.3	2.5	1.2	2.1	84
hôpital/clinique	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	13
autre	2.0	3.2	2.3	3.9	2.5	3.6	3.0	0.0	2.5	4.3	13.4	5.8	5.4	0.3	1.3	3.1	3.8	3.3	134
N**	1 426	602	2 028	128	40	168	132	25	157	667	127	794	74	300	374	2 725	1 302	4 027	4 027
données manquantes	690	237	927	69	20	89	59	12	71	170	41	211	141	453	594	1 210	798	2 008	2 008
Situation de domicile*																			
logement stable	95.1	94.9	95.1	87.2	90.0	87.9	91.1	93.3	91.5	91.4	88.9	91.0	95.5	96.5	96.3	93.6	94.8	94.0	4 151
logement instable/SDF	2.9	3.4	3.1	6.8	10.0	7.5	4.1	0.0	3.4	3.4	3.0	3.3	4.5	3.2	3.4	3.3	3.0	3.2	143
en prison	0.2	0.1	0.2	1.5	0.0	1.2	1.4	3.3	1.7	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	12
institution/foyer/hôpital/autre	1.8	1.5	1.7	4.5	0.0	3.5	3.4	3.3	3.4	5.0	8.1	5.5	0.0	0.3	0.2	2.7	2.0	2.5	110
N**	1 599	667	2 266	133	40	173	146	30	176	706	135	841	89	347	436	2 987	1 429	4 416	4 416
données manquantes	517	172	689	64	20	84	45	7	52	131	33	164	126	406	532	948	671	1 619	1 619
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	38.4	41.0	39.2	54.4	30.0	48.9	44.7	33.3	43.2	65.8	47.1	62.7	19.4	23.3	22.5	44.8	36.0	41.9	1 159
relations temporaires	3.2	3.9	3.4	5.9	0.0	4.5	7.9	0.0	6.8	4.0	10.0	5.0	1.6	1.2	1.3	3.5	3.0	3.3	92
partenaire fixe, vivant séparé	8.4	9.1	8.6	0.0	25.0	5.7	10.5	33.3	13.6	18.1	27.1	19.6	8.1	10.9	10.3	10.1	12.0	10.8	298
partenaire fixe, ménage commun	49.9	46.0	48.7	39.7	45.0	40.9	36.8	33.3	36.4	12.1	15.7	12.7	71.0	64.7	65.9	41.6	48.9	44.0	1 219
N**	1 077	441	1 518	68	20	88	76	12	88	348	70	418	62	258	320	1 844	924	2 768	2 768
données manquantes	1 039	398	1 437	129	40	169	115	25	140	489	98	587	153	495	648	2 091	1 176	3 267	3 267

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale*																			
salaire	58.0	43.5	53.9	43.2	30.4	40.2	66.0	63.2	65.5	28.8	22.8	27.7	72.2	63.9	65.6	51.2	47.5	50.0	1 749
économies, épargne	1.5	1.3	1.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5	1.3	1.7	1.6	1.1	1.2	1.2	41
rente (AVS, AI ou autre)	18.2	22.5	19.4	12.2	17.4	13.4	9.6	10.5	9.7	4.1	4.4	4.2	13.9	12.0	12.4	13.4	17.6	14.8	517
aide sociale	12.4	13.2	12.6	28.4	39.1	30.9	7.4	10.5	8.0	9.2	15.8	10.3	0.0	1.3	1.1	11.1	9.5	10.5	369
assurance-chômage	5.0	5.0	5.0	6.8	8.7	7.2	8.5	0.0	7.1	1.7	1.8	1.7	0.0	1.0	0.8	4.0	3.0	3.7	129
soutien du/de la partenaire	1.7	9.5	3.9	2.7	4.3	3.1	2.1	0.0	1.8	1.3	0.9	1.2	5.1	14.4	12.4	1.7	9.2	4.2	146
soutien parents/proches/amis	2.1	2.5	2.2	1.4	0.0	1.0	6.4	15.8	8.0	53.5	53.5	53.5	7.6	5.7	6.1	16.2	10.7	14.4	504
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
assurance indemnités journalières	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	9
autre	0.8	1.9	1.1	2.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	32
N**	1 327	524	1 851	74	23	97	94	19	113	535	114	649	79	299	378	2 359	1 140	3 499	3 499
données manquantes	789	315	1 104	123	37	160	97	18	115	302	54	356	136	454	590	1 576	960	2 536	2 536
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	56.4	31.7	49.7	41.5	21.7	36.4	63.8	46.7	61.1	20.0	10.2	18.4	70.4	40.6	46.6	47.0	32.9	42.5	1 304
activité à temps partiel	4.5	19.9	8.7	3.1	13.0	5.7	3.8	6.7	4.2	1.8	8.2	2.9	4.2	35.3	29.1	3.9	22.6	9.9	304
jobs occasionnels	1.6	1.7	1.6	3.1	4.3	3.4	1.3	6.7	2.1	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	1.4	42.0
en formation	2.4	3.3	2.7	1.5	0.0	1.1	7.5	13.3	8.4	58.8	60.2	59.0	8.5	8.1	8.2	18.3	13.1	16.6	510
sans travail, en quête d'emploi	8.1	7.8	8.0	10.8	17.4	12.5	11.3	0.0	9.5	5.7	7.1	6.0	1.4	1.8	1.7	7.2	5.1	6.5	199
sans travail, sans recherche d'emploi	4.5	6.1	5.0	13.8	17.4	14.8	7.5	6.7	7.4	1.8	2.0	1.9	0.0	0.7	0.6	4.0	3.9	3.9	121
rentier/rentière	10.1	12.8	10.8	1.5	0.0	1.1	2.5	0.0	2.1	0.2	0.0	0.2	7.0	9.9	9.3	6.5	9.3	7.4	227
incapacité de travail	5.6	6.1	5.7	16.9	8.7	14.8	2.5	13.3	4.2	4.3	2.0	3.9	1.4	0.7	0.8	5.2	4.7	5.0	154
femme/homme au foyer	0.3	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	2.8	2.1	2.3	0.2	2.1	0.8	26.0
autre	6.5	7.3	6.7	7.7	17.4	10.2	0.0	6.7	1.1	5.9	9.2	6.5	4.2	0.7	1.4	6.2	5.3	5.9	181
N**	1 149	423	1 572	65	23	88	80	15	95	490	98	588	71	283	354	2 083	985	3 068	3 068
données manquantes	967	416	1 383	132	37	169	111	22	133	347	70	417	144	470	614	1 852	1 115	2 967	2 967

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	22.0	41.0	26.9	39.5	64.3	45.6	24.6	30.0	25.4	16.5	22.6	17.4	0.0	17.6	16.7	21.8	36.3	25.5	352
apprenti-e, stagiaire	1.2	1.3	1.2	0.0	7.1	1.8	4.9	10.0	5.6	32.4	25.8	31.5	0.0	0.0	0.0	7.8	4.0	6.9	95
manœuvre, aide	3.3	3.1	3.3	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	3.2	2.3	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	38
ouvrier/ère formé-e sur le tas	8.2	6.6	7.8	9.3	0.0	7.0	8.2	0.0	7.0	3.8	0.0	3.3	50.0	0.0	2.8	7.3	4.6	6.7	92
ouvrier/ère formé-e (CFC)	13.4	5.3	11.3	25.6	14.3	22.8	21.3	0.0	18.3	9.9	3.2	8.9	0.0	0.0	0.0	13.2	4.6	11.1	153
contremaître-sse	2.6	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	1.6	3.2	1.9	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	2.0	28
employé-e non qualifié-e	20.2	20.7	20.3	11.6	7.1	10.5	19.7	10.0	18.3	5.5	0.0	4.7	50.0	35.3	36.1	16.2	18.4	16.8	232
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.7	12.3	13.3	2.3	7.1	3.5	9.8	40.0	14.1	5.5	6.5	5.6	0.0	23.5	22.2	11.8	14.7	12.5	173
employé-e, cadre supérieur	4.1	0.4	3.2	2.3	0.0	1.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.8	3.0	0.9	2.5	34
indépendant-e	8.8	7.5	8.5	4.7	0.0	3.5	3.3	0.0	2.8	2.2	3.2	2.3	0.0	5.9	5.6	6.5	6.6	6.5	90
écolier/ère, étudiant-e	1.1	0.9	1.0	2.3	0.0	1.8	1.6	0.0	1.4	19.2	29.0	20.7	0.0	14.7	13.9	5.6	5.5	5.6	77
autre statut	1.5	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	10.0	2.8	1.1	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.4	19
N**	659	227	886	43	14	57	61	10	71	182	31	213	2	34	36	1 036	347	1 383	1 383
données manquantes	1 457	612	2 069	154	46	200	130	27	157	655	137	792	213	719	932	2 899	1 753	4 652	4 652

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	53.1	50.2	52.3	27.9	30.0	28.4	36.8	36.1	36.7	66.0	64.9	65.8	62.8	65.4	64.8	55.0	57.3	55.8	3 359
fin régulière avec transfert	6.2	8.0	6.7	10.7	10.0	10.5	4.7	2.8	4.4	3.6	4.2	3.7	4.7	2.1	2.7	5.5	5.6	5.5	331
changement de domicile	2.1	2.6	2.2	8.1	10.0	8.6	5.3	5.6	5.3	1.8	2.4	1.9	0.5	0.7	0.6	2.3	2.0	2.2	133
hospitalisation	0.6	1.3	0.8	0.5	1.7	0.8	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.6	0.7	0.6	36
détention	0.1	0.1	0.1	1.5	0.0	1.2	1.1	2.8	1.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	13
perte de contact	24.5	23.2	24.1	32.0	31.7	31.9	35.8	41.7	36.7	20.8	19.6	20.6	24.2	21.8	22.4	24.7	22.4	23.9	1 437
rupture explicite	9.7	10.9	10.1	12.7	11.7	12.5	12.6	5.6	11.5	5.9	6.0	5.9	4.7	7.9	7.1	8.6	9.1	8.8	528
décès	1.8	1.7	1.7	5.1	3.3	4.7	0.5	5.6	1.3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	1.3	0.9	1.2	70
autre raison	1.9	2.0	1.9	1.5	1.7	1.6	2.6	0.0	2.2	1.1	3.0	1.4	2.8	2.0	2.2	1.8	2.0	1.8	110
N**	2 108	837	2 945	197	60	257	190	36	226	836	168	1 004	215	751	966	3 922	2 095	6 017	6 017
données manquantes	8	2	10	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	2	13	5	18	18

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

Destination des transferts***																N			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
traitement résidentiel	33.3	25.0	30.4	25.0	0.0	19.0	57.1	0.0	57.1	25.0	50.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.1	23.7	27.9	61
structure/clinique de jour	2.3	0.0	1.5	0.0	20.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.4	3
prise en charge ambulatoire	50.6	50.0	50.4	62.5	80.0	66.7	28.6	0.0	28.6	50.0	33.3	46.2	50.0	55.6	53.3	51.7	52.6	52.1	114
appartement protégé	2.3	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	1.8	4
autre institution spécialisée	11.5	22.9	15.6	12.5	0.0	9.5	14.3	0.0	14.3	20.0	16.7	19.2	50.0	44.4	46.7	14.7	21.1	16.9	37
N**	87	48	135	16	5	21	7	0	7	20	6	26	6	9	15	143	76	219	219
données manquantes	44	19	63	5	1	6	2	1	3	10	1	11	4	7	11	71	41	112	112

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

Cause de décès****																N			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
suicide	3.8	12.5	5.9	16.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.0	6.8	3
accident	3.8	12.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.5	2
maladie	73.1	50.0	67.6	50.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	67.6	40.0	61.4	27
surdose ou intoxication aiguë	19.2	12.5	17.6	33.3	0.0	28.6	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	20.0	22.7	10
autre cause de décès	0.0	12.5	2.9	0.0	100.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.5	2
N**	26	8	34	6	1	7	1	1	2	0	0	0	1	0	1	34	10	44	44
données manquantes	11	6	17	4	1	5	0	1	1	1	0	1	0	0	0	17	9	26	26

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	6.4	5.6	6.2	3.6	3.3	3.5	3.7	0.0	3.1	2.6	4.2	2.9	12.1	9.3	9.9	5.3	6.5	5.8	345
> 1 semaine à 1 mois	3.9	3.5	3.8	2.0	0.0	1.6	4.7	0.0	4.0	10.8	11.9	10.9	7.4	4.1	4.9	5.5	4.4	5.1	307
> 1 à 2 mois	4.4	4.4	4.4	3.0	3.3	3.1	5.3	0.0	4.4	10.9	8.9	10.5	3.3	4.5	4.2	6.0	4.7	5.6	333
>2 à 3 mois	4.2	3.8	4.1	3.6	5.0	3.9	4.2	5.4	4.4	5.7	10.1	6.5	4.2	4.7	4.6	4.6	5.0	4.7	282
>3 à 6 mois	11.6	11.2	11.5	9.1	6.7	8.6	14.7	27.0	16.7	18.3	14.9	17.7	19.1	15.7	16.4	13.9	13.6	13.8	826
>6 mois à 1 an	24.9	27.4	25.6	20.8	18.3	20.2	31.1	32.4	31.3	33.3	29.8	32.7	31.2	33.2	32.8	27.9	30.0	28.6	1 712
>1 à 2 ans	20.9	21.8	21.1	18.8	20.0	19.1	20.5	27.0	21.6	13.1	14.3	13.3	15.3	17.7	17.2	18.6	19.5	18.9	1 132
>2 à 3 ans	9.1	6.2	8.3	9.6	11.7	10.1	6.3	5.4	6.2	3.1	4.2	3.3	4.2	3.9	3.9	7.1	5.3	6.4	386
>3 à 5 ans	8.4	9.6	8.7	11.2	15.0	12.1	6.8	0.0	5.7	1.7	1.2	1.6	2.8	3.6	3.4	6.3	6.6	6.4	384
>5 à 10 ans	5.2	5.4	5.3	13.2	15.0	13.6	2.6	2.7	2.6	0.4	0.6	0.4	0.5	3.2	2.6	3.9	3.9	3.9	234
plus de 10 ans	1.0	1.1	1.0	5.1	1.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	44
N**	2 077	836	2 913	197	60	257	190	37	227	837	168	1 005	215	752	967	3 893	2 092	5 985	5 985
<i>données manquantes</i>	39	3	42	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	42	8	50	50
Durée (en semaines)																			
moyenne	80.9	80.0	80.7	144.2	135.1	142.0	60.1	53.2	59.0	34.9	35.8	35.1	38.3	53.3	49.9	68.4	65.0	67.2	
écart-type	108.7	103.5	107.2	181.6	140.9	172.8	70.0	53.7	67.6	47.0	42.1	46.2	44.8	75.6	70.2	100.1	88.4	96.2	
1er quartile	18.0	19.4	18.9	29.4	33.6	30.1	16.9	20.0	18.0	8.1	8.5	8.1	11.0	13.9	13.0	14.9	15.9	15.1	
valeur médiane	45.0	46.0	45.1	65.6	84.8	67.3	35.4	36.7	35.6	25.6	24.2	25.3	28.3	31.6	30.7	36.3	36.0	36.3	
3e quartile	98.7	91.6	96.6	193.0	183.9	190.4	78.1	64.6	77.7	43.8	44.7	44.1	46.0	57.4	56.1	76.9	73.1	75.1	
N**	2 077	836	2 913	197	60	257	190	37	227	837	168	1 005	215	752	967	3 893	2 092	5 985	
<i>données manquantes</i>	39	3	42	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	42	8	50	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	99.1	99.3	99.1	75.3	72.0	74.5	93.7	89.5	93.0	99.8	100.0	99.9	98.2	98.5	98.3	3 213
oui	0.9	0.7	0.9	24.7	28.0	25.5	6.3	10.5	7.0	0.2	0.0	0.1	1.8	1.5	1.7	55
N**	1 397	560	1 957	81	25	106	95	19	114	552	115	667	2 379	889	3 268	3 268
données manquantes	719	279	998	116	35	151	96	18	114	285	53	338	1 341	458	1 799	1 799
Type de substitution***																
héroïne	0.0	25.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.0	1
méthadone	92.3	75.0	88.2	88.2	100.0	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	92.1	92.3	92.2	47
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	1
autres substances	7.7	0.0	5.9	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.9	2
N**	13	4	17	17	7	24	5	2	7	1	0	1	38	13	51	51
données manquantes	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4	4
Substitution après la prise en charge*																
non	99.4	99.6	99.5	78.1	77.3	77.9	96.3	92.9	95.7	99.8	100.0	99.8	98.7	99.0	98.8	2 905
oui	0.6	0.4	0.5	21.9	22.7	22.1	3.8	7.1	4.3	0.2	0.0	0.2	1.3	1.0	1.2	36
N**	1 249	505	1 754	73	22	95	80	14	94	496	101	597	2 135	806	2 941	2 941
données manquantes	867	334	1 201	124	38	162	111	23	134	341	67	408	1 585	541	2 126	2 126
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	14.3	0.0	11.1	6.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	10.7	0.0	8.3	3
traitement de substitution	85.7	100.0	88.9	93.8	100.0	95.2	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	89.3	100.0	91.7	33
N**	7	2	9	16	5	21	3	1	4	1	0	1	28	8	36	36
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	93.3	83.2	90.8	90.6	80.0	88.6	92.5	91.7	92.4	94.4	97.3	94.8	93.3	85.6	91.5	1 570
oui	6.7	16.8	9.2	9.4	20.0	11.4	7.5	8.3	7.6	5.6	2.7	5.2	6.7	14.4	8.5	145
N**	879	291	1 170	64	15	79	67	12	79	215	37	252	1 319	396	1 715	1 715
<i>données manquantes</i>	1 237	548	1 785	133	45	178	124	25	149	622	131	753	2 401	951	3 352	3 352
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	1.3	0.0	0.8	1
service de postcure de l'institution	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.8	1
appartement protégé extérieur	3.9	4.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.9	3.1	4
service de postcure extérieur	19.6	13.3	16.7	20.0	0.0	14.3	25.0	0.0	20.0	20.0	0.0	18.2	19.7	11.8	16.5	21
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	27.5	15.6	21.9	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	23.7	15.7	20.5	26
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	2.0	4.4	3.1	40.0	0.0	28.6	75.0	0.0	60.0	20.0	100.0	27.3	10.5	5.9	8.7	11
autre centre de consultation	7.8	17.8	12.5	20.0	0.0	14.3	25.0	0.0	20.0	10.0	0.0	9.1	9.2	15.7	11.8	15
groupe d'entraide	11.8	8.9	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	9.1	11.8	7.8	10.2	13
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.8	1
autre	31.4	42.2	36.5	20.0	100.0	42.9	0.0	100.0	20.0	20.0	0.0	18.2	26.3	45.1	33.9	43
N**	51	45	96	5	2	7	4	1	5	10	1	11	76	51	127	127
<i>données manquantes</i>	8	4	12	1	1	2	1	0	1	2	0	2	12	6	18	18

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2016)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
alcool	74.0	74.7	74.2	22.2	17.1	21.0	20.0	4.3	17.7	9.4	12.4	9.9	46.2	50.1	47.3	1 750
héroïne	0.6	0.5	0.6	62.2	48.8	59.1	3.0	13.0	4.4	0.3	0.0	0.3	3.8	2.6	3.5	129
méthadone	0.1	0.0	0.0	9.6	7.3	9.1	0.7	4.3	1.3	0.2	0.0	0.1	0.6	0.4	0.6	21
buprénorphine	0.1	0.0	0.0	3.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.1	0.5	0.2	3.0	7.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	13
cocaïne en poudre	2.1	1.4	1.9	16.3	7.3	14.2	68.1	65.2	67.7	2.1	3.1	2.3	6.2	3.1	5.3	197
crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
amphétamines	0.8	0.3	0.6	1.5	0.0	1.1	2.2	0.0	1.9	1.2	0.8	1.1	1.2	0.7	1.1	40
méthamphétamines	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.7	4.3	1.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	6
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.3	0.2	0.2	2.2	0.0	1.7	2.2	0.0	1.9	1.4	1.6	1.4	0.9	0.6	0.8	30
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	3
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
barbituriques	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2
benzodiazépines	0.5	1.4	0.8	10.4	0.0	8.0	2.2	4.3	2.5	0.5	0.0	0.4	1.3	2.3	1.6	59
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
LSD	0.2	0.0	0.1	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	12
kétamine	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	4.7	3.3	4.3	14.8	14.6	14.8	12.6	13.0	12.7	65.9	62.0	65.3	21.3	11.4	18.6	687
tabac	10.2	9.7	10.1	8.9	7.3	8.5	8.1	4.3	7.6	12.8	19.4	13.9	11.7	12.6	12.0	443
autre substance	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	8
jeu pathologique	0.2	0.0	0.1	0.0	2.4	0.6	0.7	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	2.0	1.1	1.8	65
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	1.8	0.4	1.4	52
troubles alimentaires	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.2	1.8	65
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	44
aucun	23.5	22.7	23.3	16.3	12.2	15.3	23.0	17.4	22.2	28.8	31.0	29.1	24.8	23.6	24.4	904
N**	1 459	629	2 088	135	41	176	135	23	158	657	129	786	2 678	1 022	3 700	3 700
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence des rechutes*																
aucune	60.2	48.4	57.2	50.0	50.0	50.0	50.0	42.9	49.1	75.2	56.3	73.0	61.4	48.5	58.5	612
une fois	7.8	11.0	8.6	5.6	0.0	4.5	12.5	0.0	10.9	7.2	0.0	6.4	7.9	10.2	8.4	88
deux fois	8.3	8.2	8.3	11.1	25.0	13.6	6.3	0.0	5.5	4.0	12.5	5.0	7.9	8.9	8.1	85
trois ou quatre fois	7.0	13.7	8.7	8.3	0.0	6.8	16.7	0.0	14.5	2.4	12.5	3.5	6.9	12.3	8.1	85
cinq fois ou plus	16.7	18.7	17.2	25.0	25.0	25.0	14.6	57.1	20.0	11.2	18.8	12.1	15.9	20.0	16.8	176
N**	540	182	722	36	8	44	48	7	55	125	16	141	811	235	1 046	1 046
<i>données manquantes</i>	1 576	657	2 233	161	52	213	143	30	173	712	152	864	2 909	1 112	4 021	4 021
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	99.0	98.9	99.0	13.3	0.0	11.1	26.3	0.0	22.7	19.2	16.7	18.8	78.3	86.0	80.4	308
opioïdes	1.5	2.3	1.7	86.7	100.0	88.9	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	6.5	4.7	6.0	23
cocaïne et dérivés	5.5	3.4	4.9	13.3	33.3	16.7	78.9	100.0	81.8	7.7	16.7	9.4	11.2	7.5	10.2	39
autres stimulants	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	3.8	0.0	3.1	2.5	0.9	2.1	8
somnifères/tranquillisants	1.0	3.4	1.7	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	2.6	10
hallucinogènes	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	2
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1
cannabis	10.0	2.3	7.7	20.0	0.0	16.7	15.8	0.0	13.6	96.2	83.3	93.8	19.6	6.5	15.9	61
tabac	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	3
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9	1.3	5
troubles alimentaires	0.0	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.8	3
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	200	87	287	15	3	18	19	3	22	26	6	32	276	107	383	383
<i>données manquantes</i>	15	7	22	3	1	4	5	1	6	5	1	6	37	14	51	51

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	37.8	41.7	38.8	17.2	10.0	15.4	20.0	16.7	19.5	15.7	9.5	14.8	32.2	38.1	33.6	317
1 jour par semaine ou moins	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.5	1.0	0.0	0.7	7
2 à 3 jours par semaine	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	0.8	4.8	1.4	0.7	1.3	0.8	8
4 à 6 jours par semaine	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.7	0.4	0.6	6
une fois par jour	4.9	2.5	4.3	6.9	10.0	7.7	11.4	16.7	12.2	9.1	0.0	7.7	6.0	4.0	5.5	52
plusieurs fois par jour	55.8	54.0	55.3	75.9	80.0	76.9	65.7	66.7	65.9	69.4	85.7	71.8	59.5	56.2	58.7	554
N**	468	163	631	29	10	39	35	6	41	121	21	142	718	226	944	944
<i>données manquantes</i>	1 648	676	2 324	168	50	218	156	31	187	716	147	863	3 002	1 121	4 123	4 123
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	17.5	16.5	17.2	5.0	0.0	3.4	28.0	40.0	30.0	33.0	26.7	32.0	22.0	17.6	21.0	114
11 à 20 cigarettes par jour	45.2	50.6	46.5	50.0	55.6	51.7	56.0	40.0	53.3	54.5	53.3	54.4	47.0	49.6	47.6	258
21 à 30 cigarettes par jour	21.8	22.8	22.1	45.0	44.4	44.8	12.0	20.0	13.3	9.1	13.3	9.7	20.1	24.4	21.0	114
31 cigarettes par jour ou plus	15.5	10.1	14.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	3.4	6.7	3.9	10.9	8.4	10.3	56
N**	252	79	331	20	9	29	25	5	30	88	15	103	423	119	542	542
<i>données manquantes</i>	39	16	55	4	0	4	3	0	3	14	4	18	64	21	85	85

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2016)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	27.1	42.4	31.0	82.9	83.3	82.9	64.7	100.0	68.4	46.6	52.4	47.3	35.2	45.0	37.4	434
abstinence limitée dans le temps	17.1	14.1	16.4	2.9	0.0	2.4	2.0	0.0	1.8	6.2	0.0	5.4	13.3	11.1	12.8	148
consommation contrôlée	39.1	32.2	37.3	11.4	0.0	9.8	17.6	0.0	15.8	29.5	28.6	29.3	35.3	31.7	34.5	400
aucune limitation envisagée	4.7	1.5	3.8	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.3	7.5	14.3	8.4	5.1	2.3	4.5	52
pas déterminé pour l'instant	11.6	8.8	10.9	2.9	16.7	4.9	9.8	0.0	8.8	10.3	4.8	9.6	10.5	8.4	10.0	116
autre	0.3	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	9
N**	601	205	806	35	6	41	51	6	57	146	21	167	897	262	1 159	1 159
<i>données manquantes</i>	<i>1 515</i>	<i>634</i>	<i>2 149</i>	<i>162</i>	<i>54</i>	<i>216</i>	<i>140</i>	<i>31</i>	<i>171</i>	<i>691</i>	<i>147</i>	<i>838</i>	<i>2 823</i>	<i>1 085</i>	<i>3 908</i>	<i>3 908</i>
Pronostic*																
très bon pronostic	17.1	15.5	16.7	14.3	16.7	14.9	14.3	14.3	14.3	26.2	31.8	26.9	18.8	17.1	18.4	218
bon pronostic	48.3	48.8	48.4	48.6	25.0	42.6	51.0	71.4	53.6	51.0	45.5	50.3	49.4	48.0	49.1	581
plutôt mauvais pronostic	22.8	27.1	23.8	25.7	50.0	31.9	26.5	14.3	25.0	21.4	22.7	21.6	22.5	27.5	23.6	280
mauvais pronostic	11.8	8.7	11.0	11.4	8.3	10.6	8.2	0.0	7.1	1.4	0.0	1.2	9.3	7.4	8.9	105
N**	619	207	826	35	12	47	49	7	56	145	22	167	915	269	1 184	1 184
<i>données manquantes</i>	<i>1 497</i>	<i>632</i>	<i>2 129</i>	<i>162</i>	<i>48</i>	<i>210</i>	<i>142</i>	<i>30</i>	<i>172</i>	<i>692</i>	<i>146</i>	<i>838</i>	<i>2 805</i>	<i>1 078</i>	<i>3 883</i>	<i>3 883</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2016)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opioides			Cocaine et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																
hommes			64.9			77.6			79.0			81.5			71.0	1489
femmes			35.1			22.4			21.0			18.5			29.0	608
sexe pas connu	707	383	1 090	83	24	107	139	37	176	308	70	378	1 489	608	2 097	
N**			2			1			0			0			9	
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.1	0.3	0.2	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.6	0.2	0.5	10
15-19	1.0	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	11.4	3.4	34.2	47.8	36.7	8.8	9.7	9.0	188
20-24	2.6	2.6	2.7	7.2	0.0	5.6	14.4	11.4	13.8	22.5	15.9	21.3	10.2	6.0	9.1	189
25-29	7.6	7.3	7.5	9.6	8.3	9.3	15.1	25.7	17.2	16.0	7.2	14.4	11.4	8.8	10.6	221
30-34	12.3	7.3	10.5	19.3	8.3	16.7	22.3	20.0	21.8	9.1	11.6	9.6	14.0	9.8	12.8	267
35-39	13.4	11.8	12.9	18.1	25.0	19.4	21.6	8.6	19.0	9.4	7.2	9.0	13.7	11.3	13.0	271
40-44	11.4	13.6	12.2	19.3	12.5	18.5	12.2	8.6	11.5	3.3	2.9	3.2	10.0	11.8	10.5	219
45-49	14.7	15.0	14.8	12.0	16.7	13.0	7.2	14.3	8.6	2.0	4.3	2.4	10.0	12.7	10.7	224
50-54	13.9	16.3	14.7	9.6	16.7	11.1	2.9	0.0	2.3	1.6	1.4	1.6	8.7	12.2	9.7	202
55-59	9.7	11.5	10.3	2.4	12.5	4.6	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	5.6	8.2	6.3	132
60-64	6.3	6.0	6.2	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.3	4.3	3.5	74
65-69	3.4	3.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	2.1	43
70-74	2.6	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	1.3	28
75 et plus	1.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0.3	1.4	0.5	0.7	0.8	0.8	17
N**	700	381	1 083	83	24	108	139	35	174	307	69	376	1 476	600	2 085	
données manquantes	7	2	9	0	0	0	0	2	2	1	1	2	13	8	21	
Age (valeurs centrales)																
moyenne	45.5	46.2	45.7	38.7	43.0	39.7	35.6	32.3	35.0	25.7	25.8	25.7	38.3	41.4	39.2	
écart-type	12.9	12.5	12.8	9.5	9.4	9.6	12.9	9.9	12.4	10.2	14.7	11.1	14.3	14.7	14.5	
1er quartile	35.4	37.9	36.3	32.6	35.6	33.5	28.2	25.6	27.9	18.3	17.1	18.0	27.2	30.3	27.9	
valeur médiane	45.5	47.2	46.0	39.0	42.3	39.8	33.6	30.5	32.9	23.5	20.5	22.5	36.7	41.8	38.0	
3e quartile	54.3	54.3	54.3	45.5	50.4	46.8	40.03	39.6	40.0	31.4	31.2	31.3	48.0	51.6	49.3	
N**	700	381	1 083	83	24	108	139	35	174	307	69	376	1 476	600	2 085	
données manquantes	7	2	9	0	0	0	0	2	2	1	1	2	13	8	21	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

A2 Données de base d'institutions non participantes: problème principal à l'admission (2016)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Problème principal*				
alcool	48.5	65.0	53.2	1 092
opioïdes	5.7	4.1	5.3	108
cocaïne	9.5	6.3	8.6	176
autres stimulants	2.0	1.9	2.0	40
hypnotiques/sedatives	0.5	1.4	0.7	15
hallucinogènes	0.0	0.2	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	21.1	11.9	18.4	378
tabac	0.6	0.5	0.6	12
autre substance	1.3	2.4	1.6	33
consommation multiple**	6.3	3.6	5.5	113
non lié à une substance	4.5	2.9	4.0	83
N***	1 459	589	2 051	2 051
<i>données manquantes</i>	30	19	55	55

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu