

act-info - SAMBAD
Prise en charge ambulatoire
des problèmes de dépendance
Résultats du monitoring de la clientèle 2018



Etienne Maffli

Lausanne, décembre 2019

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Diane Jaccard pour la conception graphique de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail cgmail@addictionsuisse.ch

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2019

Citation recommandée: Maffli, E. (2019). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats du monitoring de la clientèle 2018. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	6
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2018)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2018)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2018)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2018)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2018)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2018)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2018)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2018)

TRENDS

- G1 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2018
- G2 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2018
- G3 Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2018
- G4 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2018
- G5 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2018
- G6 Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2018
- G7 Problème principal à l'admission jeu pathologique: évolution 2013-2018

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés dans l'ensemble des domaines de traitement est effectuée dès 2018 par Addiction Suisse.

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits en 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. Toutes les institutions n'ont cependant pas pu implémenter les questionnaires révisés. En outre, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire de façon à répondre aux différents besoins. Ces particularités expliquent en partie pourquoi il y a un nombre relativement élevé de valeurs manquantes pour certaines questions.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2018, 67 institutions du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs. Les Institutions qui ne participent pas au monitoring act-info ont été interrogées dans le cadre d'une vaste enquête ayant pour objectif une estimation de l'ensemble de la demande en matière de trai-

tement. Les résultats de cette enquête figurent dans le rapport global act-info (rapport annuel 2018) publié également à fin 2019.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-*info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects sociodémographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Celui-ci est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au-dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

La dernière partie présente les tendances 2013-2018 sous forme de graphiques. Il s'agit notamment des aspects de la demande de traitement, de la répartition par sexe et de la distribution selon l'âge pour les problèmes principaux les plus fréquents (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotique/sédatifs et jeu pathologique).

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			70.0			72.2			79.9			82.6			22.1			64.7	3 961
femmes			30.0			27.8			20.1			17.4			77.9			35.3	2 160
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1 915	822	2 737	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	217	764	981	3 961	2 160	6 121	6 121
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	4.9	6.2	5.2	0.9	1.2	1.1	1.9	1.3	1.7	105
15-19	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	2.8	13.8	5.0	58.7	62.4	59.3	2.8	2.5	2.6	16.2	9.2	13.7	838
20-24	3.9	3.9	3.9	4.7	1.8	3.9	14.5	23.8	16.3	12.4	10.7	12.1	2.4	4.6	4.1	7.5	6.1	7.0	428
25-29	8.1	6.7	7.7	6.8	15.8	9.3	19.5	18.8	19.3	8.4	10.1	8.7	2.8	6.7	5.9	9.5	8.4	9.1	556
30-34	9.3	7.4	8.7	14.9	22.8	17.1	20.4	22.5	20.9	6.6	2.8	5.9	5.2	7.5	7.0	9.9	8.4	9.4	573
35-39	11.5	13.0	12.0	16.9	8.8	14.6	16.0	2.5	13.3	3.3	2.8	3.2	6.1	9.4	8.7	9.9	9.9	9.9	605
40-44	11.2	10.5	11.0	18.9	17.5	18.5	10.4	8.8	10.1	2.7	2.2	2.6	9.4	13.3	12.5	8.9	10.4	9.4	576
45-49	13.9	13.1	13.7	16.9	10.5	15.1	7.5	5.0	7.0	1.3	2.2	1.5	17.5	17.5	17.5	10.0	12.7	11.0	671
50-54	14.4	14.1	14.3	12.8	15.8	13.7	6.0	3.8	5.5	1.6	0.6	1.5	16.0	15.8	15.9	9.9	12.9	10.9	667
55-59	11.2	12.2	11.5	4.1	1.8	3.4	1.9	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	15.1	9.1	10.4	7.0	8.6	7.6	463
60-64	7.9	8.6	8.1	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	6.6	5.7	5.9	4.6	5.9	5.1	311
65-69	3.6	4.9	4.0	0.0	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	3.3	2.2	3.1	2.5	153
70-74	2.2	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.0	2.7	1.5	1.6	1.5	94
75 et plus	1.3	1.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	2.5	0.9	1.5	1.1	67
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	212	758	970	3 954	2 153	6 107	6 107
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	11	7	7	14	14
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.3	46.9	46.5	41.1	40.0	40.8	34.4	30.1	33.6	21.8	20.9	21.6	49.7	45.1	46.1	38.3	42.1	39.6	
écart-type	15.9	13.5	15.2	9.9	10.9	10.2	9.8	10.0	10.0	8.5	7.8	8.4	15.4	13.9	14.4	17.1	15.4	16.6	
1er quartile	36.0	37.3	36.3	33.7	32.3	32.8	27.3	22.2	26.2	16.5	16.4	16.5	42.1	36.4	37.4	24.6	29.9	26.6	
valeur médiane	46.9	47.7	47.2	41.3	39.7	41.0	33.1	28.2	32.3	17.8	17.8	17.8	50.6	46.2	47.3	37.5	43.4	39.4	
3e quartile	55.5	56.5	55.8	48.8	48.9	48.9	40.98	33.7	39.9	24.7	22.7	24.3	57.8	53.7	54.9	50.5	53.1	51.5	
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	216	763	979	3 958	2 158	6 116	
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	5	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Etat civil*																				
célibataire	44.4	35.2	41.7	65.7	60.4	64.3	67.6	77.3	69.5	90.9	88.3	90.5	21.8	27.9	26.6	59.4	41.9	53.2	3 017	
marié-e	31.8	27.6	30.6	13.4	12.5	13.2	18.2	9.3	16.4	4.0	4.3	4.0	63.2	50.6	53.3	24.0	32.1	26.9	1 523	
séparé-e	4.2	6.1	4.8	3.7	6.3	4.4	4.4	5.3	4.6	1.5	0.6	1.4	2.6	3.5	3.3	3.2	4.3	3.6	205	
divorcé-e	18.4	24.1	20.1	13.4	18.8	14.8	7.8	6.7	7.5	1.9	3.1	2.1	11.4	15.0	14.3	11.9	17.2	13.8	781	
veuf/veuve	0.7	5.9	2.3	3.7	2.1	3.3	1.0	0.0	0.8	1.4	3.1	1.7	0.0	2.0	1.6	1.0	3.6	1.9	110	
partenariat enregistré	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	1.0	0.9	0.9	0.4	0.9	0.6	33	
N**	1 785	767	2 552	134	48	182	296	75	371	784	162	946	193	705	898	3 673	1 996	5 669	5 669	
données manquantes	130	55	185	14	9	23	22	5	27	66	17	83	24	59	83	288	164	452	452	
Nationalité*																				
CH	76.0	80.3	77.3	73.2	84.9	76.7	73.0	81.8	74.8	82.3	87.6	83.2	84.5	88.7	87.8	78.0	84.9	80.5	4 587	
UE	15.4	12.3	14.4	19.7	7.5	16.1	15.3	11.7	14.6	11.0	4.7	9.9	12.5	7.9	8.9	13.8	9.4	12.3	700	
autre	8.6	7.4	8.3	7.1	7.5	7.2	11.7	6.5	10.6	6.7	7.6	6.9	3.0	3.4	3.3	8.1	5.6	7.2	413	
N**	1 771	772	2 543	127	53	180	300	77	377	801	170	971	200	707	907	3 678	2 022	5 700	5 700	
données manquantes	144	50	194	21	4	25	18	3	21	49	9	58	17	57	74	283	138	421	421	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	9.6	9.3	9.5	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.1	1.7	0.4	9.0	9.4	9.3	5.4	7.1	6.0	353
périphérie des grands centres	17.8	20.1	18.5	7.2	7.3	7.2	15.2	22.1	16.6	10.8	6.9	10.1	19.5	16.2	16.9	14.6	15.8	15.0	886
villes de moyenne importance	12.3	15.0	13.1	15.1	7.3	12.9	22.9	13.0	20.9	26.1	30.3	26.9	23.5	20.8	21.4	18.0	18.8	18.3	1 080
petites villes	30.4	30.3	30.4	50.4	50.9	50.5	36.7	45.5	38.5	32.3	33.7	32.5	28.0	31.6	30.8	32.9	33.4	33.1	1 951
campagne	29.9	25.3	28.5	25.9	34.5	28.4	24.2	19.5	23.3	30.6	27.4	30.0	20.0	21.9	21.5	29.1	24.9	27.6	1 629
N**	1 850	795	2 645	139	55	194	297	77	374	830	175	1 005	200	721	921	3 819	2 080	5 899	5 899
données manquantes	65	27	92	9	2	11	21	3	24	20	4	24	17	43	60	142	80	222	222
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	36.5	35.7	36.3	38.8	33.3	37.3	31.5	32.4	31.6	13.6	13.8	13.6	14.5	13.0	13.3	29.0	27.8	28.7	1 376
avec famille d'origine	7.6	4.4	6.7	11.6	11.1	11.4	20.2	26.5	21.5	62.3	52.0	60.6	13.3	8.1	9.2	24.5	13.5	21.1	1 011
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.0	51.9	47.1	24.0	46.7	30.1	34.8	30.9	34.0	9.3	11.2	9.6	67.5	76.9	74.9	33.7	49.1	38.6	1 852
avec des amis ou d'autres personnes	3.5	2.6	3.2	5.8	0.0	4.2	5.2	4.4	5.1	3.2	3.3	3.2	2.4	1.3	1.5	3.7	3.4	3.6	173
en prison	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	15
institution/foyer	2.7	1.1	2.2	8.3	0.0	6.0	2.6	4.4	3.0	4.1	8.6	4.9	0.0	0.3	0.3	3.0	2.0	2.7	129
hôpital/clinique	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	1.8	0.4	0.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	58
autre	2.5	2.3	2.5	8.3	6.7	7.8	4.5	1.5	3.9	6.5	10.5	7.2	2.4	0.3	0.8	4.3	3.0	3.9	188
N**	1 608	703	2 311	121	45	166	267	68	335	751	152	903	83	307	390	3 284	1 518	4 802	4 802
données manquantes	307	119	426	27	12	39	51	12	63	99	27	126	134	457	591	677	642	1 319	1 319
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
logement stable	92.2	93.2	92.5	79.8	81.8	80.4	89.8	88.4	89.6	91.0	81.6	89.4	92.6	95.3	94.7	91.3	91.9	91.5	4 544
logement instable/SDF	3.4	3.7	3.5	8.4	13.6	9.8	5.6	10.1	6.6	3.4	8.9	4.3	5.3	4.4	4.6	3.8	4.9	4.1	206
en prison	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
institution/foyer/hôpital/autre	4.2	3.1	3.8	10.1	4.5	8.6	4.1	1.4	3.6	5.2	9.5	5.9	2.1	0.3	0.7	4.5	3.2	4.1	202
N**	1 659	731	2 390	119	44	163	266	69	335	774	158	932	94	344	438	3 378	1 589	4 967	4 967
données manquantes	256	91	347	29	13	42	52	11	63	76	21	97	123	420	543	583	571	1 154	1 154

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

Type de relation de couple*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
sans partenaire, seul-e	39.5	41.6	40.1	58.8	33.3	50.7	47.6	45.2	47.2	78.4	57.4	74.7	17.8	20.2	19.7	50.9	38.7	46.7	1 455
relations temporaires	1.9	4.2	2.6	3.9	4.2	4.0	2.7	3.2	2.8	1.7	6.9	2.6	1.4	1.4	1.4	1.8	3.6	2.4	76
partenaire fixe, vivant séparé	12.9	12.3	12.7	3.9	16.7	8.0	17.0	29.0	19.1	12.2	25.7	14.6	6.8	11.9	10.9	12.7	14.3	13.2	412
partenaire fixe, ménage commun	45.7	41.9	44.5	33.3	45.8	37.3	32.7	22.6	30.9	7.7	9.9	8.1	74.0	66.4	68.0	34.6	43.4	37.6	1 170
N**	1 031	454	1 485	51	24	75	147	31	178	468	101	569	73	277	350	2 060	1 053	3 113	3 113
données manquantes	884	368	1 252	97	33	130	171	49	220	382	78	460	144	487	631	1 901	1 107	3 008	3 008
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	42.2	33.5	39.5	59.6	52.2	57.3	58.3	66.7	60.2	92.7	97.4	93.5	32.1	35.8	35.0	60.1	46.3	55.3	1 891
1 enfant	18.4	23.6	20.1	26.9	39.1	30.7	17.4	16.7	17.2	4.4	1.8	3.9	15.5	17.0	16.7	13.8	18.1	15.3	523
2 enfants	26.2	32.9	28.3	9.6	8.7	9.3	16.7	9.5	15.1	2.0	0.9	1.8	39.3	32.7	34.1	17.4	25.9	20.4	698
3 enfants ou plus	13.2	10.0	12.2	3.8	0.0	2.7	7.6	7.1	7.5	0.9	0.0	0.8	13.1	14.5	14.3	8.7	9.7	9.0	309
N**	1 087	499	1 586	52	23	75	144	42	186	545	114	659	84	330	414	2 230	1 191	3 421	3 421
données manquantes	828	323	1 151	96	34	130	174	38	212	305	65	370	133	434	567	1 731	969	2 700	2 700
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	75.3	66.6	72.5	85.7	70.8	80.8	77.3	73.1	76.6	78.0	85.4	79.2	51.3	50.8	50.9	75.7	65.6	72.1	2 101
1 enfant	9.3	18.6	12.2	8.2	29.2	15.1	7.6	15.4	9.0	7.8	5.2	7.4	19.7	19.0	19.1	9.3	16.4	11.8	345
2 enfants	10.7	12.3	11.2	4.1	0.0	2.7	10.9	11.5	11.0	9.7	6.3	9.2	26.3	22.7	23.4	10.5	13.8	11.7	340
3 enfants ou plus	4.7	2.4	4.0	2.0	0.0	1.4	4.2	0.0	3.4	4.4	3.1	4.2	2.6	7.5	6.5	4.5	4.2	4.4	128
N**	894	413	1 307	49	24	73	119	26	145	472	96	568	76	321	397	1 877	1 037	2 914	2 914
données manquantes	1 021	409	1 430	99	33	132	199	54	253	378	83	461	141	443	584	2 084	1 123	3 207	3 207

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	3.3	4.2	3.5	2.9	8.3	4.3	3.8	8.1	4.7	19.5	22.0	20.0	4.6	2.8	3.2	8.5	6.1	7.7	351
école obligatoire	11.1	11.6	11.3	28.8	25.0	27.9	18.8	32.3	21.6	52.5	50.7	52.2	8.5	7.2	7.4	24.0	16.7	21.6	989
formation de transition	3.1	2.8	3.0	2.9	11.1	5.0	4.6	1.6	4.0	4.0	5.3	4.2	3.1	2.0	2.2	3.5	3.2	3.4	154
formation générale sans maturité	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	0.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	27
formation prof. de base et apprentissage	57.1	57.1	57.1	56.7	47.2	54.3	55.6	46.8	53.8	19.3	12.7	18.1	42.3	49.5	47.9	45.6	47.6	46.3	2 117
maturité ou école normale	3.8	5.9	4.4	2.9	2.8	2.9	2.9	1.6	2.7	2.0	4.7	2.5	6.2	9.1	8.5	3.5	7.2	4.7	216
formation prof. supérieure	9.3	7.4	8.8	1.9	2.8	2.1	6.7	6.5	6.6	1.0	2.7	1.2	12.3	13.0	12.9	6.4	8.4	7.1	324
haute école spécialisée et université	11.2	9.9	10.8	3.8	2.8	3.6	7.5	1.6	6.3	1.4	1.3	1.4	20.8	15.6	16.8	7.8	9.9	8.5	388
doctorat ou habilitation	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	10
N**	1 435	597	2 032	104	36	140	239	62	301	732	150	882	130	461	591	3 059	1 517	4 576	4 576
<i>données manquantes</i>	480	225	705	44	21	65	79	18	97	118	29	147	87	303	390	902	643	1 545	1 545
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	18.5	25.7	20.7	36.0	65.4	42.9	19.8	26.4	21.3	20.3	22.0	20.6	40.0	23.3	27.5	20.4	26.8	22.1	568
apprenti-e, stagiaire	1.7	2.3	1.9	2.3	0.0	1.8	5.6	1.9	4.8	24.9	28.8	25.5	0.0	0.0	0.0	7.0	4.9	6.4	165
manœuvre, aide	3.1	2.5	2.9	11.6	3.8	9.8	4.5	5.7	4.8	3.4	1.7	3.1	0.0	0.0	0.0	3.5	2.4	3.2	83
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.3	4.5	5.8	7.0	7.7	7.1	5.6	3.8	5.2	4.0	1.7	3.6	0.0	0.0	0.0	6.0	4.2	5.5	141
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.9	5.2	12.0	19.8	3.8	16.1	22.6	3.8	18.3	8.3	5.1	7.8	0.0	6.7	5.0	14.7	5.7	12.2	314
contremaître-sse	2.4	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.6	1.5	0.0	1.3	10.0	0.0	2.5	2.0	0.1	1.5	39
employé-e non qualifié-e	25.0	33.6	27.6	15.1	7.7	13.4	16.4	34.0	20.4	14.8	11.9	14.3	10.0	30.0	25.0	21.0	29.8	23.4	600
empl. qualifié-e, cadre moyen	10.7	9.7	10.4	4.7	3.8	4.5	8.5	7.5	8.3	3.4	6.8	3.9	20.0	20.0	20.0	8.6	9.3	8.8	226
employé-e, cadre supérieur	5.2	2.7	4.4	0.0	0.0	0.0	5.1	5.7	5.2	0.9	0.0	0.8	20.0	0.0	5.0	3.7	2.4	3.4	87
indépendant-e	10.9	10.8	10.8	1.2	7.7	2.7	6.8	1.9	5.7	0.9	0.0	0.8	0.0	10.0	7.5	7.5	8.3	7.8	199
écolier/ère, étudiant-e	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.4	2.6	16.3	22.0	17.2	0.0	6.7	5.0	4.6	4.7	4.6	118
autre statut	0.6	1.1	0.7	2.3	0.0	1.8	1.1	0.0	0.9	1.2	0.0	1.0	0.0	3.3	2.5	0.9	1.1	1.0	25
N**	1 041	443	1 484	86	26	112	177	53	230	325	59	384	10	30	40	1 868	697	2 565	2 565
<i>données manquantes</i>	874	379	1 253	62	31	93	141	27	168	525	120	645	207	734	941	2 093	1 463	3 556	3 556

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	54.4	42.5	50.8	21.6	23.9	22.2	57.5	43.5	54.7	24.5	20.9	23.9	65.9	71.2	70.0	45.5	45.5	45.5	2 287
économies, épargne	2.2	1.4	2.0	2.4	2.2	2.3	1.4	0.0	1.1	0.4	1.3	0.5	1.1	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	80
rente (AVS, AI ou autre)	16.5	20.1	17.6	18.4	26.1	20.5	7.5	14.5	8.9	4.6	5.1	4.7	17.6	8.4	10.4	12.8	15.7	13.7	688
aide sociale	15.1	15.9	15.3	46.4	34.8	43.3	17.5	14.5	16.9	12.4	15.8	13.0	2.2	1.5	1.7	15.0	12.3	14.2	711
assurance-chômage	5.1	3.6	4.6	5.6	2.2	4.7	5.0	4.3	4.9	2.8	1.3	2.6	1.1	1.2	1.2	4.3	2.6	3.7	188
soutien du/de la partenaire	1.4	10.6	4.1	0.8	6.5	2.3	1.8	8.7	3.2	1.1	4.4	1.7	1.1	10.2	8.3	1.3	9.0	3.7	187
soutien parents/proches/amis	2.2	3.0	2.5	0.0	4.3	1.2	6.4	11.6	7.4	52.9	50.6	52.5	9.9	6.0	6.8	17.0	11.6	15.3	769
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostitution	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9
assurance d'indemnités journalières	1.1	1.4	1.2	2.4	0.0	1.8	1.1	1.4	1.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	41
autre	1.7	1.4	1.6	2.4	0.0	1.8	0.7	1.4	0.9	0.8	0.6	0.7	1.1	0.0	0.2	1.3	0.9	1.2	59
N**	1 692	725	2 417	125	46	171	280	69	349	783	158	941	91	333	424	3 449	1 575	5 024	5 024
données manquantes	223	97	320	23	11	34	38	11	49	67	21	88	126	431	557	512	585	1 097	1 097
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	51.0	29.4	44.5	18.5	11.4	16.6	50.7	32.4	47.0	17.3	8.4	15.8	66.2	45.4	49.6	41.0	30.1	37.6	1 798
activité à temps partiel	5.3	20.1	9.7	5.9	13.6	8.0	5.3	11.3	6.5	2.2	7.7	3.1	2.8	31.9	26.1	4.3	19.1	8.8	423
jobs occasionnels	0.9	1.2	1.0	2.5	2.3	2.5	1.8	1.4	1.7	0.8	0.6	0.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.9	1.0	46
en formation	2.4	2.9	2.5	1.7	0.0	1.2	6.7	11.3	7.6	59.9	61.9	60.2	8.5	8.2	8.2	19.7	13.6	17.8	851
sans travail, en quête d'emploi	12.3	9.2	11.4	18.5	9.1	16.0	12.3	15.5	13.0	8.3	2.6	7.4	2.8	1.8	2.0	10.7	7.1	9.6	459
sans travail, sans recherche d'emploi	8.1	9.2	8.4	24.4	38.6	28.2	9.5	7.0	9.0	3.8	5.2	4.0	0.0	1.1	0.8	7.3	7.2	7.3	347
rentier/rentière	7.2	9.9	8.0	0.0	6.8	1.8	0.7	1.4	0.8	0.0	1.9	0.3	15.5	8.5	9.9	4.4	7.8	5.4	259
incapacité de travail	5.9	6.3	6.0	13.4	6.8	11.7	7.0	11.3	7.9	1.8	0.6	1.6	1.4	0.0	0.3	5.1	4.7	5.0	238
femme/homme au foyer	0.1	5.1	1.6	0.8	0.0	0.6	0.0	5.6	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	1.4	1.1	0.2	3.3	1.1	54
autre	6.8	7.0	6.8	14.3	11.4	13.5	6.0	2.8	5.4	5.7	10.3	6.5	1.4	1.4	1.4	6.6	6.0	6.4	305
N**	1 605	688	2 293	119	44	163	284	71	355	768	155	923	71	282	353	3 306	1 474	4 780	4 780
données manquantes	310	134	444	29	13	42	34	9	43	82	24	106	146	482	628	655	686	1 341	1 341

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	51.6	57.1	53.2	81.3	78.6	80.4	46.8	47.1	46.8	70.2	81.3	72.0	81.8	87.8	86.5	59.5	69.0	62.3	685
moins de 1000 fr.	2.5	5.8	3.4	3.1	14.3	6.5	8.1	11.8	8.9	13.0	9.4	12.4	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	61
de 1001 à 2000 fr.	4.5	5.8	4.9	3.1	7.1	4.3	3.2	5.9	3.8	5.0	3.1	4.7	0.0	1.4	1.0	4.3	4.0	4.2	46
de 2001 à 3000 fr.	5.0	13.6	7.4	12.5	0.0	8.7	14.5	17.6	15.2	3.1	6.3	3.6	0.0	0.0	0.0	5.3	8.2	6.2	68
de 3001 à 4000 fr.	6.0	8.4	6.7	0.0	0.0	0.0	6.5	17.6	8.9	1.2	0.0	1.0	0.0	5.4	4.2	4.7	6.4	5.2	57
de 4001 à 5000 fr.	12.3	5.8	10.5	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	6.3	3.7	0.0	3.1	0.0	1.4	1.0	8.3	4.0	7.0	77
de 5001 à 6000 fr.	7.3	1.3	5.6	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	5.1	3.1	0.0	2.6	4.5	1.4	2.1	5.3	1.2	4.1	45
de 6001 à 8000 fr.	6.3	1.3	4.9	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.5	4.5	2.7	3.1	4.2	1.8	3.5	38
de 8001 à 10 000 fr.	3.0	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.3	14
de 10 001 à 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	3
plus de 15 000 fr.	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	5
N**	397	154	551	32	14	46	62	17	79	161	32	193	22	74	96	770	329	1 099	1 099
données manquantes	1 518	668	2 186	116	43	159	256	63	319	689	147	836	195	690	885	3 191	1 831	5 022	5 022
Dettes*																			
aucune dette	66.8	77.2	69.8	24.2	20.0	23.3	49.6	50.0	49.7	85.8	88.8	86.3	90.9	94.4	93.6	69.3	79.9	72.4	1 530
jusqu'à 5000 fr.	2.7	4.7	3.3	6.1	10.0	7.0	6.8	6.7	6.8	2.7	6.3	3.3	6.1	0.8	1.9	3.5	3.7	3.6	75
de 5001 à 10 000 fr.	6.8	7.1	6.9	12.1	40.0	18.6	8.5	16.7	10.2	2.7	3.8	2.9	0.0	2.4	1.9	6.3	7.2	6.5	138
de 10 001 à 25 000 fr.	5.2	2.0	4.3	3.0	10.0	4.7	10.3	3.3	8.8	3.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	5.0	2.1	4.2	88
de 25 001 à 50 000 fr.	4.6	2.0	3.8	9.1	10.0	9.3	7.7	10.0	8.2	1.8	0.0	1.5	3.0	0.8	1.3	4.2	1.9	3.5	74
de 50 001 à 100 000 fr.	6.3	3.1	5.4	33.3	0.0	25.6	6.0	3.3	5.4	2.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	6.2	2.2	5.0	106
plus de 100 000 fr.	4.6	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	2.6	1.0	2.1	45
montant inconnu	2.9	3.5	3.1	12.1	10.0	11.6	7.7	10.0	8.2	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.7	56
N**	630	254	884	33	10	43	117	30	147	438	80	518	33	124	157	1 486	626	2 112	2 112
données manquantes	1 285	568	1 853	115	47	162	201	50	251	412	99	511	184	640	824	2 475	1 534	4 009	4 009

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Emprisonnement ou détention préventive*																	
aucun-e	89.4	98.3	92.0	40.0	83.3	50.0	61.2	92.3	67.7	89.7	100.0	91.5	84.7	97.9	88.3	768	
emprisonnement	4.0	0.0	2.8	25.0	16.7	23.1	24.5	0.0	19.4	6.2	0.0	5.1	7.2	0.4	5.4	47	
détention préventive	4.0	0.6	3.0	15.0	0.0	11.5	4.1	7.7	4.8	3.1	0.0	2.5	3.9	0.9	3.1	27	
emprisonnement et détention préventive	2.6	1.1	2.2	20.0	0.0	15.4	10.2	0.0	8.1	1.0	0.0	0.8	4.1	0.9	3.2	28	
N**	424	179	603	20	6	26	49	13	62	97	21	118	636	234	870	870	
<i>données manquantes</i>	1 491	643	2 134	128	51	179	269	67	336	753	158	911	3 108	1 162	4 270	4 270	
Durée totale de détention***																	
jusqu'à 1 mois	32.3	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	25.9	0.0	24.1	14	
> 1 à 2 mois	12.9	0.0	11.8	0.0	100.0	33.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	7.4	25.0	8.6	5	
> 2 à 6 mois	19.4	33.3	20.6	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	40.0	-	40.0	18.5	25.0	19.0	11	
> 6 à 12 mois	9.7	33.3	11.8	50.0	0.0	33.3	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	14.8	25.0	15.5	9	
plus de 1 an	25.8	33.3	26.5	50.0	0.0	33.3	53.8	-	53.8	20.0	-	20.0	33.3	25.0	32.8	19	
N**	31	3	34	2	1	3	13	0	13	5	0	5	54	4	58	58	
<i>données manquantes</i>	14	0	14	10	0	10	6	1	7	5	0	5	43	1	44	44	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	13.9	6.3	11.6	5.5	6.1	5.7	13.3	2.7	11.1	50.7	41.9	49.2	2.8	0.9	1.3	20.4	7.3	15.8	885
cabinet médical	9.5	10.1	9.7	11.0	12.2	11.4	4.7	12.2	6.3	2.5	4.2	2.7	2.2	2.9	2.7	6.8	7.6	7.1	396
institution spécialisée dans les addictions	6.0	4.4	5.5	13.4	8.2	11.9	6.1	5.4	6.0	2.0	3.0	2.1	3.9	3.2	3.3	4.7	3.9	4.4	249
autre service médical/social/de santé	18.3	19.6	18.7	15.7	14.3	15.3	11.2	14.9	11.9	10.6	15.6	11.4	3.9	3.3	3.4	14.3	12.7	13.8	771
institution formatrice/éducative	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	4.1	1.7	2.9	3.6	3.1	1.1	0.6	0.7	1.7	1.4	1.6	88
employeur/employeuse	2.7	3.1	2.9	0.8	0.0	0.6	2.9	0.0	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.3	2.3	2.0	2.2	122
initiative personnelle/famille/amis	47.4	54.8	49.6	52.0	59.2	54.0	59.0	56.8	58.5	28.7	29.3	28.8	82.7	86.5	85.7	48.0	63.5	53.5	2 993
autre	1.5	1.2	1.4	1.6	0.0	1.1	1.8	4.1	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	94
N**	1 750	765	2 515	127	49	176	278	74	352	815	167	982	179	666	845	3 628	1 970	5 598	5 598
données manquantes	165	57	222	21	8	29	40	6	46	35	12	47	38	98	136	333	190	523	523

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	88.8	94.8	90.5	97.8	96.8	97.5	90.7	95.2	91.6	80.2	91.4	82.0	88.9	94.8	90.5	2 328
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.7	2.2	0.4	0.1	0.3	9
oui, consécutive à une mesure	11.2	5.2	9.5	2.2	3.2	2.5	9.3	4.8	8.4	17.5	6.9	15.8	10.6	5.0	9.2	236
N**	1 124	461	1 585	89	31	120	161	42	203	308	58	366	1 899	674	2 573	2 573
<i>données manquantes</i>	791	361	1 152	59	26	85	157	38	195	542	121	663	1 845	722	2 567	2 567
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.9	1.5	0.0	1.3	2
traitement résidentiel (art 60 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0	1.9	3
prise en charge ambulatoire	24.7	13.3	23.1	50.0	0.0	33.3	42.9	100.0	50.0	63.6	50.0	62.9	36.8	20.0	34.6	54
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1
en attente d'un jugement	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	11.4	3.7	5.0	3.8	6
autre	73.0	86.7	75.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	37.5	39.4	50.0	40.0	61.0	75.0	62.8	98
N**	89	15	104	2	1	3	7	1	8	33	2	35	136	20	156	156
<i>données manquantes</i>	37	9	46	0	0	0	8	1	9	28	3	31	74	15	89	89

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	48.9	47.8	48.5	14.5	11.1	13.6	49.4	56.4	50.7	76.4	75.7	76.2	77.3	73.7	74.5	57.0	56.0	56.7	2 519
oui	51.1	52.2	51.5	85.5	88.9	86.4	50.6	43.6	49.3	23.6	24.3	23.8	22.7	26.3	25.5	43.0	44.0	43.3	1 921
N**	1 541	678	2 219	117	45	162	247	55	302	685	144	829	66	236	302	3 068	1 372	4 440	4 440
<i>données manquantes</i>	374	144	518	31	12	43	71	25	96	165	35	200	151	528	679	893	788	1 681	1 681
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	0.7	2.1	1.2	0.0	4.0	1.3	1.2	11.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	15
substitution (méthadone, subutex)	4.1	5.0	4.4	80.8	64.0	75.3	23.5	33.3	24.4	1.7	4.8	2.1	0.0	1.6	1.3	10.8	8.3	10.0	131
autre traitement médicamenteux	6.7	5.8	6.4	7.7	8.0	7.8	6.2	11.1	6.7	1.7	0.0	1.4	0.0	3.2	2.6	6.1	5.0	5.7	75
prise en charge ambulatoire	70.2	78.1	72.7	46.2	44.0	45.5	76.5	66.7	75.6	88.3	76.2	86.5	86.7	83.9	84.4	73.5	76.5	74.5	978
structure/clinique de jour	1.7	1.7	1.7	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	1.2	16
traitement résidentiel	48.2	50.4	48.9	28.8	44.0	33.8	42.0	55.6	43.3	14.2	33.3	17.0	33.3	19.4	22.1	39.2	42.0	40.1	527
sevrage	35.4	40.5	37.0	36.5	52.0	41.6	29.6	44.4	31.1	10.8	19.0	12.1	26.7	8.1	11.7	29.6	31.6	30.2	397
groupe d'entraide ou d'auto-support	4.7	4.1	4.5	1.9	4.0	2.6	6.2	0.0	5.6	0.8	0.0	0.7	0.0	3.2	2.6	3.9	3.8	3.9	51
autre(s)	2.0	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.2	5.0	4.8	5.0	0.0	4.8	3.9	2.4	2.4	2.4	31
N**	537	242	779	52	25	77	81	9	90	120	21	141	15	62	77	892	421	1 313	1 313
<i>données manquantes</i>	258	115	373	48	15	63	45	15	60	47	15	62	0	3	3	440	191	631	631

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	97.9	97.8	97.8	36.1	36.0	36.0	90.6	90.6	90.6	99.5	99.2	99.4	95.8	95.8	95.8	2 875
oui	2.1	2.2	2.2	63.9	64.0	64.0	9.4	9.4	9.4	0.5	0.8	0.6	4.2	4.2	4.2	126
N**	1 087	489	1 576	61	25	86	139	32	171	564	125	689	2 159	842	3 001	3 001
<i>données manquantes</i>	828	333	1 161	87	32	119	179	48	227	286	54	340	1 585	554	2 139	2 139
Type de substitution/prescription***																
héroïne	13.0	10.0	12.1	34.2	20.0	30.2	16.7	0.0	13.3	100.0	-	100.0	29.1	18.8	26.3	31
méthadone	65.2	90.0	72.7	42.1	73.3	50.9	66.7	33.3	60.0	0.0	-	0.0	48.8	68.8	54.2	64
autres opiacés	8.7	0.0	6.1	23.7	6.7	18.9	8.3	66.7	20.0	0.0	-	0.0	15.1	12.5	14.4	17
autres substances	13.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	0.0	-	0.0	7.0	0.0	5.1	6
N**	23	10	33	38	15	53	12	3	15	2	0	2	86	32	118	118
<i>données manquantes</i>	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	2	5	3	8	8
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	94.5	95.6	94.8	13.9	22.2	16.1	85.7	84.2	85.4	98.1	98.1	98.1	88.8	90.5	89.2	2 008
oui	5.5	4.4	5.2	86.1	77.8	83.9	14.3	15.8	14.6	1.9	1.9	1.9	11.2	9.5	10.8	242
N**	925	406	1 331	101	36	137	168	38	206	258	53	311	1 629	621	2 250	2 250
<i>données manquantes</i>	990	416	1 406	47	21	68	150	42	192	592	126	718	2 115	775	2 890	2 890
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	32.3	21.8	29.5	29.0	30.5	29.3	23.5	33.5	25.1	29.3	24.0	28.0	28.6	28.1	28.5	
Ecart-type	9.9	7.4	10.3	7.1	11.1	7.7	6.3	12.0	7.7	8.1		7.1	8.0	10.4	8.5	
25 centile	25.5	16.0	25.0	23.0	24.0	23.0	18.0	25.0	18.0	22.0	24.0	23.0	22.0	22.0	22.0	
Médiane	29.0	20.0	27.0	30.0	26.5	29.0	21.0	33.5	25.0	28.0	24.0	26.0	28.0	25.0	27.0	
75 centile	34.5	25.0	34.0	33.0	32.0	33.0	29.0	42.0	29.0	38.0	24.0	33.0	33.0	32.0	33.0	
N**	16	6	22	29	6	35	11	2	13	3	1	4	66	17	83	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2018)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	51.1	58.9	53.2	2 737	alcool	51.1	58.9	53.2	2 737
héroïne	2.9	3.2	3.0	154					
méthadone	0.5	0.4	0.4	23					
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0	opioïdes	4.0	4.1	4.0	205
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
autres opioïdes	0.6	0.5	0.5	28					
cocaïne en poudre	8.2	5.4	7.4	382					
crack	0.3	0.3	0.3	14	cocaïne ou dérivés	8.5	5.7	7.7	398
autre forme de cocaïne	0.0	0.1	0.0	2					
amphétamines	1.1	0.9	1.1	56					
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1	3					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.8	0.4	22	stimulants	1.6	1.9	1.7	87
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0					
autres stimulants	0.1	0.1	0.1	6					
barbituriques	0.0	0.1	0.0	2					
benzodiazépines	0.9	2.0	1.2	61	hypnotiques/sédatifs	1.0	2.7	1.5	77
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.6	0.3	13					
LSD	0.2	0.0	0.2	8					
kétamine	0.1	0.1	0.1	3	hallucinogènes	0.3	0.1	0.3	13
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	2					
cannabis	22.7	12.8	20.0	1 029	cannabis	22.7	12.8	20.0	1 029
tabac	2.4	3.4	2.7	137	tabac	2.4	3.4	2.7	137
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0					
autre substance	0.3	0.4	0.4	19	autres substances	0.3	0.4	0.4	19
jeu pathologique	4.0	1.7	3.3	172					
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.3	0.6	1.1	58	comportement de type addictif	8.0	10.0	8.5	438
troubles alimentaires	0.2	4.8	1.5	75					
autre comportement de type addictif	2.5	2.9	2.6	133					
N**	3 744	1 396	5 140	5 140		3 744	1 396	5 140	5 140
données manquantes	0	0	0	0		0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2018)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	8.6	7.9	8.4
non	91.4	92.1	91.6
N**	1 727	635	2 362
<i>données manquantes</i>	2 017	761	2 778
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
coc/alc	16.8	8.1	14.6
can/alc	7.5	8.1	7.6
med/alc	2.8	18.9	6.9
tab/alc	6.5	8.1	6.9
can/coc/alc	5.6	2.7	4.9
can/coc/op/alc	3.7	2.7	3.5
tab/can/alc	2.8	5.4	3.5
op/alc	3.7	0.0	2.8
coc/op	3.7	0.0	2.8
tab/can	2.8	2.7	2.8
can/op	2.8	0.0	2.1
can/med/alc	0.9	5.4	2.1
tab/coc/alc	2.8	0.0	2.1
tab/can/coc/alc	2.8	0.0	2.1
coc/op/alc	0.9	2.7	1.4
stim/alc	0.9	2.7	1.4
stim/coc	0.9	2.7	1.4
can/coc	1.9	0.0	1.4
can/stim/coc	0.0	5.4	1.4
tab/med/alc	0.9	2.7	1.4
tab/can/med/op/alc	0.9	2.7	1.4
tab/can/Hal/stim/coc/alc	1.9	0.0	1.4
autres combinaisons	26.2	18.9	24.3
N**	107	37	144
<i>données manquantes</i>	42	13	55

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.8	38.4	12.6	21.6	65.4	10.0	31.1	87.0	0.0
4 à 6 jours par semaine	14.4	14.0	13.5	3.9	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.7	9.3	20.6	15.7	7.7	10.0	19.3	3.9	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.3	11.6	24.7	23.5	3.8	20.0	20.4	3.9	100.0
aucune consommation	21.7	26.7	28.7	35.3	23.1	60.0	22.8	5.2	0.0
N**	1 502	86	223	51	26	10	734	77	2
<i>données manquantes</i>	413	62	95	10	13	2	116	13	11

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.9	35.1	11.9	28.6	77.4	-	31.8	95.0	-
4 à 6 jours par semaine	15.4	5.4	17.9	0.0	3.2	-	5.3	0.0	-
2 à 3 jours par semaine	15.1	13.5	26.9	14.3	3.2	-	16.6	0.0	-
1 jour par semaine ou moins	9.4	16.2	16.4	23.8	6.5	-	19.9	2.5	-
aucune consommation	18.1	29.7	26.9	33.3	9.7	-	26.5	2.5	-
N**	668	37	67	21	31	0	151	40	0
<i>données manquantes</i>	154	20	13	5	7	1	28	7	6

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.5	37.4	12.4	23.6	71.9	10.0	31.2	89.7	0.0
4 à 6 jours par semaine	14.7	11.4	14.5	2.8	1.8	0.0	6.2	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.5	10.6	22.1	15.3	5.3	10.0	18.9	2.6	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.7	13.0	22.8	23.6	5.3	20.0	20.3	3.4	100.0
aucune consommation	20.6	27.6	28.3	34.7	15.8	60.0	23.4	4.3	0.0
N**	2 170	123	290	72	57	10	885	117	2
<i>données manquantes</i>	567	82	108	15	20	3	144	20	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	27.3	69.0	75.0	64.2
4 à 6 jours par semaine	12.1	17.2	12.5	11.1
2 à 3 jours par semaine	15.2	3.4	0.0	12.3
1 jour par semaine ou moins	21.2	0.0	0.0	7.4
aucune manifestation	24.2	10.3	12.5	4.9
N**	99	29	8	81
<i>données manquantes</i>	49	20	0	12

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	18.8	100.0	50.0	48.1
4 à 6 jours par semaine	6.3	0.0	14.3	3.7
2 à 3 jours par semaine	12.5	0.0	17.9	11.1
1 jour par semaine ou moins	31.3	0.0	12.5	18.5
aucune manifestation	31.3	0.0	5.4	18.5
N**	16	6	56	27
<i>données manquantes</i>	8	3	11	13

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2018), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	26.1	74.3	53.1	60.2
4 à 6 jours par semaine	11.3	14.3	14.1	9.3
2 à 3 jours par semaine	14.8	2.9	15.6	12.0
1 jour par semaine ou moins	22.6	0.0	10.9	10.2
aucune manifestation	25.2	8.6	6.3	8.3
N**	115	35	64	108
<i>données manquantes</i>	57	23	11	25

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), hommes

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.4	21.9	22.5	19.9	28.8	17.8	15.2	16.0	23.7
écart-type	3.8	7.5	7.4	8.4	13.3	2.8	2.2	4.0	16.2
1er quartile	15.0	17.0	18.0	16.0	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	15.0	18.0
3e quartile	18.0	25.0	25.0	21.0	37.5	19.0	16.0	17.0	27.0
N*	985	78	190	40	16	9	589	50	7
données manquantes	930	70	128	21	23	3	261	40	6
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	23.2	23.1	24.5	20.6	29.4	19.0	15.9	17.9	31.8
écart-type	8.4	6.7	8.2	7.6	13.8	4.0	2.2	5.6	18.5
1er quartile	18.0	18.0	19.0	16.0	21.0	15.0	15.0	15.0	20.5
valeur médiane	20.0	20.0	22.5	18.5	25.0	19.0	16.0	16.0	25.0
3e quartile	26.0	29.0	29.0	21.0	30.0	23.0	16.0	20.0	43.0
N*	673	39	102	22	9	3	380	44	4
données manquantes	1 242	109	216	39	30	9	470	46	9
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.0	24.5	26.7	23.9	36.4	19.6	17.4	22.6	31.3
écart-type	12.4	7.8	9.0	10.0	16.1	3.9	4.8	11.5	12.6
1er quartile	21.0	18.0	20.0	18.0	25.0	16.0	15.0	16.0	19.0
valeur médiane	30.0	23.5	25.0	21.0	29.0	19.5	16.0	18.0	30.0
3e quartile	40.0	29.0	31.0	27.0	49.0	22.5	17.5	26.0	44.0
N*	1 031	70	181	38	12	8	548	54	6
données manquantes	884	78	137	23	27	4	302	36	7
Période de latence (en années)**									
moyenne	26.4	10.7	8.5	5.4	7.6	8.8	4.2	18.2	7.4
écart-type	12.8	10.6	7.7	7.0	8.5	13.0	6.0	15.8	11.6
1er quartile	17.2	2.9	2.6	1.1	0.7	0.7	1.1	2.1	0.4
valeur médiane	25.4	5.3	6.1	3.1	5.1	3.3	2.0	16.3	1.0
3e quartile	35.1	14.3	12.0	6.9	17.1	16.9	4.3	28.9	20.8
N*	425	11	81	13	3	4	378	34	3
données manquantes	328	6	41	5	6	2	145	22	4

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), femmes

Patientes: principale substance posant problème									
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	17.5	25.0	22.0	16.8	33.6	54.0	15.1	16.9	-
écart-type	5.3	12.4	8.6	2.4	16.8	-	1.7	3.2	-
1er quartile	15.0	18.0	16.5	15.0	18.0	-	14.0	15.0	-
valeur médiane	16.0	21.0	19.0	17.0	30.0	54.0	15.0	16.0	-
3e quartile	18.0	27.0	24.0	18.0	48.0	-	16.0	18.0	-
N*	395	26	56	20	17	1	126	31	0
données manquantes	427	31	24	6	21	0	53	16	6
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	26.6	24.3	21.2	17.2	33.8	-	16.0	19.5	-
écart-type	10.8	8.0	5.9	2.3	16.4	-	2.1	5.0	-
1er quartile	20.0	19.0	17.0	16.0	21.5	-	15.0	16.5	-
valeur médiane	23.0	21.0	20.0	16.0	31.5	-	16.0	18.0	-
3e quartile	30.0	28.0	24.5	19.0	40.5	-	17.0	21.0	-
N*	301	17	24	10	12	0	83	28	0
données manquantes	521	40	56	16	26	1	96	19	6
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	34.7	26.7	23.8	20.3	35.9	54.0	17.2	22.7	32.8
écart-type	13.4	12.2	8.3	6.1	12.7	-	4.5	7.4	7.8
1er quartile	25.0	20.0	18.0	16.0	30.0	-	15.0	17.0	26.5
valeur médiane	33.0	21.0	20.0	18.0	33.0	54.0	16.0	19.5	34.0
3e quartile	44.0	33.0	29.0	21.0	47.0	-	18.0	30.0	39.0
N*	479	29	52	19	25	1	104	28	4
données manquantes	343	28	28	7	13	0	75	19	2
Période de latence (en années)**									
moyenne	26.7	8.2	7.0	5.3	4.9	-	4.5	25.3	-
écart-type	13.9	2.6	5.8	7.3	4.6	-	6.1	17.7	-
1er quartile	15.4	6.4	3.0	0.8	1.6	-	1.1	6.2	-
valeur médiane	24.9	8.2	4.7	2.0	4.9	-	2.1	23.7	-
3e quartile	36.0	10.0	10.9	7.9	8.1	-	5.0	40.8	-
N*	172	2	23	8	2	0	82	24	0
données manquantes	150	3	8	4	6	0	27	10	2

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2018), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.7	22.6	22.4	18.8	31.3	21.4	15.2	16.3	23.7	
écart-type	4.3	9.0	7.7	7.1	15.2	11.7	2.1	3.7	16.2	
1er quartile	15.0	17.0	17.0	15.5	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0	
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	17.5	28.0	18.5	15.0	16.0	18.0	
3e quartile	18.0	25.0	25.0	20.0	41.0	20.0	16.0	18.0	27.0	
N*	1 380	104	246	60	33	10	715	81	7	
<i>données manquantes</i>	1 357	101	152	27	44	3	314	56	12	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	24.2	23.5	23.9	19.5	32.0	19.0	15.9	18.5	31.8	
écart-type	9.3	7.1	7.9	6.6	15.1	4.0	2.2	5.4	18.5	
1er quartile	18.0	18.0	18.0	16.0	21.0	15.0	15.0	16.0	20.5	
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	18.0	28.0	19.0	16.0	17.0	25.0	
3e quartile	30.0	28.5	27.0	20.0	35.0	23.0	16.0	20.0	43.0	
N*	974	56	126	32	21	3	463	72	4	
<i>données manquantes</i>	1 763	149	272	55	56	10	566	65	15	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.9	25.2	26.0	22.7	36.1	23.4	17.4	22.6	31.9	
écart-type	12.8	9.3	8.9	9.0	13.6	12.0	4.7	10.3	10.4	
1er quartile	22.0	19.0	19.0	17.0	25.0	16.0	15.0	16.0	23.0	
valeur médiane	30.0	22.0	24.0	20.0	33.0	20.0	16.0	18.0	32.5	
3e quartile	40.0	30.0	31.0	26.0	47.0	23.0	18.0	28.0	40.0	
N*	1 510	99	233	57	37	9	652	82	10	
<i>données manquantes</i>	1 227	106	165	30	40	4	377	55	9	
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.5	10.3	8.1	5.3	6.5	8.8	4.3	21.2	7.4	
écart-type	13.1	9.8	7.3	6.9	6.6	13.0	6.0	16.9	11.6	
1er quartile	16.9	3.5	2.8	1.0	1.6	0.7	1.1	4.7	0.4	
valeur médiane	25.4	6.4	6.1	2.6	5.1	3.3	2.0	20.4	1.0	
3e quartile	35.8	13.6	11.2	6.9	8.1	16.9	4.4	35.0	20.8	
N*	597	13	104	21	5	4	460	58	3	
<i>données manquantes</i>	478	9	49	9	12	2	172	32	6	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	21.8	15.9	8.0	17.0
écart-type	8.6	10.7	8.7	10.6
1er quartile	17.0	12.0	2.0	12.0
valeur médiane	20.0	13.5	4.0	14.0
3e quartile	22.5	15.0	18.0	16.0
N*	52	16	3	43
<i>données manquantes</i>	96	33	5	50
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	28.4	14.5	25.0	17.4
écart-type	11.6	2.1	17.9	7.9
1er quartile	20.0	13.0	14.5	13.0
valeur médiane	24.5	14.5	19.5	15.0
3e quartile	33.5	16.0	35.5	20.0
N*	28	4	4	41
<i>données manquantes</i>	120	45	4	52
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	27.1	18.0	22.3	22.3
écart-type	9.0	10.8	19.9	11.6
1er quartile	20.0	14.0	9.0	14.5
valeur médiane	25.0	16.0	15.0	17.5
3e quartile	30.0	18.0	35.5	25.0
N*	61	17	4	44
<i>données manquantes</i>	87	32	4	49
Période de latence (en années)**				
moyenne	9.0	6.2	31.0	8.4
écart-type	7.3	4.7	29.2	9.2
1er quartile	3.3	4.0	10.4	2.6
valeur médiane	6.7	4.6	31.0	4.7
3e quartile	14.1	7.7	51.6	11.9
N*	41	13	2	39
<i>données manquantes</i>	48	12	2	31

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	32.2	25.0	16.0	22.2	
écart-type	13.2	19.4	5.3	12.4	
1er quartile	20.0	12.0	14.0	14.5	
valeur médiane	33.0	17.5	16.0	16.0	
3e quartile	41.0	38.0	18.0	29.5	
N*	11	4	43	20	
données manquantes	13	5	24	20	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	37.7	-	19.0	23.7	
écart-type	13.5	-	6.0	14.6	
1er quartile	30.0	-	15.0	16.0	
valeur médiane	33.0	-	18.0	17.0	
3e quartile	45.0	-	20.0	30.0	
N*	9	0	36	13	
données manquantes	15	9	31	27	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	37.1	26.3	20.5	26.2	
écart-type	13.7	19.3	8.0	14.0	
1er quartile	28.0	13.0	16.0	17.0	
valeur médiane	34.0	19.0	18.0	19.0	
3e quartile	45.0	39.5	20.0	34.0	
N*	13	4	46	18	
données manquantes	11	5	21	22	
Période de latence (en années)**					
moyenne	12.0	2.8	13.7	6.9	
écart-type	8.1	1.6	13.9	7.0	
1er quartile	5.4	1.7	3.5	1.4	
valeur médiane	13.3	2.8	7.1	3.5	
3e quartile	14.1	3.9	18.5	11.2	
N*	8	2	21	15	
données manquantes	6	1	10	6	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2018), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal					
<i>Hommes et femmes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	23.6	17.7	15.5	18.7	
écart-type	10.3	12.8	5.8	11.4	
1er quartile	18.0	12.0	14.0	13.0	
valeur médiane	20.0	13.5	16.0	14.0	
3e quartile	25.0	16.0	18.0	18.0	
N*	63	20	46	63	
<i>données manquantes</i>	109	38	29	70	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	30.6	14.5	19.6	18.9	
écart-type	12.6	2.1	7.7	10.2	
1er quartile	20.0	13.0	15.0	14.0	
valeur médiane	27.0	14.5	18.0	16.0	
3e quartile	40.0	16.0	20.0	20.0	
N*	37	4	40	54	
<i>données manquantes</i>	135	54	35	79	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	28.9	19.6	20.7	23.5	
écart-type	10.6	12.6	9.1	12.3	
1er quartile	21.0	14.0	15.0	15.0	
valeur médiane	27.5	16.0	18.0	18.0	
3e quartile	32.0	18.0	20.0	29.0	
N*	74	21	50	62	
<i>données manquantes</i>	98	37	25	71	
Période de latence (en années)**					
moyenne	9.5	5.8	15.2	8.0	
écart-type	7.5	4.6	15.4	8.6	
1er quartile	3.4	2.6	3.5	2.6	
valeur médiane	7.1	4.5	8.2	4.4	
3e quartile	14.1	7.7	22.0	11.2	
N*	49	15	23	54	
<i>données manquantes</i>	54	13	12	37	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2018)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injection	22.2	18.8	21.3	5.4	3.8	5.0	2.9	0.0	2.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	53.3	50.0	52.5	6.5	5.8	6.3	20.6	12.5	19.0	98.8	99.1	98.9	10.5	6.3	8.6
ingestion (manger/boire)	4.4	0.0	3.3	0.5	5.8	1.7	32.4	50.0	35.7	0.3	0.9	0.4	89.5	93.8	91.4
sniff	20.0	31.3	23.0	87.6	84.6	87.0	41.2	37.5	40.5	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	45	16	61	186	52	238	34	8	42	588	116	704	19	16	35
données manquantes	65	28	93	121	23	144	9	5	14	262	63	325	14	12	26

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Injections au cours de la vie*																
oui	3.9	3.1	3.7	41.6	40.5	41.3	13.2	12.8	13.1	0.3	0.7	0.4	4.6	4.4	4.5	166
non	94.4	95.3	94.7	57.3	56.8	57.1	83.8	87.2	84.3	99.0	98.6	98.9	93.9	94.4	94.1	3 445
ne veut pas répondre	1.8	1.6	1.7	1.1	2.7	1.6	3.0	0.0	2.5	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1.4	51
N**	1 310	579	1 889	89	37	126	197	39	236	690	139	829	2 661	1 001	3 662	3 662
<i>données manquantes</i>	605	243	848	59	20	79	121	41	162	160	40	200	1 083	395	1 478	1 478
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	0.8	2.1	1.2	17.8	22.2	19.0	27.9	12.5	25.5	0.0	0.0	0.0	4.4	4.0	4.3	30
non	99.2	97.9	98.8	82.2	77.8	81.0	72.1	87.5	74.5	100.0	100.0	100.0	95.6	96.0	95.7	671
N**	237	97	334	45	18	63	43	8	51	116	21	137	525	176	701	701
<i>données manquantes</i>	1 678	725	2 403	103	39	142	275	72	347	734	158	892	3 219	1 220	4 439	4 439
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.4	0.0	0.3	14.3	16.7	15.0	18.6	12.5	17.6	0.0	0.0	0.0	3.1	2.3	2.9	20
non	99.6	100.0	99.7	85.7	83.3	85.0	81.4	87.5	82.4	100.0	100.0	100.0	96.9	97.7	97.1	675
N**	235	94	329	42	18	60	43	8	51	117	20	137	520	175	695	695
<i>données manquantes</i>	1 680	728	2 408	106	39	145	275	72	347	733	159	892	3 224	1 221	4 445	4 445
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	35.7	40.0	36.8	30.8	50.0	36.8	12.5	0.0	11.1	-	0.0	0.0	27.8	38.5	30.6	15
non	57.1	60.0	57.9	53.8	50.0	52.6	87.5	100.0	88.9	-	100.0	100.0	63.9	61.5	63.3	31
ne veut pas répondre	7.1	0.0	5.3	15.4	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	8.3	0.0	6.1	3
N**	14	5	19	13	6	19	8	1	9	0	1	1	36	13	49	49
<i>données manquantes</i>	37	13	50	24	9	33	18	4	22	2	0	2	86	31	117	117
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	18.2	16.7	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.5	5.3	4.8	3
non	100.0	100.0	100.0	81.8	83.3	82.4	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	95.5	94.7	95.2	60
N**	24	9	33	11	6	17	6	1	7	1	0	1	44	19	63	63
<i>données manquantes</i>	27	9	36	26	9	35	20	4	24	1	1	2	78	25	103	103
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	1
non	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
N**	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>données manquantes</i>	51	18	69	36	15	51	26	5	31	2	1	3	121	44	165	165

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	0.0	9.1	2.8	11.8	0.0	7.4	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	7.1	8.0	7.4	6
de 15 à 16 ans	8.0	18.2	11.1	0.0	20.0	7.4	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	5.4	16.0	8.6	7
de 17 à 18 ans	20.0	36.4	25.0	17.6	20.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	17.9	28.0	21.0	17
de 19 à 20 ans	20.0	27.3	22.2	23.5	10.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	21.4	16.0	19.8	16
de 21 à 25 ans	40.0	9.1	30.6	23.5	50.0	33.3	27.3	0.0	23.1	-	100.0	100.0	32.1	28.0	30.9	25
de 26 à 30 ans	4.0	0.0	2.8	17.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
de 31 à 39 ans	8.0	0.0	5.6	5.9	0.0	3.7	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	1.8	4.0	2.5	2
N**	25	11	36	17	10	27	11	2	13	0	1	1	56	25	81	81
<i>données manquantes</i>	26	7	33	20	5	25	15	3	18	2	0	2	66	19	85	85

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), hommes

Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	23.0	23.9	12.7	8.6	18.2	10.4	26.4	15.4
héroïne	1.5	2.9	3.7	3.6	8.6	0.0	1.3	2.3	7.7
méthadone	0.5	9.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	7.7
buprénorphine	0.0	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
fentanyl	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres opioïdes	0.5	0.7	0.7	0.0	5.7	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne en poudre	6.0	20.1	1.0	12.7	11.4	18.2	6.4	1.1	7.7
crack	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.0	1.4	6.0	7.3	2.9	27.3	2.2	1.1	0.0
méthamphétamines	0.6	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.8	2.2	4.0	9.1	0.0	27.3	2.7	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.1	11.5	1.7	3.6	2.9	9.1	0.6	1.1	23.1
GHB/GBL	0.2	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	1.1	0.0	2.7	3.6	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	7.5	20.9	19.6	23.6	17.1	36.4	-	12.6	15.4
tabac	13.6	20.1	17.9	16.4	20.0	36.4	11.7	-	15.4
autre substance	0.2	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
jeu pathologique	0.3	0.0	0.3	1.8	2.9	0.0	0.2	4.6	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	7.7
troubles alimentaires	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.7
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
aucun autre problème addictif	79.2	51.1	60.1	67.3	54.3	54.5	78.9	62.1	53.8
N**	1 770	139	301	55	35	11	823	87	13
<i>données manquantes</i>	<i>145</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>27</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	13.2	28.8	20.8	26.3	0.0	6.9	12.8	16.7
héroïne	1.0	1.9	5.0	0.0	5.3	0.0	0.6	0.0	0.0
méthadone	0.1	5.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.3	1.9	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.8	11.3	0.0	16.7	5.3	0.0	2.9	0.0	0.0
crack	0.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.2	1.9	8.8	0.0	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0
méthamphétamines	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.7	0.0	7.5	4.2	2.6	0.0	2.9	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	4.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.6	11.3	3.8	0.0	2.6	0.0	1.1	4.3	33.3
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
cannabis	5.9	9.4	27.5	29.2	7.9	0.0	-	10.6	0.0
tabac	10.2	13.2	21.3	8.3	13.2	0.0	10.3	-	0.0
autre substance	0.0	1.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.4	0.0	3.8	0.0	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	81.9	62.3	51.3	58.3	57.9	0.0	82.8	85.1	50.0
N**	768	53	80	24	38	1	174	47	6
<i>données manquantes</i>	<i>54</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2018), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	20.3	24.9	15.2	17.8	16.7	9.8	21.6	15.8
héroïne	1.4	2.6	3.9	2.5	6.8	0.0	1.2	1.5	5.3
méthadone	0.4	8.3	0.5	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	5.3
buprénorphine	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	5.3
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres opioïdes	0.4	1.0	0.5	0.0	6.8	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaïne en poudre	5.4	17.7	0.8	13.9	8.2	16.7	5.8	0.7	5.3
crack	0.3	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.0	1.6	6.6	5.1	2.7	25.0	2.2	0.7	0.0
méthamphétamines	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.8	1.6	4.7	7.6	1.4	25.0	2.7	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.5	1.3	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.6	11.5	2.1	2.5	2.7	8.3	0.7	2.2	26.3
GHB/GBL	0.2	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.0	0.0	0.0	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0
LSD	0.8	0.0	2.1	3.8	0.0	8.3	1.3	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cannabis	7.0	17.7	21.3	25.3	12.3	33.3	-	11.9	10.5
tabac	12.5	18.2	18.6	13.9	16.4	33.3	11.4	-	10.5
autre substance	0.1	2.1	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	0.0
jeu pathologique	0.2	0.0	0.3	1.3	1.4	0.0	0.2	3.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	5.3
troubles alimentaires	0.6	0.0	0.8	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	5.3
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0
aucun autre problème addictif	80.0	54.2	58.3	64.6	56.2	50.0	79.5	70.1	52.6
N**	2 538	192	381	79	73	12	997	134	19
<i>données manquantes</i>	<i>199</i>	<i>13</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>32</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3.0	2.1	0.0	1.2
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.2	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.5	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.2	4.2	0.0	1.2
tabac	4.5	2.1	0.0	1.2
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	2.1	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.5	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	2.1	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	8.3	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	88.1	85.4	100.0	97.6
N**	134	48	8	85
<i>données manquantes</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>8</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	9.1	0.0	1.7	3.1
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	4.5	0.0	1.7	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0	3.1
tabac	4.5	12.5	0.0	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.5	0.0	0.0	6.3
troubles alimentaires	0.0	25.0	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	12.5	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	86.4	62.5	98.3	90.6
N**	22	8	58	32
<i>données manquantes</i>	2	1	9	8

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2018), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	3.8	1.8	1.5	1.7
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.9	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1.3	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.6	0.0	1.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.9	3.6	0.0	1.7
tabac	4.5	3.6	0.0	0.9
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	1.8	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.5	0.0	0.0	1.7
troubles alimentaires	0.0	5.4	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	8.9	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	87.8	82.1	98.5	95.7
N**	156	56	66	117
données manquantes	16	2	9	16

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	46.2	20.0	41.9	17.9	13.6	16.7	14.5	10.0	13.9	50.0	33.3	36.4	40.0	0.0	28.6	21.8	16.9	20.6	51
4 à 6 jours par semaine	11.5	20.0	12.9	19.6	18.2	19.2	2.9	10.0	3.8	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	11.7	11.9	11.7	29
2 à 3 jours par semaine	15.4	40.0	19.4	26.8	31.8	28.2	11.6	0.0	10.1	50.0	22.2	27.3	20.0	0.0	14.3	16.0	25.4	18.2	45
1 jour par semaine ou moins	19.2	20.0	19.4	17.9	27.3	20.5	47.8	40.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	28.6	29.8	23.7	28.3	70
aucune consomm.	7.7	0.0	6.5	17.9	9.1	15.4	23.2	40.0	25.3	0.0	44.4	36.4	20.0	0.0	14.3	20.7	22.0	21.1	52
N**	26	5	31	56	22	78	69	10	79	2	9	11	5	2	7	188	59	247	247
données manquantes	122	52	174	262	58	320	781	169	950	37	29	66	293	138	431	3 773	2 101	5 874	5 874
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	10.5	0.0	8.0	50.0	0.0	33.3	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	19.4	0.0	14.6	7
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	16.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.8	8.3	4.2	2
1 jour par semaine ou moins	21.1	0.0	16.0	16.7	66.7	33.3	20.0	0.0	16.7	100.0	0.0	33.3	-	-	-	22.2	16.7	20.8	10
aucune consomm.	68.4	83.3	72.0	33.3	33.3	33.3	60.0	100.0	66.7	0.0	100.0	66.7	-	-	-	55.6	75.0	60.4	29
N**	19	6	25	6	3	9	5	1	6	1	2	3	0	0	0	36	12	48	48
données manquantes	1 896	816	2 712	312	77	389	845	178	1 023	38	36	74	298	140	438	3 925	2 148	6 073	6 073
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	1.3	4.8	2.0	5.6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	1.9	2.9	2.1	4
4 à 6 jours par semaine	6.4	0.0	5.1	5.6	0.0	4.5	2.2	0.0	2.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	5.0	0.0	4.1	8
2 à 3 jours par semaine	7.7	14.3	9.1	16.7	0.0	13.6	6.5	0.0	6.0	25.0	0.0	16.7	66.7	-	66.7	10.1	8.8	9.8	19
1 jour par semaine ou moins	32.1	42.9	34.3	38.9	25.0	36.4	19.6	0.0	18.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	28.9	35.3	30.1	58
aucune consomm.	52.6	38.1	49.5	33.3	75.0	40.9	71.7	100.0	74.0	0.0	100.0	33.3	33.3	-	33.3	54.1	52.9	53.9	104
N**	78	21	99	18	4	22	46	4	50	4	2	6	3	0	3	159	34	193	193
données manquantes	1 837	801	2 638	130	53	183	804	175	979	35	36	71	295	140	435	3 802	2 126	5 928	5 928
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	31.4	35.1	32.3	28.0	33.3	28.6	33.3	38.1	34.8	60.0	33.3	50.0	16.7	-	16.7	32.2	37.0	33.3	100
4 à 6 jours par semaine	8.5	2.7	7.1	16.0	0.0	14.3	15.6	9.5	13.6	20.0	0.0	12.5	33.3	-	33.3	11.0	4.1	9.3	28
2 à 3 jours par semaine	9.3	10.8	9.7	32.0	33.3	32.1	13.3	19.0	15.2	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	14.1	12.3	13.7	41
1 jour par semaine ou moins	14.4	24.3	16.8	16.0	0.0	14.3	6.7	4.8	6.1	20.0	0.0	12.5	0.0	-	0.0	12.3	15.1	13.0	39
aucune consomm.	36.4	27.0	34.2	8.0	33.3	10.7	31.1	28.6	30.3	0.0	66.7	25.0	16.7	-	16.7	30.4	31.5	30.7	92
N**	118	37	155	25	3	28	45	21	66	5	3	8	6	0	6	227	73	300	300
données manquantes	1 797	785	2 582	123	54	177	273	59	332	34	35	69	292	140	432	3 734	2 087	5 821	5 821

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Autres stimulants*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.7	4.8	4.7	3
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	11.1	13.3	0.0	10.5	-	-	-	16.3	4.8	12.5	8
1 jour par semaine ou moins	22.2	33.3	27.8	50.0	0.0	33.3	8.3	33.3	16.7	26.7	0.0	21.1	-	-	-	20.9	23.8	21.9	14
aucune consomm.	44.4	55.6	50.0	50.0	0.0	33.3	66.7	66.7	66.7	60.0	100.0	68.4	-	-	-	58.1	66.7	60.9	39
N**	9	9	18	2	1	3	12	6	18	15	4	19	0	0	0	43	21	64	64
données manquantes	1 906	813	2 719	146	56	202	306	74	380	835	175	1 010	298	140	438	3 918	2 139	6 057	6 057
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
aucune consomm.	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
N**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
données manquantes	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	298	140	438	3 959	2 160	6 119	6 119
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	-	-	-	12.5	-	12.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	9.1	0.0	8.3	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
aucune consomm.	100.0	100.0	100.0	-	-	-	87.5	-	87.5	90.9	100.0	91.7	-	-	-	93.9	100.0	94.6	35
N**	12	2	14	0	0	0	8	0	8	11	1	12	0	0	0	33	4	37	37
données manquantes	1 903	820	2 723	148	57	205	310	80	390	839	178	1 017	298	140	438	3 928	2 156	6 084	6 084
Autres substances*																			
chaque jour	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	0.0	100.0	50.0	-	-	-	50.0	100.0	66.7	2
1 jour par semaine ou moins	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	100.0	0.0	50.0	-	-	-	50.0	0.0	33.3	1
N**	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	3
données manquantes	1 915	822	2 737	148	57	205	317	80	397	849	178	1 027	298	140	438	3 959	2 159	6 118	6 118

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	9.3	9.3	9.3	18.9	37.5	24.5	13.3	9.1	12.6	17.5	13.1	16.8	13.8	13.6	13.8	340
1 fois par mois ou moins	2.4	4.9	3.2	13.5	18.8	15.1	15.0	9.1	14.1	22.1	26.2	22.8	10.0	11.3	10.3	255
2 à 4 fois par mois	8.4	7.6	8.2	18.9	12.5	17.0	27.4	22.7	26.7	44.5	52.4	45.8	20.5	15.7	19.2	475
2 à 3 fois par semaine	16.9	20.4	18.0	21.6	12.5	18.9	23.0	40.9	25.9	12.7	6.0	11.6	16.2	18.1	16.7	413
4 fois ou plus par semaine	62.9	57.8	61.3	27.0	18.8	24.5	21.2	18.2	20.7	3.1	2.4	3.0	39.5	41.3	40.0	989
N**	1 021	450	1 471	37	16	53	113	22	135	416	84	500	1 797	675	2 472	2 472
données manquantes	894	372	1 266	111	41	152	205	58	263	434	95	529	1 947	721	2 668	2 668
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6.5	8.5	7.1	64.3	70.0	65.8	39.2	44.4	40.0	56.5	57.1	56.6	24.5	23.5	24.2	499
3 ou 4	20.8	19.1	20.2	21.4	20.0	21.1	38.1	22.2	35.7	30.7	34.9	31.4	25.1	20.6	23.9	493
5 ou 6	21.9	27.6	23.6	0.0	0.0	0.0	8.2	11.1	8.7	7.9	7.9	7.9	16.5	22.0	18.0	371
7 à 9	21.1	22.4	21.5	3.6	0.0	2.6	8.2	5.6	7.8	2.4	0.0	2.0	14.1	17.0	14.9	307
10 ou plus	29.8	22.4	27.5	10.7	10.0	10.5	6.2	16.7	7.8	2.4	0.0	2.0	19.8	16.8	19.0	392
N**	906	398	1 304	28	10	38	97	18	115	329	63	392	1 504	558	2 062	2 062
données manquantes	1 009	424	1 433	120	47	167	221	62	283	521	116	637	2 240	838	3 078	3 078
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	11.7	13.1	12.1	50.0	66.7	55.6	35.7	27.8	34.5	58.8	61.2	59.2	30.2	29.3	29.9	661
moins d'une fois par mois	9.5	10.6	9.8	26.7	20.0	24.4	21.4	27.8	22.4	27.4	26.9	27.4	16.4	13.6	15.7	346
1 fois par mois	12.9	13.1	12.9	10.0	0.0	6.7	18.4	22.2	19.0	8.7	7.5	8.5	11.4	11.0	11.3	249
1 fois par semaine	26.8	28.1	27.2	0.0	0.0	0.0	17.3	16.7	17.2	4.2	4.5	4.3	18.0	20.6	18.7	413
presque chaque jour	39.2	35.2	38.0	13.3	13.3	13.3	7.1	5.6	6.9	0.8	0.0	0.7	24.0	25.5	24.4	539
N**	918	406	1 324	30	15	45	98	18	116	379	67	446	1 607	601	2 208	2 208
données manquantes	997	416	1 413	118	42	160	220	62	282	471	112	583	2 137	795	2 932	2 932

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	39.3	41.3	40.0	19.4	31.6	23.6	20.7	29.2	22.1	29.1	26.0	28.5	34.7	40.7	36.4	820
1 jour par semaine ou moins	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	6.7	7.0	6.8	3.2	2.2	2.9	65
2 à 3 jours par semaine	0.6	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	6.7	4.0	6.2	2.5	1.1	2.1	47
4 à 6 jours par semaine	1.7	2.5	1.9	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	2.5	3.0	2.6	1.6	1.9	1.7	38
1 fois par jour	1.8	1.1	1.6	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	1.8	2.0	1.8	1.8	1.1	1.6	36
plusieurs fois par jour	54.9	52.8	54.2	75.0	68.4	72.7	75.0	70.8	74.3	53.2	58.0	54.1	56.2	53.1	55.3	1 246
N**	773	358	1 131	36	19	55	116	24	140	447	100	547	1 610	642	2 252	2 252
<i>données manquantes</i>	1 142	464	1 606	112	38	150	202	56	258	403	79	482	2 134	754	2 888	2 888
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	19.5	26.3	21.5	21.4	45.5	28.2	26.2	20.0	25.3	60.5	60.6	60.5	33.8	35.5	34.2	446
11 à 20	53.9	49.7	52.6	39.3	36.4	38.5	53.6	60.0	54.5	31.1	30.3	31.0	45.2	43.9	44.9	585
21 à 30	20.5	16.2	19.2	35.7	0.0	25.6	16.7	6.7	15.2	6.0	6.1	6.0	16.1	12.8	15.3	199
31 ou plus	6.1	7.8	6.6	3.6	18.2	7.7	3.6	13.3	5.1	2.3	3.0	2.5	4.9	7.8	5.6	73
N**	425	179	604	28	11	39	84	15	99	299	66	365	968	335	1 303	1 303
<i>données manquantes</i>	44	31	75	1	2	3	8	2	10	18	8	26	83	46	129	129

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	28.5	83.3	75.0	80.0	16.7	0.0	41.8	40.0	55.6
abstinence limitée dans le temps	25.4	0.0	5.9	20.0	0.0	100.0	12.7	12.0	11.1
consommation contrôlée	30.1	3.3	4.4	0.0	33.3	0.0	20.9	28.0	0.0
aucune limitation envisagée	0.9	0.0	1.5	0.0	16.7	0.0	5.5	8.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.7	10.0	11.8	0.0	16.7	0.0	16.4	8.0	0.0
autre	0.4	3.3	1.5	0.0	16.7	0.0	2.7	4.0	33.3
N**	558	30	68	5	6	1	110	25	9
données manquantes	1 357	118	250	56	33	11	740	65	4

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	41.2	81.8	76.5	75.0	40.0	-	47.1	42.9	60.0
abstinence limitée dans le temps	13.9	0.0	5.9	0.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
consommation contrôlée	29.0	18.2	5.9	0.0	30.0	-	17.6	14.3	20.0
aucune limitation envisagée	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	5.9	0.0	20.0
pas déterminé pour l'instant	13.1	0.0	11.8	0.0	30.0	-	29.4	14.3	0.0
autre	1.2	0.0	0.0	25.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
N**	245	11	17	4	10	0	17	7	5
données manquantes	577	46	63	22	28	1	162	40	1

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2018), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	32.4	82.9	75.3	77.8	31.3	0.0	42.5	40.6	57.1
abstinence limitée dans le temps	21.9	0.0	5.9	11.1	0.0	100.0	11.0	12.5	7.1
consommation contrôlée	29.8	7.3	4.7	0.0	31.3	0.0	20.5	25.0	7.1
aucune limitation envisagée	1.1	0.0	1.2	0.0	6.3	0.0	5.5	6.3	7.1
pas déterminé pour l'instant	14.2	7.3	11.8	0.0	25.0	0.0	18.1	9.4	0.0
autres	0.6	2.4	1.2	11.1	6.3	0.0	2.4	6.3	21.4
N**	803	41	85	9	16	1	127	32	14
données manquantes	1 934	164	313	78	61	12	902	105	5

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), hommes

Hommes

	Patients: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	25.7	30.8	38.3	25.0	60.0	100.0	16.8	28.0	44.4
états anxieux/tension nerv. importants	26.7	46.2	38.3	25.0	60.0	100.0	27.4	60.0	66.7
diffic. compréhension/mémoire	13.2	15.4	8.3	0.0	20.0	0.0	21.1	8.0	11.1
altération de l'attention ou hyperactivité	11.9	15.4	18.3	0.0	20.0	0.0	18.9	8.0	11.1
pensées obsessionnelles/actions compulsives	0.8	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	6.3	7.7	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	0.0
hallucinations	1.1	3.8	6.7	0.0	0.0	0.0	6.3	4.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.8	11.5	11.7	0.0	20.0	0.0	18.9	28.0	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	23.3	34.6	21.7	25.0	60.0	100.0	17.9	28.0	55.6
pensées suicidaires sérieuses	10.1	7.7	3.3	0.0	20.0	0.0	8.4	12.0	11.1
tentatives de suicide	2.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.9	0.0	1.7	25.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
aucun	42.6	30.8	33.3	25.0	20.0	0.0	48.4	20.0	22.2
N**	378	26	60	4	5	1	95	25	9
<i>données manquantes</i>	1 537	122	258	57	34	11	755	65	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), femmes

Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	47.4	36.4	58.3	25.0	80.0	-	50.0	42.9	20.0
états anxieux/tension nerv. importants	37.0	27.3	41.7	25.0	100.0	-	41.7	57.1	60.0
diffic. compréhension/mémoire	15.0	9.1	8.3	25.0	30.0	-	0.0	14.3	40.0
altération de l'attention ou hyperactivité	12.1	0.0	16.7	25.0	30.0	-	16.7	14.3	40.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	9.2	0.0	16.7	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
hallucinations	0.6	0.0	8.3	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.7	0.0	8.3	25.0	10.0	-	8.3	28.6	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	37.0	27.3	33.3	25.0	70.0	-	41.7	28.6	40.0
pensées suicidaires sérieuses	12.1	18.2	16.7	25.0	20.0	-	16.7	0.0	20.0
tentatives de suicide	2.9	0.0	16.7	0.0	10.0	-	8.3	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	5.2	18.2	8.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
aucun	24.9	9.1	25.0	75.0	0.0	-	25.0	28.6	40.0
N**	173	11	12	4	10	0	12	7	5
<i>données manquantes</i>	<i>649</i>	<i>46</i>	<i>68</i>	<i>22</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>167</i>	<i>40</i>	<i>1</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2018), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	32.5	32.4	41.7	25.0	73.3	100.0	20.6	31.3	35.7
états anxieux/tension nerv. importants	29.9	40.5	38.9	25.0	86.7	100.0	29.0	59.4	64.3
diffic. compréhension/mémoire	13.8	13.5	8.3	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
altération de l'attention ou hyperactivité	12.0	10.8	18.1	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	7.3	5.4	5.6	0.0	6.7	0.0	2.8	3.1	0.0
hallucinations	0.9	2.7	6.9	0.0	6.7	0.0	5.6	3.1	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.4	8.1	11.1	12.5	13.3	0.0	17.8	28.1	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	27.6	32.4	23.6	25.0	66.7	100.0	20.6	28.1	50.0
pensées suicidaires sérieuses	10.7	10.8	5.6	12.5	20.0	0.0	9.3	9.4	14.3
tentatives de suicide	2.4	0.0	5.6	0.0	6.7	0.0	1.9	3.1	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.6	5.4	2.8	12.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
aucun	37.0	24.3	31.9	50.0	6.7	0.0	45.8	21.9	28.6
N**	551	37	72	8	15	1	107	32	14
<i>données manquantes</i>	2 186	168	326	79	62	12	922	105	5

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2018)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	45.8	37.6	39.5	382
filles/fils	12.5	12.1	12.2	118
sœur/frère	6.0	4.4	4.8	46
conjoint-e/partenaire	25.9	39.4	36.4	352
autre proche/parent-e	1.9	2.4	2.3	22
collègue/ami-e	2.8	2.1	2.3	22
employeur/se, enseignant-e	4.2	0.4	1.2	12
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	0.9	1.6	1.4	14
N**	216	752	968	968
<i>données manquantes</i>	1	12	13	13

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2018)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	54.8	274
héroïne	2.4	12
méthadone	0.2	1
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.2	1
autres opioïdes	0.8	4
cocaïne en poudre	8.2	41
crack	0.6	3
autre forme de cocaïne	0.2	1
amphétamines	0.2	1
méthamphétamines	0.0	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.6	3
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.0	0
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0
LSD	0.0	0
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.0	0
cannabis	21.4	107
tabac	0.4	2
autre substance	0.2	1
jeu pathologique	3.2	16
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.0	20
troubles alimentaires	0.4	2
autre comportement de type addictif	1.6	8
N**	500	500
<i>données manquantes</i>	<i>481</i>	<i>481</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			70.1			77.0			79.6			81.2			22.7			64.8	4 028
femmes			29.9			23.0			20.4			18.8			77.3			35.2	2 186
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 028	2 186	6 214	6 214
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.9	2.2	1.8	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	57
15-19	1.4	1.4	1.4	1.7	0.0	1.3	2.8	12.3	4.7	55.9	61.1	56.9	3.2	2.8	2.8	16.0	9.5	13.7	850
20-24	3.3	1.2	2.7	3.0	1.4	2.7	12.3	13.8	12.6	15.4	11.5	14.6	3.6	3.8	3.8	7.5	4.6	6.5	400
25-29	6.9	5.2	6.4	7.8	11.6	8.7	24.9	21.5	24.2	9.2	9.6	9.3	3.6	6.9	6.2	9.0	7.7	8.5	529
30-34	9.2	6.5	8.4	14.7	23.2	16.7	22.1	23.1	22.3	5.3	5.8	5.4	3.6	6.7	6.0	9.4	8.1	8.9	553
35-39	12.1	8.8	11.1	16.0	10.1	14.7	15.8	10.8	14.8	5.4	3.4	5.0	8.6	7.7	7.9	10.7	8.0	9.7	604
40-44	11.6	10.4	11.2	20.8	17.4	20.0	7.9	3.1	6.9	4.5	2.9	4.2	7.7	12.7	11.6	9.6	10.0	9.7	604
45-49	12.8	14.9	13.4	11.7	18.8	13.3	7.5	7.7	7.5	1.0	2.9	1.3	13.1	16.8	15.9	9.1	13.4	10.6	659
50-54	15.2	15.1	15.2	12.6	13.0	12.7	4.7	3.1	4.4	1.0	0.0	0.8	17.6	16.0	16.3	10.4	13.0	11.3	701
55-59	11.7	14.5	12.6	10.0	2.9	8.3	1.2	4.6	1.9	0.1	0.0	0.1	15.8	9.8	11.2	7.8	9.9	8.5	529
60-64	8.1	10.4	8.8	1.3	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1	7.7	6.0	6.4	4.7	6.5	5.4	332
65-69	3.8	6.3	4.5	0.4	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	4.9	2.4	4.4	3.1	191
70-74	2.1	3.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.8	3.4	1.5	2.3	1.8	111
75 et plus	1.7	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	2.4	1.0	1.7	1.3	79
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	222	763	985	4 022	2 177	6 199	6 199
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	12	6	9	15	15
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.7	49.9	47.6	41.6	40.6	41.4	33.8	32.1	33.4	22.8	22.1	22.7	48.9	46.3	46.9	38.9	43.7	40.6	
écart-type	13.2	12.9	13.2	10.2	9.5	10.0	9.4	10.6	9.7	8.5	8.1	8.4	15.6	14.5	14.8	15.8	15.8	15.9	
1er quartile	36.6	40.7	37.7	34.1	32.6	33.5	27.4	24.2	27.1	17.2	17.1	17.2	39.6	37.3	37.7	25.3	31.8	27.4	
valeur médiane	47.4	50.4	48.5	41.5	41.1	41.5	31.9	30.8	31.8	18.6	18.4	18.6	51.2	47.5	48.2	38.2	45.5	40.8	
3e quartile	55.8	59.1	56.8	49.3	48.8	48.9	39.3	37.1	39.0	25.7	24.9	25.6	57.8	55.3	55.9	51.3	54.9	52.8	
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	225	768	993	4 025	2 182	6 207	
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	4	7	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																				
célibataire	44.4	32.3	40.7	69.5	44.0	61.9	69.0	83.3	71.5	95.1	94.6	95.0	22.5	25.8	25.1	61.6	43.8	55.6	1 916	
marié-e	33.0	27.4	31.3	16.9	20.0	17.9	20.4	8.3	18.2	2.4	1.6	2.2	60.7	53.5	55.1	23.6	29.6	25.6	883	
séparé-e	4.5	5.7	4.9	1.7	12.0	4.8	2.7	0.0	2.2	1.4	0.8	1.2	2.2	3.9	3.5	3.1	4.1	3.5	119	
divorcé-e	16.5	28.0	20.0	11.9	20.0	14.3	8.0	8.3	8.0	1.2	2.3	1.4	13.5	14.8	14.5	10.7	18.5	13.3	457	
veuf/veuve	1.3	6.5	2.9	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	1.6	1.5	0.8	3.8	1.8	62	
partenariat enregistré	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	7	
N**	1 171	508	1 679	59	25	84	113	24	137	592	129	721	89	310	399	2 290	1 154	3 444	3 444	
<i>données manquantes</i>	794	332	1 126	172	44	216	140	41	181	313	80	393	137	461	598	1 738	1 032	2 770	2 770	
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	14.4	14.5	14.4	0.0	3.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	15.1	13.8	8.1	10.8	9.0	343	
périphérie des grands centres	13.7	12.5	13.3	6.3	7.1	6.5	14.6	16.7	15.0	4.9	3.6	4.7	2.7	0.5	1.0	9.7	6.6	8.6	329	
villes de moyenne importance	12.8	17.0	14.0	10.9	7.1	9.8	17.9	12.5	17.0	29.7	36.4	30.9	25.7	25.5	25.6	18.9	22.3	20.1	764	
petites villes	29.9	30.6	30.1	60.9	50.0	57.6	36.6	54.2	39.5	33.8	32.1	33.5	34.5	27.2	28.9	33.2	31.9	32.8	1 247	
campagne	29.3	25.3	28.1	21.9	32.1	25.0	30.9	16.7	28.6	31.7	27.9	31.0	27.4	31.6	30.6	30.1	28.4	29.5	1 122	
N**	1 293	558	1 851	64	28	92	123	24	147	634	140	774	113	364	477	2 519	1 286	3 805	3 805	
<i>données manquantes</i>	672	282	954	167	41	208	130	41	171	271	69	340	113	407	520	1 509	900	2 409	2 409	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.1	40.8	39.6	42.0	31.3	39.2	36.5	21.1	33.1	11.6	14.8	12.1	12.1	13.0	12.8	28.9	29.0	29.0	1 131
avec famille d'origine	6.6	3.7	5.7	13.6	6.3	11.7	17.5	23.7	18.9	65.1	64.8	65.0	7.7	7.4	7.4	25.6	15.5	22.4	873
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.7	50.2	47.0	25.0	53.1	32.5	33.6	39.5	34.9	8.8	7.0	8.5	76.9	75.6	75.9	34.5	48.7	39.0	1 524
avec des amis ou d'autres personnes	2.7	1.8	2.4	4.5	3.1	4.2	2.9	2.6	2.9	2.8	2.1	2.7	2.2	1.7	1.8	2.9	2.1	2.6	103
en prison	0.1	0.0	0.1	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
institution/foyer	2.8	2.1	2.6	6.8	0.0	5.0	1.5	5.3	2.3	4.9	4.2	4.8	0.0	1.7	1.3	3.1	2.3	2.8	111
hôpital/clinique	0.3	0.2	0.3	1.1	0.0	0.8	1.5	2.6	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
autre	2.8	1.2	2.3	4.5	6.3	5.0	4.4	5.3	4.6	6.5	7.0	6.6	1.1	0.7	0.8	4.4	2.1	3.7	143
N**	1 337	568	1 905	88	32	120	137	38	175	673	142	815	91	299	390	2 646	1 257	3 903	3 903
données manquantes	628	272	900	143	37	180	116	27	143	232	67	299	135	472	607	1 382	929	2 311	2 311
Situation de domicile*																			
logement stable	94.7	95.9	95.0	81.6	83.9	82.2	93.8	86.8	92.2	90.4	89.4	90.2	97.0	95.5	95.9	93.2	94.6	93.6	3 787
logement instable/SDF	2.9	3.0	2.9	8.0	12.9	9.3	2.3	5.3	3.0	4.0	5.6	4.3	3.0	3.0	3.0	3.5	3.3	3.4	138
en prison	0.1	0.0	0.1	3.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	9
institution/foyer/hôpital/autre	2.3	1.2	2.0	6.9	3.2	5.9	3.9	7.9	4.8	5.2	4.9	5.1	0.0	1.5	1.1	3.0	2.1	2.7	110
N**	1 393	604	1 997	87	31	118	129	38	167	678	142	820	100	336	436	2 711	1 333	4 044	4 044
données manquantes	572	236	808	144	38	182	124	27	151	227	67	294	126	435	561	1 317	853	2 170	2 170
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	41.1	42.1	41.4	59.1	36.8	52.4	43.4	47.1	44.0	76.1	63.6	73.9	18.2	27.1	25.1	50.0	40.8	47.0	1 272
relations temporaires	1.9	4.3	2.6	0.0	5.3	1.6	6.0	11.8	7.0	2.9	5.7	3.4	2.6	0.8	1.2	2.3	3.8	2.8	75
partenaire fixe, vivant séparé	10.5	8.9	10.1	9.1	5.3	7.9	10.8	11.8	11.0	12.2	20.5	13.7	5.2	5.7	5.6	10.6	9.8	10.3	279
partenaire fixe, ménage commun	46.5	44.6	46.0	31.8	52.6	38.1	39.8	29.4	38.0	8.8	10.2	9.0	74.0	66.4	68.1	37.1	45.7	40.0	1 083
N**	970	392	1 362	44	19	63	83	17	100	410	88	498	77	262	339	1 807	902	2 709	2 709
données manquantes	995	448	1 443	187	50	237	170	48	218	495	121	616	149	509	658	2 221	1 284	3 505	3 505

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

Source de revenu principale*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
salairé	61.3	45.9	56.6	35.4	35.0	35.3	67.0	26.3	60.0	27.7	17.4	25.8	72.4	69.0	69.8	51.0	48.1	50.0	1 624
économies, épargne	1.8	1.1	1.6	2.1	5.0	2.9	2.2	0.0	1.8	0.2	0.0	0.1	1.0	0.3	0.5	1.4	0.8	1.2	38
rente (AVS, AI ou autre)	16.4	25.8	19.2	16.7	15.0	16.2	5.5	26.3	9.1	2.4	5.8	3.0	16.2	11.3	12.5	11.8	17.9	13.9	452
aide sociale	11.7	14.4	12.5	25.0	30.0	26.5	18.7	10.5	17.3	9.0	11.6	9.5	3.8	1.8	2.3	11.0	10.0	10.7	347
assurance-chômage	3.1	2.1	2.8	12.5	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.9	0.7	2.5	1.4	2.1	69
soutien du/de la partenaire	1.5	7.2	3.2	0.0	10.0	2.9	0.0	10.5	1.8	0.5	0.8	0.6	1.0	10.7	8.4	1.2	7.7	3.4	111
soutien parents/proches/amis	2.0	1.9	2.0	4.2	5.0	4.4	3.3	15.8	5.5	57.9	62.8	58.8	5.7	5.8	5.8	19.4	12.9	17.2	557
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
prostitution	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
assurance indemnités journalières	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	8
autre	1.8	1.3	1.6	2.1	0.0	1.5	2.2	5.3	2.7	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	34
N**	1 082	473	1 555	48	20	68	91	19	110	553	121	674	105	326	431	2 136	1 111	3 247	3 247
données manquantes	883	367	1 250	183	49	232	162	46	208	352	88	440	121	445	566	1 892	1 075	2 967	2 967
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	57.9	34.8	51.1	28.6	12.5	24.6	59.8	31.6	54.7	17.8	7.3	16.0	67.4	48.4	53.0	45.0	34.3	41.5	1 212
activité à temps partiel	6.4	17.4	9.6	6.1	31.3	12.3	8.0	0.0	6.6	2.5	4.6	2.8	6.7	27.2	22.3	5.6	18.0	9.7	284
jobs occasionnels	2.1	1.0	1.8	6.1	0.0	4.6	2.3	0.0	1.9	1.3	0.9	1.3	0.0	0.7	0.5	1.8	0.8	1.5	43.0
en formation	2.5	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	4.6	15.8	6.6	67.4	74.3	68.6	9.0	8.8	8.9	23.4	16.7	21.2	618
sans travail, en quête d'emploi	7.4	5.2	6.8	26.5	6.3	21.5	2.3	10.5	3.8	4.4	0.9	3.8	0.0	1.4	1.1	6.1	3.6	5.3	155
sans travail, sans recherche d'emploi	4.0	6.7	4.8	10.2	18.8	12.3	6.9	5.3	6.6	1.7	3.7	2.0	1.1	0.4	0.5	3.4	4.3	3.7	108
rentier/rentière	9.6	18.2	12.1	2.0	0.0	1.5	0.0	5.3	0.9	0.0	0.0	0.0	13.5	10.6	11.3	6.1	11.8	8.0	233
incapacité de travail	4.0	7.5	5.0	10.2	18.8	12.3	6.9	15.8	8.5	0.9	2.8	1.3	0.0	0.7	0.5	3.0	5.1	3.7	107
femme/homme au foyer	0.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.1	1.9	0.7	19.0
autre	6.0	4.0	5.4	10.2	12.5	10.8	9.2	5.3	8.5	4.0	5.5	4.2	2.2	0.4	0.8	5.6	3.4	4.9	142
N**	969	402	1 371	49	16	65	87	19	106	528	109	637	89	283	372	1 957	964	2 921	2 921
données manquantes	996	438	1 434	182	53	235	166	46	212	377	100	477	137	488	625	2 071	1 222	3 293	3 293

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	23.6	41.2	28.8	43.3	33.3	41.0	18.0	60.0	25.0	13.8	18.5	14.5	0.0	22.2	19.0	21.4	39.1	26.3	327
apprenti-e, stagiaire	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	5.0	35.2	22.2	33.1	0.0	5.6	4.8	8.6	5.0	7.6	95
manœuvre, aide	1.5	3.3	2.1	13.3	11.1	12.8	6.0	0.0	5.0	3.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.6	32
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.7	3.3	5.7	3.3	0.0	2.6	4.0	0.0	3.3	4.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	6.1	2.6	5.1	64
ouvrier/ère formé-e (CFC)	13.9	6.2	11.6	20.0	0.0	15.4	30.0	0.0	25.0	16.6	3.7	14.5	0.0	0.0	0.0	15.5	5.2	12.7	158
contremaître-sse	2.1	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.3	1.7	21
employé-e non qualifié-e	19.0	21.0	19.6	10.0	33.3	15.4	6.0	0.0	5.0	4.1	7.4	4.7	33.3	33.3	33.3	14.3	18.7	15.5	193
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.5	7.0	10.9	0.0	0.0	0.0	16.0	10.0	15.0	4.1	3.7	4.1	0.0	27.8	23.8	11.1	8.7	10.4	130
employé-e, cadre supérieur	5.1	2.5	4.4	0.0	11.1	2.6	6.0	10.0	6.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	4.3	2.6	3.9	48
indépendant-e	11.0	9.1	10.4	6.7	11.1	7.7	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	8.2	7.0	7.9	98
écolier/ère, étudiant-e	0.9	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	13.1	44.4	18.0	0.0	11.1	9.5	4.1	6.4	4.7	59
autre statut	1.7	2.5	1.9	3.3	0.0	2.6	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.6	20
N**	584	243	827	30	9	39	50	10	60	145	27	172	3	18	21	902	343	1 245	1 245
données manquantes	1 381	597	1 978	201	60	261	203	55	258	760	182	942	223	753	976	3 126	1 843	4 969	4 969

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	49.8	46.9	49.0	25.5	19.1	24.1	34.0	27.7	32.7	67.7	56.5	65.6	73.9	69.0	70.1	52.8	55.1	53.6	3 319
fin régulière avec transfert	8.1	9.5	8.5	14.7	13.2	14.4	7.5	6.2	7.2	4.4	9.1	5.3	1.8	3.2	2.9	6.9	7.3	7.0	436
changement de domicile	2.0	2.2	2.1	3.5	2.9	3.3	2.8	4.6	3.1	0.8	1.9	1.0	1.8	0.3	0.6	1.8	1.6	1.7	107
hospitalisation	1.0	1.6	1.1	0.9	0.0	0.7	0.8	1.5	0.9	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	45
détention	0.2	0.0	0.1	1.3	0.0	1.0	2.4	0.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	15
perte de contact	28.8	29.7	29.1	22.1	27.9	23.4	40.7	40.0	40.6	18.6	23.0	19.4	14.2	21.3	19.7	26.3	25.6	26.0	1 613
rupture explicite	7.4	7.2	7.3	5.6	8.8	6.4	7.5	7.7	7.5	4.2	5.7	4.5	4.0	3.2	3.4	6.4	5.7	6.2	383
décès	1.1	1.9	1.3	6.1	1.5	5.0	0.0	3.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	1.0	1.1	1.0	64
autre raison	1.6	1.1	1.5	20.3	26.5	21.7	4.3	9.2	5.3	3.5	2.9	3.4	4.4	2.6	3.0	3.7	2.9	3.4	212
N**	1 955	835	2 790	231	68	299	253	65	318	902	209	1 111	226	770	996	4 015	2 179	6 194	6 194
données manquantes	10	5	15	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	13	7	20	20

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

Destination des transferts***	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
traitement résidentiel	45.6	35.8	42.3	9.5	20.0	11.5	36.4	66.7	42.9	24.0	12.5	21.2	50.0	10.0	16.7	36.0	29.7	33.8	90
structure/clinique de jour	1.9	5.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.3	6
prise en charge ambulatoire	36.9	47.2	40.4	52.4	0.0	42.3	54.5	0.0	42.9	52.0	50.0	51.5	0.0	50.0	41.7	42.9	45.1	43.6	116
appartement protégé	1.0	0.0	0.6	14.3	40.0	19.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	10.0	8.3	2.9	3.3	3.0	8
autre institution spécialisée	14.6	11.3	13.5	23.8	40.0	26.9	9.1	33.3	14.3	16.0	37.5	21.2	50.0	30.0	33.3	16.6	18.7	17.3	46
N**	103	53	156	21	5	26	11	3	14	25	8	33	2	10	12	175	91	266	266
données manquantes	55	26	81	13	4	17	8	1	9	15	11	26	2	15	17	103	67	170	170

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

Cause de décès****	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties			N
suicide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.7	1
accident	7.1	0.0	4.5	28.6	0.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.3	10.8	4
maladie	78.6	87.5	81.8	28.6	100.0	37.5	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	60.0	83.3	67.6	25
surdose ou intoxication aiguë	14.3	0.0	9.1	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	10.8	4
autre cause de décès	0.0	12.5	4.5	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.3	8.1	3
N**	14	8	22	7	1	8	0	2	2	1	0	1	0	0	0	25	12	37	37
données manquantes	7	8	15	7	0	7	0	0	0	1	1	2	0	2	2	16	11	27	27

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2018)

Durée de la prise en charge* (%)	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
1 semaine ou moins	6.9	7.1	7.0	3.5	5.8	4.0	2.0	4.6	2.5	4.3	2.9	4.0	11.9	11.3	11.4	5.9	7.7	6.6	407
> 1 semaine à 1 mois	3.4	3.9	3.6	2.2	1.4	2.0	3.2	6.2	3.8	12.9	7.2	11.8	3.1	3.1	3.1	5.5	3.7	4.9	304
> 1 à 2 mois	4.6	4.4	4.6	2.2	5.8	3.0	3.6	7.7	4.4	9.1	4.3	8.2	2.7	7.3	6.2	5.4	5.6	5.5	341
>2 à 3 mois	4.3	3.5	4.1	2.6	4.3	3.0	4.3	7.7	5.0	4.5	5.3	4.7	6.6	5.8	6.0	4.4	4.5	4.5	277
>3 à 6 mois	10.7	11.9	11.1	6.5	7.2	6.7	12.6	12.3	12.6	14.8	14.4	14.7	9.7	13.7	12.8	11.7	12.7	12.0	748
>6 mois à 1 an	25.0	24.2	24.8	18.6	14.5	17.7	40.3	24.6	37.1	29.4	42.1	31.8	35.0	32.4	33.0	27.9	29.7	28.5	1 772
>1 à 2 ans	23.4	21.5	22.8	16.9	13.0	16.0	22.5	20.0	22.0	16.5	15.3	16.2	22.1	17.8	18.8	21.1	19.7	20.6	1 281
>2 à 3 ans	9.8	8.5	9.4	13.0	18.8	14.3	6.3	9.2	6.9	5.3	5.3	5.3	4.0	5.4	5.1	8.1	7.4	7.8	486
>3 à 5 ans	6.5	8.1	7.0	20.8	13.0	19.0	3.2	4.6	3.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	2.4	5.7	5.1	5.5	340
>5 à 10 ans	4.0	5.4	4.4	9.5	11.6	10.0	1.6	1.5	1.6	0.6	1.0	0.6	1.8	0.6	0.9	3.2	3.0	3.1	192
plus de 10 ans	1.3	1.5	1.4	4.3	4.3	4.3	0.4	1.5	0.6	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1	0.2	1.1	0.8	1.0	61
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	6 209
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5
Durée (en semaines)																			
moyenne	77.2	83.4	79.1	147.4	157.3	149.7	55.5	60.0	56.4	41.2	45.2	42.0	48.2	43.1	44.3	68.7	64.3	67.1	
écart-type	105.4	113.8	108.0	183.8	223.9	193.4	68.1	98.3	75.1	60.0	51.9	58.6	64.3	52.5	55.4	103.7	94.7	100.6	
1er quartile	18.3	18.3	18.3	32.3	25.6	30.2	24.0	12.0	21.1	7.7	17.0	9.0	13.0	11.0	11.1	15.3	15.1	15.3	
valeur médiane	45.6	45.9	45.6	94.9	100.6	96.7	38.4	32.3	38.0	27.9	31.4	28.9	32.6	30.1	30.9	39.0	36.9	38.4	
3e quartile	91.9	98.7	93.1	173.6	164.3	173.4	68.0	59.1	68.0	52.0	51.1	51.9	59.1	54.0	55.1	79.1	75.0	77.9	
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution pendant la prise en charge*																
non	99.2	99.2	99.2	70.4	65.2	68.8	98.0	95.2	97.5	99.7	100.0	99.7	98.5	98.4	98.5	2 872
oui	0.8	0.8	0.8	29.6	34.8	31.2	2.0	4.8	2.5	0.3	0.0	0.3	1.5	1.6	1.5	45
N**	1 122	485	1 607	54	23	77	101	21	122	575	128	703	2 110	807	2 917	2 917
données manquantes	843	355	1 198	177	46	223	152	44	196	330	81	411	1 692	605	2 297	2 297
Type de substitution***																
héroïne	0.0	50.0	15.4	6.3	0.0	4.2	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.3	15.4	8.9	4
méthadone	55.6	50.0	53.8	68.8	75.0	70.8	50.0	100.0	66.7	100.0	0.0	100.0	65.6	69.2	66.7	30
autres opioïdes	33.3	0.0	23.1	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	15.4	22.2	10
autres substances	11.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.2	1
N**	9	4	13	16	8	24	2	1	3	2	0	2	32	13	45	45
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substitution après la prise en charge*																
non	99.5	99.6	99.6	60.4	65.0	61.8	98.9	95.0	98.3	99.8	99.2	99.7	98.6	98.6	98.6	2 807
oui	0.5	0.4	0.4	39.6	35.0	38.2	1.1	5.0	1.7	0.2	0.8	0.3	1.4	1.4	1.4	40
N**	1 103	475	1 578	48	20	68	95	20	115	556	127	683	2 056	791	2 847	2 847
données manquantes	862	365	1 227	183	49	232	158	45	203	349	82	431	1 746	621	2 367	2 367
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	20.0	50.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.1	7.5	3
traitement de substitution	80.0	50.0	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.1	90.9	92.5	37
N**	5	2	7	19	7	26	1	1	2	1	1	2	29	11	40	40
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	90.8	88.0	90.0	94.9	92.9	94.3	94.6	91.7	94.1	97.8	97.1	97.7	92.6	90.0	92.0	1 325
oui	9.2	12.0	10.0	5.1	7.1	5.7	5.4	8.3	5.9	2.2	2.9	2.3	7.4	10.0	8.0	116
N**	685	276	961	39	14	53	56	12	68	184	35	219	1 061	380	1 441	1 441
<i>données manquantes</i>	1 280	564	1 844	192	55	247	197	53	250	721	174	895	2 741	1 032	3 773	3 773
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	6.7	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	3.7	4
appartement protégé extérieur	5.0	0.0	3.3	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	8.2	0.0	5.6	6
service de postcure extérieur	15.0	16.7	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	12.3	17.1	13.9	15
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	14.3	14.8	16
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	4.1	0.0	2.8	3
autre centre de consultation	10.0	33.3	17.8	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	11.0	34.3	18.5	20
groupe d'entraide	6.7	10.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	8.6	7.4	8
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	3.3	1.1	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	1.9	2
autre	45.0	23.3	37.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	66.7	25.0	100.0	40.0	42.5	25.7	37.0	40
N**	60	30	90	2	1	3	2	1	3	4	1	5	73	35	108	108
<i>données manquantes</i>	3	3	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3	8	8

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2018)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
alcool	72.0	77.0	73.5	16.5	12.9	15.7	15.6	11.1	14.7	9.0	7.2	8.7	42.8	49.9	44.7	1 609
héroïne	0.7	0.3	0.6	53.4	58.1	54.5	3.2	2.8	3.2	0.4	1.3	0.6	2.8	2.5	2.7	98
méthadone	0.1	0.0	0.1	16.5	12.9	15.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	25
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres opioïdes	0.0	0.2	0.1	2.9	9.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	9
cocaïne en poudre	3.4	2.4	3.1	12.6	6.5	11.2	68.2	63.9	67.4	1.9	2.0	1.9	7.1	4.7	6.4	232
crack	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.6	2.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amphétamines	0.4	0.2	0.3	1.0	0.0	0.7	3.9	0.0	3.2	0.4	0.7	0.5	1.0	0.5	0.9	32
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.7	0.1	0.3	0.2	0.3	9
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.6	0.2	0.5	1.9	0.0	1.5	1.9	2.8	2.1	0.9	2.0	1.1	0.9	0.8	0.9	31
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres stimulants	0.0	0.2	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	5
barbituriques	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
benzodiazépines	1.1	1.4	1.2	8.7	6.5	8.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.4	1.3	2.4	1.6	56
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.5	0.3	0.0	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
LSD	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.6	0.4	0.4	0.4	15
kétamine	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
autres hallucinogènes	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2	8
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
cannabis	5.6	4.5	5.3	11.7	16.1	12.7	14.9	11.1	14.2	62.8	69.7	64.1	21.3	15.6	19.8	712
tabac	11.1	9.6	10.7	10.7	12.9	11.2	9.1	13.9	10.0	8.1	10.5	8.6	10.7	11.6	11.0	395
autre substance	0.3	0.0	0.2	1.0	3.2	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
jeu pathologique	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	2.8	1.0	2.3	83
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.3	0.9	33
troubles alimentaires	0.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	5.3	1.8	64
autre comportement de type addictif	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	1.9	1.8	1.8	66
aucun	25.5	20.3	23.9	18.4	12.9	17.2	19.5	19.4	19.5	32.7	27.6	31.8	26.5	21.5	25.2	907
N**	1 369	582	1 951	103	31	134	154	36	190	675	152	827	2 633	966	3 599	3 599
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	57.4	44.8	54.0	44.4	0.0	33.3	55.6	50.0	54.5	75.0	54.5	72.8	60.6	45.9	56.9	467
une fois	8.1	9.7	8.5	22.2	0.0	16.7	7.4	33.3	12.1	6.5	9.1	6.8	8.1	10.2	8.6	71
deux fois	4.7	12.1	6.7	11.1	0.0	8.3	7.4	0.0	6.1	6.5	18.2	7.8	5.4	11.2	6.8	56
trois ou quatre fois	13.2	17.6	14.4	11.1	0.0	8.3	14.8	0.0	12.1	3.3	0.0	2.9	11.4	15.1	12.3	101
cinq fois ou plus	16.6	15.8	16.4	11.1	100.0	33.3	14.8	16.7	15.2	8.7	18.2	9.7	14.6	17.6	15.3	126
N**	446	165	611	9	3	12	27	6	33	92	11	103	616	205	821	821
<i>données manquantes</i>	1 519	675	2 194	222	66	288	226	59	285	813	198	1 011	3 186	1 207	4 393	4 393
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.9	96.5	98.1	25.0	0.0	14.3	27.3	66.7	35.7	39.1	0.0	33.3	86.1	87.3	86.4	287
opioïdes	1.1	1.2	1.1	100.0	33.3	71.4	0.0	33.3	7.1	0.0	25.0	3.7	3.0	3.9	3.3	11
cocaïne et dérivés	8.9	2.4	6.8	0.0	33.3	14.3	90.9	66.7	85.7	4.3	0.0	3.7	11.7	4.9	9.6	32
autres stimulants	3.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	18.2	33.3	21.4	4.3	25.0	7.4	4.8	2.0	3.9	13
somnifères/tranquillisants	2.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	2.2	2.9	2.4	8
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	0.0	0.3	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	6.1	3.5	5.3	50.0	66.7	57.1	27.3	33.3	28.6	87.0	75.0	85.2	16.1	8.8	13.9	46
tabac	1.1	2.4	1.5	0.0	33.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	1.5	5
autres substances	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
troubles alimentaires	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	1.0	0.6	2
N**	180	85	265	4	3	7	11	3	14	23	4	27	230	102	332	332
<i>données manquantes</i>	10	6	16	1	0	1	1	0	1	0	1	1	13	9	22	22

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2018)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	44.8	50.0	46.3	15.4	33.3	21.1	21.7	0.0	18.5	27.2	0.0	23.1	39.1	42.8	40.1	325
1 jour par semaine ou moins	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	1.8	0.9	7
2 à 3 jours par semaine	0.7	1.8	1.0	7.7	0.0	5.3	4.3	0.0	3.7	1.1	0.0	0.9	1.2	2.3	1.5	12
4 à 6 jours par semaine	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.7	0.5	0.6	5
une fois par jour	1.9	2.4	2.1	7.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	2.4	2.3	2.3	19
plusieurs fois par jour	51.6	43.4	49.2	69.2	66.7	68.4	73.9	100.0	77.8	66.3	100.0	71.3	56.1	50.5	54.6	442
N**	411	166	577	13	6	19	23	4	27	92	16	108	588	222	810	810
<i>données manquantes</i>	1 554	674	2 228	218	63	281	230	61	291	813	193	1 006	3 214	1 190	4 404	4 404
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	47.4	50.8	48.2	66.7	50.0	63.6	60.0	50.0	57.9	71.2	78.6	72.7	54.4	57.3	55.1	221
11 à 20 cigarettes par jour	38.8	44.1	40.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	36.8	23.1	14.3	21.2	34.1	37.5	34.9	140
21 à 30 cigarettes par jour	10.7	1.7	8.6	33.3	50.0	36.4	6.7	0.0	5.3	1.9	7.1	3.0	8.5	3.1	7.2	29
31 cigarettes par jour ou plus	3.1	3.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.0	3.0	2.1	2.7	11
N**	196	59	255	9	2	11	15	4	19	52	14	66	305	96	401	401
<i>données manquantes</i>	31	24	55	2	2	4	3	0	3	15	2	17	53	31	84	84

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2018)


	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	32.3	38.8	34.1	92.3	50.0	76.2	71.4	66.7	70.7	42.0	26.3	39.9	37.8	38.4	37.9	384
abstinence limitée dans le temps	17.7	11.5	16.0	0.0	0.0	0.0	8.6	16.7	9.8	5.9	5.3	5.8	14.4	10.1	13.2	134
consommation contrôlée	36.5	35.9	36.3	0.0	25.0	9.5	8.6	0.0	7.3	26.9	26.3	26.8	32.7	35.1	33.3	337
aucune limitation envisagée	2.7	1.0	2.2	0.0	12.5	4.8	0.0	0.0	0.0	7.6	5.3	7.2	3.2	1.9	2.9	29
pas déterminé pour l'instant	9.4	12.4	10.2	7.7	12.5	9.5	11.4	0.0	9.8	16.8	36.8	19.6	10.3	13.4	11.2	113
autre	1.5	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.4	0.8	0.0	0.7	1.6	1.1	1.5	15
N**	524	209	733	13	8	21	35	6	41	119	19	138	744	268	1 012	1 012
<i>données manquantes</i>	1 441	631	2 072	218	61	279	218	59	277	786	190	976	3 058	1 144	4 202	4 202
Pronostic*																
très bon pronostic	20.3	15.8	19.0	21.4	25.0	22.7	27.3	0.0	23.7	31.3	6.7	28.5	22.8	14.8	20.7	204
bon pronostic	42.9	49.8	44.9	64.3	37.5	54.5	39.4	60.0	42.1	44.3	66.7	46.9	43.6	52.5	45.9	453
plutôt mauvais pronostic	25.4	23.9	25.0	14.3	37.5	22.7	18.2	40.0	21.1	21.7	26.7	22.3	24.2	24.0	24.1	238
mauvais pronostic	11.4	10.5	11.2	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	13.2	2.6	0.0	2.3	9.4	8.7	9.2	91
N**	508	209	717	14	8	22	33	5	38	115	15	130	723	263	986	986
<i>données manquantes</i>	1 457	631	2 088	217	61	278	220	60	280	790	194	984	3 079	1 149	4 228	4 228

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.




* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu


G1 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2018






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G2 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2018






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G3 Problème principal à l'admission cocaïne et dérivés: évolution 2013-2018






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G4 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2018






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G5 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2018






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




G6 Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2018



Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



G7 Problème principal à l'admission jeu pathologique: évolution 2013-2018



Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante

