

# act-info - SAMBAD

## Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

### Résultats du monitoring de la clientèle 2019



Etienne Maffli

Lausanne, février 2021

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring *act-info*. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau *act-info*. Un grand merci également à Edith Bacher et Diane Jaccard pour la conception graphique de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

---

**Compléments d'information:** Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
e-mail [emaffli@addictionsuisse.ch](mailto:emaffli@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Etienne Maffli  
Addiction Suisse

**Diffusion:** Recherche, Addiction Suisse, Av. Louis-Ruchonnet 14,  
1003 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,  
e-mail [cgmell@addictionsuisse.ch](mailto:cgmell@addictionsuisse.ch)

**Langue du texte original:** allemand

**Graphisme/mise en page:** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse, Lausanne 2021

**Citation recommandée:** Maffli, E. (2021). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats du monitoring de la clientèle 2019. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	6
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7
Explications concernant les tableaux.....	8

## ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2019)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2019)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2019)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2019)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2019)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2019)

## SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2019)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2019)

## TRENDS

- G1 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2019
- G2 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2019
- G3 Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2019
- G4 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2019
- G5 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2019
- G6 Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2019
- G7 Problème principal à l'admission jeu pathologique: évolution 2013-2019

## **act-info - addiction care and therapy information**

Le Réseau de monitoring (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés dans l'ensemble des domaines de traitement est effectuée dès 2018 par Addiction Suisse.

### **act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)**

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits en 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. Toutes les institutions n'ont cependant pas pu implémenter les questionnaires révisés. En outre, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire de façon à répondre aux différents besoins. Ces particularités expliquent en partie pourquoi il y a un nombre relativement élevé de valeurs manquantes pour certaines questions.

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2019, 64 institutions du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs. Les Institutions qui ne participent pas au monitoring *act-info* ont été interrogées dans le cadre d'une vaste enquête ayant pour objectif une estimation de l'ensemble de la demande en matière de trai-

tement. Les résultats de cette enquête figurent dans le rapport global *act-info* (rapport annuel 2019) publié également en début 2021.

## Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects sociodémographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Celui-ci est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au-dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

La dernière partie présente les tendances 2013-2019 sous forme de graphiques. Il s'agit notamment des aspects de la demande de traitement, de la répartition par sexe et de la distribution selon l'âge pour les problèmes principaux les plus fréquents (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotique/sédatifs et jeu pathologique).



## T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sexe*</b>																			
hommes	69.3			70.5			86.7			80.1			23.8			63.9		4 120	
femmes	30.7			29.5			13.3			19.9			76.2			36.1		2 332	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>857</b>	<b>2 788</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>257</b>	<b>825</b>	<b>1 082</b>	<b>4 120</b>	<b>2 332</b>	<b>6 452</b>	<b>6 452</b>
<b>Age (en années)*</b>																			
jusqu'à 14	0.2	0.0	0.1	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	4.3	9.6	5.4	2.4	0.5	0.9	2.2	1.8	2.1	133
15-19	1.9	1.6	1.8	2.8	3.4	3.0	2.7	8.9	3.6	62.0	57.8	61.2	3.2	2.1	2.3	17.7	10.0	15.0	962
20-24	3.3	2.0	2.9	5.7	8.5	6.5	13.7	19.6	14.5	12.3	14.8	12.8	5.6	4.4	4.7	7.4	5.8	6.8	440
25-29	7.5	4.3	6.5	10.6	16.9	12.5	22.0	25.0	22.4	7.4	4.3	6.8	6.0	6.3	6.2	9.2	6.7	8.3	536
30-34	10.4	7.5	9.5	14.2	13.6	14.0	19.2	16.1	18.8	5.0	5.7	5.1	5.2	8.5	7.7	9.8	8.3	9.3	598
35-39	12.7	11.1	12.2	12.8	13.6	13.0	18.7	14.3	18.1	3.9	2.6	3.6	7.2	11.2	10.2	10.4	10.2	10.3	665
40-44	12.6	11.7	12.3	17.7	15.3	17.0	11.0	5.4	10.2	2.3	2.2	2.2	8.4	12.8	11.7	9.6	10.1	9.8	628
45-49	13.2	13.1	13.2	14.2	8.5	12.5	6.0	3.6	5.7	1.6	1.7	1.6	14.0	17.1	16.3	9.3	12.1	10.3	662
50-54	13.0	16.1	14.0	14.9	15.3	15.0	4.9	5.4	5.0	0.5	0.9	0.6	17.2	15.2	15.7	8.7	12.8	10.2	655
55-59	10.9	13.7	11.7	4.3	0.0	3.0	1.4	1.8	1.4	0.1	0.0	0.1	12.0	9.4	10.0	6.6	9.1	7.5	482
60-64	6.3	7.1	6.6	2.1	1.7	2.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	8.4	5.9	6.5	4.0	5.4	4.5	289
65-69	4.9	5.7	5.2	0.7	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	4.8	3.2	3.6	2.8	3.9	3.2	207
70-74	2.1	4.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.7	1.3	2.5	1.7	109
75 et plus	1.1	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	2.3	0.9	1.3	1.0	67
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>856</b>	<b>2 787</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>250</b>	<b>815</b>	<b>1 065</b>	<b>4 112</b>	<b>2 321</b>	<b>6 433</b>	<b>6 433</b>
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	17	8	11	19	19
<b>Age (valeurs centrales)</b>																			
moyenne	45.6	48.9	46.6	40.2	37.7	39.5	33.9	31.3	33.5	21.5	20.8	21.4	46.1	45.4	45.6	37.4	42.4	39.2	
écart-type	13.2	13.1	13.3	10.9	11.6	11.1	9.0	9.8	9.2	8.4	8.2	8.4	16.4	13.4	14.1	15.9	15.9	16.1	
1er quartile	35.8	39.6	36.9	31.3	29.0	30.6	27.2	24.2	26.8	16.6	16.0	16.4	35.7	36.4	36.1	23.3	30.4	25.7	
valeur médiane	45.8	49.5	46.9	41.1	39.4	40.3	32.6	29.4	32.3	17.8	17.5	17.8	49.3	46.2	46.8	36.6	43.7	39.1	
3e quartile	55.2	57.5	55.9	49.4	45.9	48.5	39.47	35.9	39.3	23.2	21.8	22.8	57.6	53.9	54.5	49.6	53.9	51.3	
<b>N**</b>	<b>1 931</b>	<b>856</b>	<b>2 787</b>	<b>141</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>420</b>	<b>927</b>	<b>230</b>	<b>1 157</b>	<b>256</b>	<b>818</b>	<b>1 074</b>	<b>4 118</b>	<b>2 324</b>	<b>6 442</b>	
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	2	8	10	

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Etat civil*</b>																			
célibataire	45.8	32.4	41.7	68.5	54.0	64.4	74.6	77.8	75.1	89.6	88.1	89.3	28.4	27.9	28.0	60.8	41.4	53.8	3 220
marié-e	32.2	30.7	31.7	14.2	14.0	14.1	14.4	7.4	13.5	4.3	3.8	4.2	52.2	50.7	51.0	23.5	32.6	26.8	1 600
séparé-e	3.1	4.3	3.5	3.1	2.0	2.8	3.5	1.9	3.2	1.4	2.4	1.6	2.2	4.5	4.0	2.6	4.1	3.1	187
divorcé-e	17.0	27.0	20.0	11.0	30.0	16.4	6.6	13.0	7.5	2.3	3.8	2.6	14.7	13.9	14.1	11.1	18.0	13.6	814
veuf/veuve	1.5	5.1	2.6	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	2.1	1.7	2.1	2.0	1.6	3.1	2.1	127
partenariat enregistré	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.5	0.3	0.9	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	33
<b>N**</b>	<b>1 816</b>	<b>808</b>	<b>2 624</b>	<b>127</b>	<b>50</b>	<b>177</b>	<b>347</b>	<b>54</b>	<b>401</b>	<b>863</b>	<b>210</b>	<b>1 073</b>	<b>232</b>	<b>750</b>	<b>982</b>	<b>3 840</b>	<b>2 141</b>	<b>5 981</b>	<b>5 981</b>
données manquantes	115	49	164	14	9	23	17	2	19	64	20	84	25	75	100	280	191	471	471
<b>Nationalité*</b>																			
Suisse/FL	80.1	83.7	81.2	67.4	76.8	70.2	73.2	78.6	74.0	80.4	86.3	81.6	84.4	86.9	86.3	79.3	85.6	81.6	4 916
UE	13.1	11.5	12.6	24.2	16.1	21.8	16.6	17.9	16.8	10.8	7.3	10.1	13.9	9.4	10.4	13.3	9.9	12.0	726
autre	6.7	4.8	6.1	8.3	7.1	8.0	10.1	3.6	9.2	8.8	6.4	8.3	1.7	3.8	3.3	7.4	4.5	6.4	384
<b>N**</b>	<b>1 767</b>	<b>798</b>	<b>2 565</b>	<b>132</b>	<b>56</b>	<b>188</b>	<b>355</b>	<b>56</b>	<b>411</b>	<b>873</b>	<b>219</b>	<b>1 092</b>	<b>237</b>	<b>770</b>	<b>1 007</b>	<b>3 829</b>	<b>2 197</b>	<b>6 026</b>	<b>6 026</b>
données manquantes	164	59	223	9	3	12	9	0	9	54	11	65	20	55	75	291	135	426	426

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Degré d'urbanisation*</b>																			
grands centres urbains	10.4	8.1	9.7	3.0	0.0	2.1	3.4	0.0	2.9	1.2	1.3	1.2	14.4	10.3	11.3	6.6	6.7	6.6	418
périphérie des grands centres	20.8	21.4	21.0	12.6	12.1	12.4	20.7	10.9	19.4	12.7	8.8	11.9	17.7	16.4	16.7	17.3	16.2	16.9	1 067
villes de moyenne importance	12.6	14.7	13.3	14.1	12.1	13.5	19.0	14.5	18.4	22.4	19.0	21.8	15.6	23.0	21.3	16.4	18.9	17.3	1 090
petites villes	29.3	29.5	29.4	46.7	41.4	45.1	36.6	50.9	38.5	34.5	33.6	34.4	26.3	25.8	25.9	32.2	30.6	31.6	1 994
campagne	26.9	26.3	26.7	23.7	34.5	26.9	20.4	23.6	20.8	29.2	37.2	30.7	25.9	24.5	24.9	27.5	27.7	27.6	1 740
<b>N**</b>	<b>1 902</b>	<b>841</b>	<b>2 743</b>	<b>135</b>	<b>58</b>	<b>193</b>	<b>358</b>	<b>55</b>	<b>413</b>	<b>909</b>	<b>226</b>	<b>1 135</b>	<b>243</b>	<b>787</b>	<b>1 030</b>	<b>4 039</b>	<b>2 270</b>	<b>6 309</b>	<b>6 309</b>
données manquantes	29	16	45	6	1	7	6	1	7	18	4	22	14	38	52	81	62	143	143
<b>Type de ménage (30 derniers jours)*</b>																			
seul-e en ménage	38.5	35.0	37.4	34.8	40.5	36.4	33.7	28.8	33.0	12.1	16.3	12.9	14.3	11.5	12.0	28.7	26.2	27.9	1 415
avec famille d'origine	7.2	2.8	5.8	13.4	9.5	12.3	20.6	9.6	19.1	66.1	57.1	64.3	12.1	5.7	7.0	26.4	14.5	22.5	1 143
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	43.5	53.4	46.6	26.8	38.1	29.9	33.0	40.4	34.1	8.8	10.7	9.1	70.3	80.5	78.4	33.1	49.9	38.6	1 963
avec des amis ou d'autres personnes	4.0	2.3	3.4	7.1	4.8	6.5	6.7	7.7	6.8	3.2	3.6	3.3	2.2	1.7	1.8	4.2	2.8	3.7	188
en prison	0.1	0.0	0.0	0.9	2.4	1.3	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9
institution/foyer	2.4	2.3	2.4	7.1	2.4	5.8	2.2	3.8	2.5	3.1	4.6	3.4	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	2.4	123
hôpital/clinique	2.0	2.8	2.2	1.8	2.4	1.9	0.3	3.8	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.3	67
autre	2.3	1.5	2.1	8.0	0.0	5.8	2.9	5.8	3.3	6.0	7.7	6.4	1.1	0.6	0.7	3.7	2.8	3.4	172
<b>N**</b>	<b>1 636</b>	<b>751</b>	<b>2 387</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>154</b>	<b>315</b>	<b>52</b>	<b>367</b>	<b>811</b>	<b>196</b>	<b>1 007</b>	<b>91</b>	<b>349</b>	<b>440</b>	<b>3 411</b>	<b>1 669</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
données manquantes	295	106	401	29	17	46	49	4	53	116	34	150	166	476	642	709	663	1 372	1 372
<b>Situation de domicile (30 dernier jours)*</b>																			
logement stable	92.3	92.8	92.4	84.8	79.5	83.3	91.4	82.4	90.1	92.3	91.6	92.2	96.5	97.4	97.2	92.3	93.2	92.6	4 941
logement instable/SDF	3.8	2.4	3.4	5.4	15.9	8.3	5.7	5.9	5.8	3.0	4.0	3.2	3.5	2.3	2.6	3.9	3.1	3.6	192
en prison	0.1	0.0	0.0	0.9	2.3	1.3	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9
institution/foyer/hôpital/autre	3.8	4.8	4.1	8.9	2.3	7.1	2.2	11.8	3.6	4.4	4.5	4.4	0.0	0.3	0.2	3.6	3.6	3.6	194
<b>N**</b>	<b>1 726</b>	<b>787</b>	<b>2 513</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>314</b>	<b>51</b>	<b>365</b>	<b>857</b>	<b>202</b>	<b>1 059</b>	<b>114</b>	<b>391</b>	<b>505</b>	<b>3 576</b>	<b>1 760</b>	<b>5 336</b>	<b>5 336</b>
données manquantes	205	70	275	29	15	44	50	5	55	70	28	98	143	434	577	544	572	1 116	1 116

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Type de relation de couple*</b>																			
sans partenaire, seul-e	40.2	40.5	40.3	61.5	37.0	54.3	47.1	20.8	43.6	71.0	61.1	68.9	19.2	20.5	20.2	49.8	38.7	45.8	1 510
relations temporaires	1.5	1.2	1.4	1.5	7.4	3.3	3.2	0.0	2.8	3.4	7.9	4.3	2.6	0.6	1.0	2.0	2.1	2.0	67
partenaire fixe, vivant séparé	14.2	9.8	12.8	12.3	18.5	14.1	15.3	33.3	17.7	16.5	19.8	17.2	12.8	14.2	13.9	13.6	13.2	13.5	444
partenaire fixe, ménage commun	44.1	48.5	45.5	24.6	37.0	28.3	34.4	45.8	35.9	9.1	11.1	9.5	65.4	64.8	64.9	34.6	46.0	38.7	1 277
<b>N**</b>	<b>1 064</b>	<b>499</b>	<b>1 563</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>24</b>	<b>181</b>	<b>473</b>	<b>126</b>	<b>599</b>	<b>78</b>	<b>332</b>	<b>410</b>	<b>2 105</b>	<b>1 193</b>	<b>3 298</b>	<b>3 298</b>
données manquantes	867	358	1 225	76	32	108	207	32	239	454	104	558	179	493	672	2 015	1 139	3 154	3 154
<b>Nombre d'enfants propres*</b>																			
aucun	42.3	35.8	40.1	55.2	52.2	54.3	61.3	55.2	60.4	92.6	92.8	92.6	45.2	30.3	33.5	61.1	45.9	55.6	1 994
1 enfant	21.3	21.8	21.4	24.1	17.4	22.2	17.2	27.6	18.8	2.5	3.3	2.7	10.6	17.4	15.9	14.4	16.7	15.2	547
2 enfants	25.3	30.3	26.9	19.0	26.1	21.0	14.1	13.8	14.1	3.7	3.9	3.8	33.7	33.5	33.5	17.1	24.8	19.9	714
3 enfants ou plus	11.2	12.1	11.5	1.7	4.3	2.5	7.4	3.4	6.8	1.2	0.0	0.9	10.6	18.8	17.0	7.4	12.6	9.3	333
<b>N**</b>	<b>1 048</b>	<b>519</b>	<b>1 567</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>192</b>	<b>592</b>	<b>152</b>	<b>744</b>	<b>104</b>	<b>373</b>	<b>477</b>	<b>2 275</b>	<b>1 313</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>
données manquantes	883	338	1 221	83	36	119	201	27	228	335	78	413	153	452	605	1 845	1 019	2 864	2 864
<b>Nombre d'enfants dans le ménage*</b>																			
aucun	71.8	64.0	69.2	83.0	83.3	83.1	79.9	75.0	79.1	80.7	81.1	80.8	61.9	43.7	47.5	75.0	62.4	70.2	2 122
1 enfant	12.1	18.6	14.2	14.9	11.1	13.8	6.7	12.5	7.6	5.1	4.1	4.9	17.5	23.4	22.1	10.0	16.7	12.5	378
2 enfants	11.9	13.8	12.5	2.1	5.6	3.1	7.5	12.5	8.2	10.5	10.7	10.6	18.6	22.8	21.9	11.0	15.0	12.5	379
3 enfants ou plus	4.2	3.7	4.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.1	3.7	4.1	3.8	2.1	10.2	8.5	4.0	5.9	4.7	143
<b>N**</b>	<b>884</b>	<b>436</b>	<b>1 320</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>134</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>455</b>	<b>122</b>	<b>577</b>	<b>97</b>	<b>364</b>	<b>461</b>	<b>1 878</b>	<b>1 144</b>	<b>3 022</b>	<b>3 022</b>
données manquantes	1 047	421	1 468	94	41	135	230	32	262	472	108	580	160	461	621	2 242	1 188	3 430	3 430

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Plus haute formation achevée*</b>																			
aucune formation achevée	2.6	2.5	2.5	6.7	5.1	6.3	2.0	6.4	2.6	14.9	20.7	16.0	6.0	2.0	2.9	7.7	6.2	7.2	354
école obligatoire	10.4	12.6	11.0	24.8	33.3	27.1	15.4	38.3	18.5	57.5	53.9	56.8	6.6	6.7	6.7	24.1	18.5	22.2	1 091
formation de transition	2.8	5.1	3.5	3.8	5.1	4.2	1.4	4.3	1.8	3.7	4.7	3.9	1.3	2.4	2.1	2.9	4.2	3.4	166
formation générale sans maturité	0.7	0.8	0.7	1.9	2.6	2.1	1.4	0.0	1.2	0.0	0.5	0.1	0.0	1.4	1.1	0.6	0.8	0.7	34
formation prof. de base et apprentissage	54.4	54.3	54.4	58.1	41.0	53.5	63.1	42.6	60.3	18.0	13.5	17.1	36.4	47.2	44.7	43.7	44.0	43.8	2 153
maturité ou école normale	4.7	3.4	4.3	1.9	5.1	2.8	4.8	2.1	4.4	2.7	3.6	2.9	4.0	9.2	8.0	4.1	5.9	4.7	231
formation prof. supérieure	12.1	10.9	11.7	1.0	5.1	2.1	7.2	4.3	6.8	1.5	2.1	1.6	22.5	13.4	15.5	8.3	9.3	8.6	424
haute école spécialisée et université	12.1	10.3	11.6	1.9	2.6	2.1	4.8	2.1	4.4	1.6	1.0	1.5	22.5	17.5	18.6	8.3	10.7	9.1	449
doctorat ou habilitation	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	11
<b>N**</b>	<b>1 486</b>	<b>652</b>	<b>2 138</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	<b>144</b>	<b>293</b>	<b>47</b>	<b>340</b>	<b>805</b>	<b>193</b>	<b>998</b>	<b>151</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>3 240</b>	<b>1 673</b>	<b>4 913</b>	<b>4 913</b>
données manquantes	445	205	650	36	20	56	71	9	80	122	37	159	106	316	422	880	659	1 539	1 539
<b>Statut professionnel*</b>																			
sans activité professionnelle	17.9	25.4	20.1	18.0	35.5	22.5	16.5	32.4	18.6	23.0	18.2	22.1	9.1	23.5	20.0	19.0	25.9	20.8	594
apprenti-e, stagiaire	1.9	1.7	1.8	6.7	0.0	5.0	5.2	2.7	4.9	30.6	25.0	29.6	9.1	2.9	4.4	9.0	5.8	8.1	231
manœuvre, aide	3.4	2.8	3.2	3.4	3.2	3.3	2.8	5.4	3.2	2.5	2.3	2.4	0.0	2.9	2.2	3.1	3.0	3.1	88
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.4	4.9	5.2	9.0	3.2	7.5	4.0	8.1	4.6	1.2	3.4	1.6	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	4.6	131
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12.1	7.4	10.7	19.1	12.9	17.5	20.2	8.1	18.6	6.9	6.8	6.9	0.0	2.9	2.2	12.1	7.0	10.7	306
contremaître-sse	2.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.3	37
employé-e non qualifié-e	24.9	37.7	28.7	23.6	16.1	21.7	27.4	32.4	28.1	10.9	11.4	11.0	18.2	35.3	31.1	21.4	32.0	24.2	690
empl. qualifié-e, cadre moyen	14.8	11.2	13.8	12.4	12.9	12.5	10.1	8.1	9.8	4.4	1.1	3.9	27.3	17.6	20.0	11.5	9.6	11.0	314
employé-e, cadre supérieur	5.4	1.7	4.3	1.1	0.0	0.8	1.2	0.0	1.1	0.5	0.0	0.4	0.0	5.9	4.4	3.4	1.4	2.8	81
indépendant-e	9.8	6.4	8.8	2.2	0.0	1.7	9.3	0.0	8.1	2.5	2.3	2.4	36.4	8.8	15.6	7.7	5.2	7.0	200
écolier/ère, étudiant-e	1.4	0.0	1.0	2.2	12.9	5.0	1.6	2.7	1.8	15.8	26.1	17.6	0.0	0.0	0.0	5.4	4.3	5.1	146
autre statut	1.0	0.4	0.8	2.2	3.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1	31
<b>N**</b>	<b>1 112</b>	<b>472</b>	<b>1 584</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>120</b>	<b>248</b>	<b>37</b>	<b>285</b>	<b>405</b>	<b>88</b>	<b>493</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>2 087</b>	<b>762</b>	<b>2 849</b>	<b>2 849</b>
données manquantes	819	385	1 204	52	28	80	116	19	135	522	142	664	246	791	1 037	2 033	1 570	3 603	3 603

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*</b>																			
salaire	57.0	42.1	52.3	33.9	25.0	31.3	58.0	50.0	56.9	24.8	17.8	23.5	75.7	68.3	70.0	47.1	43.4	45.9	2 470
économies, épargne	2.7	2.8	2.7	4.0	0.0	2.8	3.0	0.0	2.6	0.6	1.0	0.7	0.9	1.6	1.4	2.0	1.8	2.0	106
rente (AVS, AI ou autre)	15.0	24.9	18.0	19.4	21.2	19.9	7.9	21.2	9.7	3.1	5.0	3.5	10.4	10.1	10.2	11.0	18.1	13.3	716
aide sociale	14.2	12.4	13.6	31.5	42.3	34.7	13.3	19.2	14.1	12.4	13.9	12.6	6.1	2.1	3.1	13.7	11.5	12.9	696
assurance-chômage	4.4	2.8	3.9	3.2	0.0	2.3	7.3	0.0	6.3	2.7	0.5	2.3	0.0	1.1	0.8	4.0	2.0	3.4	182
soutien du/de la partenaire	1.4	9.7	4.0	3.2	1.9	2.8	1.8	3.8	2.1	2.2	2.0	2.2	0.0	10.1	7.8	1.7	7.9	3.7	198
soutien parents/proches/amis	2.4	2.4	2.4	4.0	7.7	5.1	5.1	5.8	5.2	53.1	57.4	54.0	7.0	5.9	6.1	18.1	13.2	16.5	887
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	7
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostitution	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	10
assurance d'indemnités journalières	1.4	1.8	1.5	0.8	0.0	0.6	1.8	0.0	1.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	55
autre	1.3	0.6	1.1	0.0	1.9	0.6	0.6	0.0	0.5	0.3	1.5	0.6	0.0	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	46
<b>N**</b>	<b>1 738</b>	<b>784</b>	<b>2 522</b>	<b>124</b>	<b>52</b>	<b>176</b>	<b>331</b>	<b>52</b>	<b>383</b>	<b>858</b>	<b>202</b>	<b>1 060</b>	<b>115</b>	<b>375</b>	<b>490</b>	<b>3 631</b>	<b>1 745</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>
<i>données manquantes</i>	193	73	266	17	7	24	33	4	37	69	28	97	142	450	592	489	587	1 076	1 076
<b>Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*</b>																			
activité à plein temps (dès 70%)	51.2	27.7	44.2	26.4	21.6	25.0	54.3	35.3	51.8	14.1	12.6	13.8	79.5	49.4	56.0	40.3	29.7	37.0	1 901
activité à temps partiel	6.1	22.4	11.0	7.4	9.8	8.1	4.7	15.7	6.2	3.4	4.3	3.6	1.1	29.0	22.9	5.1	19.1	9.5	486
jobs occasionnels	1.2	0.3	0.9	2.5	0.0	1.7	2.4	3.9	2.6	0.9	0.5	0.8	1.1	0.3	0.5	1.2	0.6	1.0	51
en formation	3.1	2.0	2.8	5.0	3.9	4.7	3.6	11.8	4.6	60.4	60.9	60.5	5.7	7.7	7.3	20.7	15.5	19.1	979
sans travail, en quête d'emploi	10.7	8.3	10.0	12.4	7.8	11.0	15.1	9.8	14.4	8.1	4.3	7.3	0.0	1.3	1.0	10.0	5.8	8.7	448
sans travail, sans recherche d'emploi	7.1	10.2	8.0	22.3	25.5	23.3	11.3	7.8	10.8	5.6	5.3	5.5	0.0	0.6	0.5	7.3	7.3	7.3	374
rentier/rentière	7.7	12.9	9.2	4.1	3.9	4.1	0.6	2.0	0.8	0.2	1.0	0.4	9.1	7.1	7.5	4.5	8.6	5.8	297
incapacité de travail	5.5	6.7	5.9	9.9	13.7	11.0	4.5	11.8	5.4	1.5	1.9	1.6	0.0	1.6	1.3	4.4	5.8	4.8	247
femme/homme au foyer	0.3	3.8	1.3	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.2	2.1	0.8	40
autre	7.0	5.7	6.7	9.1	13.7	10.5	3.6	2.0	3.4	5.7	9.2	6.4	3.4	1.6	2.0	6.4	5.4	6.1	312
<b>N**</b>	<b>1 676</b>	<b>714</b>	<b>2 390</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>172</b>	<b>337</b>	<b>51</b>	<b>388</b>	<b>857</b>	<b>207</b>	<b>1 064</b>	<b>88</b>	<b>310</b>	<b>398</b>	<b>3 535</b>	<b>1 600</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>
<i>données manquantes</i>	255	143	398	20	8	28	27	5	32	70	23	93	169	515	684	585	732	1 317	1 317

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Revenu mensuel net (6 derniers mois)*</b>																			
aucun revenu	45.3	55.3	48.0	61.2	81.3	66.2	49.4	44.4	48.9	58.6	76.1	62.3	80.0	83.1	82.4	54.8	67.7	58.6	692
moins de 1000 fr.	4.4	2.0	3.7	0.0	12.5	3.1	3.8	0.0	3.4	23.6	10.9	20.9	0.0	0.0	0.0	7.9	4.1	6.8	80
de 1001 à 2000 fr.	3.4	7.2	4.4	8.2	6.3	7.7	5.1	11.1	5.7	2.9	6.5	3.6	4.0	1.3	2.0	3.6	5.5	4.1	49
de 2001 à 3000 fr.	5.6	10.5	6.9	14.3	0.0	10.8	6.3	22.2	8.0	0.6	2.2	0.9	0.0	1.3	1.0	4.5	6.1	5.0	59
de 3001 à 4000 fr.	8.8	12.5	9.8	6.1	0.0	4.6	11.4	22.2	12.5	4.0	4.3	4.1	0.0	1.3	1.0	6.8	7.3	6.9	82
de 4001 à 5000 fr.	12.7	5.9	10.8	6.1	0.0	4.6	11.4	0.0	10.2	6.3	0.0	5.0	4.0	2.6	2.9	9.2	4.1	7.7	91
de 5001 à 6000 fr.	9.5	2.0	7.5	4.1	0.0	3.1	3.8	0.0	3.4	2.9	0.0	2.3	8.0	5.2	5.9	6.6	2.0	5.2	62
de 6001 à 8000 fr.	5.8	2.0	4.8	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	4.5	0.6	0.0	0.5	0.0	3.9	2.9	3.7	1.7	3.1	37
de 8001 à 10 000 fr.	2.4	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.6	0.0	0.5	4.0	1.3	2.0	1.6	0.9	1.4	16
de 10 001 à 15 000 fr.	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.9	11
plus de 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	2
<b>N**</b>	<b>411</b>	<b>152</b>	<b>563</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>174</b>	<b>46</b>	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>102</b>	<b>837</b>	<b>344</b>	<b>1 181</b>	<b>1 181</b>
données manquantes	1 520	705	2 225	92	43	135	285	47	332	753	184	937	232	748	980	3 283	1 988	5 271	5 271
<b>Dettes*</b>																			
aucune dette	67.9	72.5	69.3	39.3	35.0	38.3	40.4	40.0	40.4	79.6	79.5	79.6	92.1	93.6	93.3	67.2	74.9	69.6	1 609
jusqu'à 5000 fr.	3.6	5.0	4.0	4.9	0.0	3.7	11.3	10.0	11.2	5.6	4.5	5.3	0.0	1.6	1.2	5.4	4.4	5.1	117
de 5001 à 10 000 fr.	5.3	4.0	4.9	8.2	15.0	9.9	7.8	10.0	8.1	3.9	4.5	4.1	2.6	1.6	1.8	5.1	4.8	5.0	116
de 10 001 à 25 000 fr.	4.3	2.6	3.8	6.6	10.0	7.4	11.3	0.0	9.9	2.1	1.8	2.0	0.0	1.6	1.2	4.5	2.9	4.0	93
de 25 001 à 50 000 fr.	3.8	2.3	3.4	6.6	0.0	4.9	6.4	10.0	6.8	1.4	0.9	1.3	2.6	0.8	1.2	3.5	2.3	3.1	72
de 50 001 à 100 000 fr.	9.8	10.9	10.1	21.3	35.0	24.7	10.6	10.0	10.6	5.6	8.0	6.1	2.6	0.0	0.6	8.8	8.4	8.7	201
plus de 100 000 fr.	3.3	1.3	2.7	1.6	0.0	1.2	5.7	0.0	5.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.8	0.6	2.8	0.8	2.2	50
montant inconnu	2.1	1.3	1.8	11.5	5.0	9.9	6.4	20.0	8.1	1.2	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.5	2.3	53
<b>N**</b>	<b>676</b>	<b>302</b>	<b>978</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>20</b>	<b>161</b>	<b>431</b>	<b>112</b>	<b>543</b>	<b>38</b>	<b>125</b>	<b>163</b>	<b>1 583</b>	<b>728</b>	<b>2 311</b>	<b>2 311</b>
données manquantes	1 255	555	1 810	80	39	119	223	36	259	496	118	614	219	700	919	2 537	1 604	4 141	4 141

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Emprisonnement ou détention préventive*</b>																
aucun-e	90.7	96.1	92.3	36.7	75.0	44.7	69.6	100.0	72.4	92.8	100.0	94.0	86.9	95.6	89.2	935
emprisonnement	4.4	2.5	3.8	26.7	25.0	26.3	14.5	0.0	13.2	4.6	0.0	3.8	6.2	2.9	5.3	56
détention préventive	3.6	0.5	2.7	16.7	0.0	13.2	10.1	0.0	9.2	2.0	0.0	1.6	4.3	0.4	3.2	34
emprisonnement et détention préventive	1.3	1.0	1.2	20.0	0.0	15.8	5.8	0.0	5.3	0.7	0.0	0.5	2.6	1.1	2.2	23
<b>N**</b>	<b>474</b>	<b>203</b>	<b>677</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>31</b>	<b>183</b>	<b>773</b>	<b>275</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>
<i>données manquantes</i>	1 457	654	2 111	111	51	162	295	49	344	775	199	974	3 090	1 232	4 322	4 322
<b>Durée totale de détention***</b>																
jusqu'à 1 mois	28.0	20.0	26.7	22.2	100.0	36.4	38.5	-	38.5	14.3	-	14.3	26.3	50.0	29.2	19
> 1 à 2 mois	4.0	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	7.7	-	7.7	0.0	-	0.0	3.5	12.5	4.6	3
> 2 à 6 mois	32.0	20.0	30.0	33.3	0.0	27.3	7.7	-	7.7	28.6	-	28.6	28.1	12.5	26.2	17
> 6 à 12 mois	8.0	20.0	10.0	11.1	0.0	9.1	15.4	-	15.4	0.0	-	0.0	8.8	12.5	9.2	6
plus de 1 an	28.0	20.0	26.7	33.3	0.0	27.3	30.8	-	30.8	57.1	-	57.1	33.3	12.5	30.8	20
<b>N**</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<i>données manquantes</i>	19	3	22	10	0	10	8	0	8	4	0	4	44	4	48	48

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible



## T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2019)

Instance d'envoi principale*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
condamnation/mesure/justice/police	13.0	6.7	11.0	4.9	2.0	4.0	12.4	7.5	11.7	48.9	46.7	48.5	0.9	0.8	0.8	19.5	8.1	15.4	916
cabinet médical	9.8	11.1	10.2	9.8	5.9	8.6	5.1	3.8	4.9	2.3	5.6	2.9	4.1	3.0	3.2	6.6	7.4	6.9	408
institution spécialisée dans les addictions	5.2	6.0	5.4	8.1	15.7	10.3	5.1	7.5	5.5	2.1	1.4	2.0	1.8	3.1	2.8	4.1	4.3	4.2	247
autre service médical/social/de santé	17.9	19.7	18.5	16.3	17.6	16.7	12.1	28.3	14.3	9.5	7.0	9.0	6.8	4.6	5.1	14.3	12.8	13.7	816
institution formatrice/éducative	0.3	1.1	0.6	1.6	2.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	3.9	1.4	0.9	1.0	1.9	2.7	2.2	130
employeur/employeuse	3.3	1.5	2.7	0.8	2.0	1.1	1.8	3.8	2.1	1.9	0.9	1.7	1.8	0.3	0.6	2.6	1.0	2.0	120
initiative personnelle/famille/amis	48.6	52.3	49.7	57.7	51.0	55.7	62.2	47.2	60.2	31.5	28.5	30.9	81.9	86.0	85.1	49.1	61.7	53.7	3 193
autre	2.0	1.6	1.9	0.8	3.9	1.7	1.2	1.9	1.3	0.8	1.9	1.0	1.4	1.2	1.3	2.0	2.0	2.0	119
<b>N**</b>	<b>1 766</b>	<b>803</b>	<b>2 569</b>	<b>123</b>	<b>51</b>	<b>174</b>	<b>331</b>	<b>53</b>	<b>384</b>	<b>885</b>	<b>214</b>	<b>1 099</b>	<b>221</b>	<b>738</b>	<b>959</b>	<b>3 801</b>	<b>2 148</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>
données manquantes	165	54	219	18	8	26	33	3	36	42	16	58	36	87	123	319	184	503	503

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*</b>																
non, pas de mesure	91.0	94.1	91.9	95.5	94.1	95.1	95.0	93.8	94.8	75.7	81.2	76.7	89.5	92.8	90.4	2 474
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4.3	7.1	4.8	0.8	0.8	0.8	23
oui, consécutive à une mesure	9.0	5.9	8.1	4.5	5.9	4.9	4.5	6.3	4.8	20.0	11.8	18.5	9.7	6.4	8.8	241
<b>N**</b>	<b>1 126</b>	<b>476</b>	<b>1 602</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>220</b>	<b>32</b>	<b>252</b>	<b>370</b>	<b>85</b>	<b>455</b>	<b>2 018</b>	<b>720</b>	<b>2 738</b>	<b>2 738</b>
données manquantes	805	381	1 186	52	25	77	144	24	168	557	145	702	1 845	787	2 632	2 632
<b>Type de mesure judiciaire***</b>																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.0	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	1
traitement résidentiel (art 60 CP)	1.9	0.0	1.5	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	2
prise en charge ambulatoire	40.4	50.0	42.6	0.0	-	0.0	80.0	-	80.0	58.0	75.0	60.3	50.4	57.1	51.8	73
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.0	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	1
en attente d'un jugement	3.8	0.0	2.9	100.0	-	100.0	20.0	-	20.0	4.0	0.0	3.4	5.3	0.0	4.3	6
autre	57.7	50.0	55.9	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	46.0	25.0	43.1	48.7	42.9	47.5	67
<b>N**</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>113</b>	<b>28</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
données manquantes	49	12	61	3	2	5	6	2	8	40	8	48	99	24	123	123

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

## T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Prises en charge antérieures*</b>																			
non	45.8	42.8	44.9	18.9	18.2	18.7	49.1	43.2	48.3	78.4	74.3	77.6	79.2	79.7	79.6	56.3	56.5	56.4	2 620
oui	54.2	57.2	55.1	81.1	81.8	81.3	50.9	56.8	51.7	21.6	25.7	22.4	20.8	20.3	20.4	43.7	43.5	43.6	2 028
<b>N**</b>	<b>1 538</b>	<b>682</b>	<b>2 220</b>	<b>106</b>	<b>44</b>	<b>150</b>	<b>281</b>	<b>44</b>	<b>325</b>	<b>755</b>	<b>179</b>	<b>934</b>	<b>72</b>	<b>290</b>	<b>362</b>	<b>3 153</b>	<b>1 495</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>
<i>données manquantes</i>	393	175	568	35	15	50	83	12	95	172	51	223	185	535	720	967	837	1 804	1 804
<b>Type de prise en charge***</b>																			
traitement avec prescription d'héroïne	1.1	1.1	1.1	3.6	8.3	5.0	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.2	17
substitution (méthadone, subutex)	5.2	4.3	4.9	76.8	66.7	73.8	9.1	41.7	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.1	9.7	8.2	9.2	127
autre traitement médicamenteux	7.3	5.0	6.5	16.1	12.5	15.0	9.1	0.0	7.9	0.0	2.9	0.7	0.0	3.4	2.7	6.8	4.6	6.1	84
prise en charge ambulatoire	74.2	70.9	73.1	53.6	41.7	50.0	80.5	83.3	80.9	90.7	79.4	88.0	73.3	87.9	84.9	75.8	74.4	75.3	1 044
structure/clinique de jour	1.6	2.9	2.0	1.8	0.0	1.3	3.9	0.0	3.4	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	1.6	22
traitement résidentiel	49.7	55.8	51.7	32.1	37.5	33.8	45.5	50.0	46.1	15.7	26.5	18.3	33.3	15.5	19.2	41.8	45.6	43.1	597
sevrage	39.8	43.9	41.1	39.3	33.3	37.5	36.4	66.7	40.4	8.3	0.0	6.3	13.3	15.5	15.1	33.1	32.8	33.0	457
groupe d'entraide ou d'auto-support	6.0	7.6	6.5	1.8	0.0	1.3	9.1	16.7	10.1	0.9	0.0	0.7	0.0	5.2	4.1	5.1	5.7	5.3	73
autre(s)	1.1	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.9	2.9	1.4	0.0	3.4	2.7	1.6	2.5	1.9	27
<b>N**</b>	<b>563</b>	<b>278</b>	<b>841</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>910</b>	<b>476</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>
<i>données manquantes</i>	274	115	389	30	12	42	67	13	80	56	13	69	0	3	3	479	185	664	664

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

## T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*</b>																
non	97.6	98.2	97.8	40.9	32.1	38.3	96.1	89.3	95.1	99.8	99.3	99.7	96.4	96.1	96.3	3 002
oui	2.4	1.8	2.2	59.1	67.9	61.7	3.9	10.7	4.9	0.2	0.7	0.3	3.6	3.9	3.7	116
<b>N**</b>	<b>1 091</b>	<b>510</b>	<b>1 601</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>94</b>	<b>155</b>	<b>28</b>	<b>183</b>	<b>592</b>	<b>152</b>	<b>744</b>	<b>2 199</b>	<b>919</b>	<b>3 118</b>	<b>3 118</b>
données manquantes	840	347	1 187	75	31	106	209	28	237	335	78	413	1 664	588	2 252	2 252
<b>Type de substitution/prescription***</b>																
héroïne	27.8	11.1	22.2	41.0	47.4	43.1	16.7	33.3	22.2	0.0	-	0.0	33.8	38.2	35.2	37
méthadone	50.0	77.8	59.3	35.9	47.4	39.7	50.0	33.3	44.4	0.0	-	0.0	39.4	50.0	42.9	45
autres opiacés	22.2	11.1	18.5	23.1	5.3	17.2	16.7	33.3	22.2	100.0	-	100.0	23.9	11.8	20.0	21
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	11.1	0.0	-	0.0	2.8	0.0	1.9	2
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
données manquantes	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	2	11	11
<b>Traitement de substitution dans la vie?*</b>																
non	95.4	95.7	95.5	30.3	30.0	30.2	92.4	72.7	89.6	98.7	100.0	98.9	92.4	92.1	92.3	2 648
oui	4.6	4.3	4.5	69.7	70.0	69.8	7.6	27.3	10.4	1.3	0.0	1.1	7.6	7.9	7.7	221
<b>N**</b>	<b>1 139</b>	<b>506</b>	<b>1 645</b>	<b>99</b>	<b>40</b>	<b>139</b>	<b>198</b>	<b>33</b>	<b>231</b>	<b>374</b>	<b>96</b>	<b>470</b>	<b>2 056</b>	<b>813</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>
données manquantes	792	351	1 143	42	19	61	166	23	189	553	134	687	1 807	694	2 501	2 501
<b>Age lors du premier traitement de substitution****</b>																
Moyenne	32.2	34.2	32.7	29.2	27.2	28.6	26.3	28.8	27.5	21.5	-	21.5	28.7	29.6	29.0	
Ecart-type	9.4	7.6	8.9	7.9	9.1	8.2	11.3	3.0	7.8	6.6	-	6.6	8.6	8.2	8.4	
25 centile	24.0	32.0	24.0	24.0	20.0	23.0	19.5	26.5	21.5	16.5	-	16.5	23.0	23.5	23.0	
Médiane	30.5	37.0	32.0	28.0	27.0	28.0	21.5	29.0	26.5	20.5	-	20.5	27.0	30.0	28.0	
75 centile	37.0	40.0	39.0	36.0	32.0	35.0	33.0	31.0	31.0	26.5	-	26.5	34.5	33.5	34.5	
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>88</b>	

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

## T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2019)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total			Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcool	50.1	56.9	52.0	2 788	alcool	50.1	56.9	52.0	2 788
héroïne	2.9	3.2	3.0	160					
méthadone	0.3	0.2	0.2	13					
buprénorphine	0.1	0.1	0.1	5	opioïdes	3.7	3.9	3.7	200
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
autres opioïdes	0.4	0.4	0.4	22					
cocaïne en poudre	9.0	3.5	7.5	401					
crack	0.3	0.2	0.3	16	cocaïne ou dérivés	9.4	3.7	7.8	420
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.1	3					
amphétamines	0.7	1.0	0.8	43					
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1	5					
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.4	0.4	19	autres stimulants	1.3	1.6	1.4	75
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	1					
autres stimulants	0.1	0.2	0.1	7					
barbituriques	0.0	0.0	0.0	1					
benzodiazépines	0.9	1.9	1.2	62	hypnotiques/sédatifs	1.1	2.5	1.5	78
GHB/GBL	0.1	0.1	0.1	6					
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.4	0.2	9					
LSD	0.1	0.1	0.1	4					
kétamine	0.0	0.0	0.0	0	hallucinogènes	0.1	0.1	0.1	5
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1					
cannabis	24.0	15.3	21.6	1 157	cannabis	24.0	15.3	21.6	1 157
tabac	2.1	5.0	2.9	156	tabac	2.1	5.0	2.9	156
substances volatiles	0.0	0.1	0.0	2					
autre substance	0.4	0.2	0.4	19	autres substances	0.4	0.3	0.4	21
jeu pathologique	3.1	2.1	2.8	149					
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.6	0.5	1.3	70	comportement de type addictif	7.8	10.8	8.7	464
troubles alimentaires	0.3	5.6	1.8	96					
autre comportement de type addictif	2.8	2.7	2.8	149					
<b>N**</b>	<b>3 858</b>	<b>1 506</b>	<b>5 364</b>	<b>5 364</b>		<b>3 858</b>	<b>1 506</b>	<b>5 364</b>	<b>5 364</b>
données manquantes	5	1	6	6		5	1	6	6

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2019)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
<b>Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*</b>			
oui	6.8	5.5	6.5
non	93.2	94.5	93.5
<b>N**</b>	<b>1 874</b>	<b>690</b>	<b>2 564</b>
<i>données manquantes</i>	1 989	817	2 806
<b>Combinaisons de substances les plus fréquentes***</b>			
coc/alc	20.0	4.0	16.8
tab/alc	7.0	20.0	9.6
can/alc	9.0	8.0	8.8
can/coc/alc	7.0	0.0	5.6
tab/can/alc	4.0	4.0	4.0
coc/op	3.0	4.0	3.2
med/alc	4.0	0.0	3.2
tab/coc/alc	3.0	4.0	3.2
coc/op/alc	3.0	0.0	2.4
can/op/alc	3.0	0.0	2.4
can/coc	2.0	4.0	2.4
can/stim	1.0	8.0	2.4
can/stim/coc/alc	2.0	4.0	2.4
tab/can/coc/alc	2.0	4.0	2.4
stim/coc/alc	1.0	4.0	1.6
med/coc/op	2.0	0.0	1.6
med/stim	0.0	8.0	1.6
can/coc/op	2.0	0.0	1.6
can/med/coc/op/alc	2.0	0.0	1.6
tab/can	2.0	0.0	1.6
autres combinaisons	21.0	24.0	21.6
<b>N**</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>125</b>
<i>données manquantes</i>	28	13	41

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

### T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
<b>Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*</b>									
chaque jour	44.6	40.7	16.8	6.7	60.0	0.0	34.3	85.3	100.0
4 à 6 jours par semaine	12.7	8.8	14.3	2.2	0.0	0.0	8.5	2.7	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.8	11.0	26.4	22.2	10.0	0.0	16.4	2.7	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.0	13.2	23.6	26.7	6.7	33.3	17.8	4.0	0.0
aucune consommation	21.8	26.4	18.9	42.2	23.3	66.7	23.0	5.3	0.0
<b>N**</b>	<b>1 593</b>	<b>91</b>	<b>280</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>799</b>	<b>75</b>	<b>1</b>
<i>données manquantes</i>	338	50	84	6	11	1	128	6	16

### T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.7	35.1	8.5	25.0	66.7	-	40.3	84.3	100.0
4 à 6 jours par semaine	13.5	5.4	17.0	20.0	0.0	-	6.3	4.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.5	13.5	27.7	15.0	10.0	-	13.6	1.4	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.3	13.5	19.1	20.0	6.7	-	17.3	5.7	0.0
aucune consommation	21.0	32.4	27.7	20.0	16.7	-	22.5	4.3	0.0
<b>N**</b>	<b>710</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>70</b>	<b>1</b>
<i>données manquantes</i>	147	22	9	4	7	1	39	5	3

### T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	44.0	39.1	15.6	12.3	63.3	0.0	35.5	84.8	100.0
4 à 6 jours par semaine	13.0	7.8	14.7	7.7	0.0	0.0	8.1	3.4	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.0	11.7	26.6	20.0	10.0	0.0	15.9	2.1	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.4	13.3	22.9	24.6	6.7	33.3	17.7	4.8	0.0
aucune consommation	21.6	28.1	20.2	35.4	20.0	66.7	22.9	4.8	0.0
<b>N**</b>	<b>2 303</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>990</b>	<b>145</b>	<b>2</b>
<i>données manquantes</i>	485	72	93	10	18	2	167	11	19

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

**T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes**

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
<b>Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*</b>				
chaque jour	16.3	61.2	55.6	66.0
4 à 6 jours par semaine	8.1	14.3	0.0	6.2
2 à 3 jours par semaine	17.4	8.2	33.3	12.4
1 jour par semaine ou moins	17.4	8.2	0.0	7.2
aucune manifestation	40.7	8.2	11.1	8.2
<b>N**</b>	<b>86</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>97</b>
<i>données manquantes</i>	32	14	2	12

**T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), femmes**

<b>Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*</b>				
chaque jour	10.5	33.3	57.5	47.1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	12.5	5.9
2 à 3 jours par semaine	10.5	16.7	18.8	14.7
1 jour par semaine ou moins	26.3	0.0	7.5	20.6
aucune manifestation	52.6	50.0	3.8	11.8
<b>N**</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>34</b>
<i>données manquantes</i>	12	1	5	6

**T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2019), hommes et femmes**

<b>Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*</b>				
chaque jour	15.2	58.2	57.3	61.1
4 à 6 jours par semaine	6.7	12.7	11.2	6.1
2 à 3 jours par semaine	16.2	9.1	20.2	13.0
1 jour par semaine ou moins	19.0	7.3	6.7	10.7
aucune manifestation	42.9	12.7	4.5	9.2
<b>N**</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>131</b>
<i>données manquantes</i>	44	15	7	18

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)



**T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), hommes**

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
<b>Age lors de la première consommation</b>									
moyenne	16.1	24.2	21.0	19.9	29.2	18.0	15.2	15.6	20.2
écart-type	4.1	9.6	6.3	6.7	14.7		2.3	2.7	3.3
1er quartile	14.0	17.0	17.0	16.0	17.5	18.0	14.0	14.0	18.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.5	25.0	18.0	15.0	15.0	20.0
3e quartile	17.0	28.0	23.0	20.0	35.5	18.0	16.0	18.0	23.0
<b>N*</b>	<b>1 010</b>	<b>75</b>	<b>222</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>621</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
données manquantes	921	66	142	17	21	3	306	32	12
<b>Age lors du début de la consommation régulière</b>									
moyenne	22.6	27.0	24.7	19.5	28.9	19.0	16.3	17.9	20.3
écart-type	8.7	10.6	7.0	4.3	10.3		2.8	6.5	2.5
1er quartile	17.0	20.0	20.0	17.0	20.0	19.0	15.0	14.0	18.0
valeur médiane	20.0	23.0	24.0	19.0	27.0	19.0	16.0	16.5	20.0
3e quartile	25.0	30.0	28.0	22.0	35.0	19.0	17.0	19.0	23.0
<b>N*</b>	<b>717</b>	<b>44</b>	<b>103</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>375</b>	<b>40</b>	<b>3</b>
données manquantes	1 214	97	261	30	30	3	552	41	14
<b>Age lors du début de la consommation problématique</b>									
moyenne	31.6	26.7	26.1	22.3	34.2	20.0	17.3	21.4	32.1
écart-type	12.8	10.0	7.6	7.2	14.4		4.4	11.1	13.5
1er quartile	21.0	20.0	20.0	18.0	24.0	20.0	15.0	15.0	18.0
valeur médiane	30.0	24.0	25.0	21.0	30.5	20.0	16.0	19.0	31.0
3e quartile	40.0	31.0	30.0	25.0	42.0	20.0	18.0	20.0	46.0
<b>N*</b>	<b>1 084</b>	<b>75</b>	<b>223</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>558</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
données manquantes	847	66	141	17	19	3	369	40	10
<b>Période de latence (en années)**</b>									
moyenne	26.4	5.8	11.2	4.6	21.8	2.2	4.7	13.6	14.8
écart-type	13.4	6.4	8.5	5.5	29.4		6.4	15.9	18.1
1er quartile	16.2	2.2	4.4	1.1	1.2	2.2	1.3	1.7	0.7
valeur médiane	25.1	3.6	10.0	1.9	8.7	2.2	2.3	4.8	10.0
3e quartile	35.6	5.6	15.9	4.7	55.4	2.2	4.8	20.5	28.8
<b>N*</b>	<b>415</b>	<b>13</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>410</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
données manquantes	290	7	48	8	3	1	182	18	6

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

**T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), femmes**

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
<b>Age lors de la première consommation</b>										
moyenne	18.0	21.7	20.9	17.4	31.5	-	15.0	16.1	13.0	
écart-type	6.2	7.8	5.7	5.5	12.8	-	2.1	3.5	-	
1er quartile	15.0	17.0	16.0	14.0	21.5	-	14.0	14.0	-	
valeur médiane	16.0	20.0	19.0	15.5	29.0	-	15.0	16.0	13.0	
3e quartile	19.0	22.0	25.0	19.0	37.5	-	16.0	17.5	-	
<b>N*</b>	<b>432</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	
données manquantes	425	26	14	10	21	1	86	19	3	
<b>Age lors du début de la consommation régulière</b>										
moyenne	27.0	20.8	23.4	19.1	36.7	-	15.8	18.5	-	
écart-type	10.2	5.4	6.0	8.7	14.4	-	2.4	4.7	-	
1er quartile	20.0	18.0	19.0	14.0	30.0	-	14.0	15.0	-	
valeur médiane	25.0	20.5	23.0	15.0	30.5	-	15.0	18.0	-	
3e quartile	33.0	21.0	27.0	22.5	54.0	-	16.0	20.0	-	
<b>N*</b>	<b>321</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	
données manquantes	536	41	37	16	31	1	145	29	4	
<b>Age lors du début de la consommation problématique</b>										
moyenne	35.5	23.1	22.8	21.4	34.5	-	16.7	21.5	17.0	
écart-type	13.2	8.4	6.3	10.5	12.6	-	4.0	9.0	-	
1er quartile	25.0	18.0	18.0	15.0	26.0	-	15.0	15.0	-	
valeur médiane	35.0	21.0	21.0	17.0	30.0	-	16.0	18.0	17.0	
3e quartile	44.0	23.0	25.0	19.0	42.0	-	17.0	26.0	-	
<b>N*</b>	<b>498</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	
données manquantes	359	29	14	11	15	1	98	26	3	
<b>Période de latence (en années)**</b>										
moyenne	27.6	8.4	4.5	4.9	5.2	-	4.2	22.3	5.1	
écart-type	13.7	11.5	3.2	5.0	5.5	-	6.8	17.8	-	
1er quartile	17.3	0.5	1.7	1.2	2.0	-	1.0	4.1	-	
valeur médiane	27.1	4.4	4.3	2.7	3.2	-	1.6	19.8	5.1	
3e quartile	37.9	16.4	6.6	7.9	8.5	-	3.6	39.0	-	
<b>N*</b>	<b>173</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	
données manquantes	119	4	5	3	4	1	45	15	1	

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

## T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2019), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
<b>Age lors de la première consommation</b>										
moyenne	16.7	23.4	21.0	19.2	30.2	18.0	15.1	15.9	19.0	
écart-type	4.9	9.1	6.2	6.4	13.7	-	2.2	3.1	4.2	
1er quartile	15.0	17.0	17.0	15.0	20.0	-	14.0	14.0	16.0	
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	16.0	19.0	
3e quartile	18.0	26.0	23.0	20.0	35.5	-	16.0	18.0	23.0	
<b>N*</b>	<b>1 442</b>	<b>108</b>	<b>264</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>765</b>	<b>105</b>	<b>6</b>	
données manquantes	1 346	92	156	27	42	4	392	51	15	
<b>Age lors du début de la consommation régulière</b>										
moyenne	23.9	25.2	24.5	19.4	31.6	19.0	16.2	18.2	20.3	
écart-type	9.4	9.8	6.9	5.7	12.0	-	2.7	5.6	2.5	
1er quartile	18.0	19.0	20.0	15.0	23.0	-	15.0	15.0	18.0	
valeur médiane	20.0	21.0	23.5	18.0	30.0	19.0	16.0	17.0	20.0	
3e quartile	28.0	29.0	28.0	22.0	35.0	-	16.0	20.0	23.0	
<b>N*</b>	<b>1 038</b>	<b>62</b>	<b>122</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>460</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	
données manquantes	1 750	138	298	46	61	4	697	70	18	
<b>Age lors du début de la consommation problématique</b>										
moyenne	32.8	25.7	25.6	22.0	34.4	20.0	17.2	21.5	30.3	
écart-type	13.0	9.7	7.5	8.1	13.3	-	4.3	10.0	13.6	
1er quartile	22.0	19.0	20.0	17.0	25.0	-	15.0	15.0	17.5	
valeur médiane	30.0	23.0	25.0	19.0	30.0	20.0	16.0	19.0	27.0	
3e quartile	40.0	30.0	30.0	25.0	42.0	-	17.0	25.0	45.0	
<b>N*</b>	<b>1 582</b>	<b>105</b>	<b>265</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>690</b>	<b>90</b>	<b>8</b>	
données manquantes	1 206	95	155	28	34	4	467	66	13	
<b>Période de latence (en années)**</b>										
moyenne	26.7	6.5	10.3	4.7	12.3	2.2	4.6	18.1	12.8	
écart-type	13.5	7.5	8.3	5.1	19.5	-	6.4	17.4	16.2	
1er quartile	16.6	1.7	3.7	1.1	1.2	-	1.2	2.4	1.0	
valeur médiane	25.6	3.6	8.8	1.9	3.5	2.2	2.2	14.7	5.1	
3e quartile	36.3	6.1	14.0	7.9	13.4	-	4.6	29.8	19.0	
<b>N*</b>	<b>588</b>	<b>17</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>498</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	
données manquantes	409	11	53	11	7	2	227	33	7	

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

**T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), hommes**

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
<b>Age lors de la première apparition</b>				
moyenne	22.1	21.4	10.0	15.4
écart-type	6.2	14.7	5.4	9.3
1er quartile	18.0	14.0	4.0	12.0
valeur médiane	20.0	15.0	12.0	13.0
3e quartile	25.0	29.0	14.0	16.0
<b>N*</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
<i>données manquantes</i>	69	46	4	56
<b>Age lors du début de l'apparition régulière</b>				
moyenne	27.3	16.1	15.3	16.9
écart-type	8.8	4.0	4.1	9.5
1er quartile	21.0	14.0	12.0	12.0
valeur médiane	25.0	15.0	13.0	14.0
3e quartile	32.0	16.0	20.0	16.0
<b>N*</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>51</b>
<i>données manquantes</i>	96	56	4	58
<b>Age lors du début de l'apparition problématique</b>				
moyenne	28.0	22.9	15.6	19.7
écart-type	8.5	14.1	4.0	10.9
1er quartile	20.5	15.0	12.0	14.0
valeur médiane	27.0	16.5	14.0	15.0
3e quartile	33.0	32.0	20.0	20.0
<b>N*</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>63</b>
<i>données manquantes</i>	58	41	4	46
<b>Période de latence (en années)**</b>				
moyenne	11.3	5.7	3.9	6.3
écart-type	9.3	4.2	2.9	7.7
1er quartile	3.9	2.8	1.7	2.0
valeur médiane	8.5	4.9	3.6	3.3
3e quartile	17.6	6.7	6.1	7.9
<b>N*</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
<i>données manquantes</i>	32	24	2	29

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

## T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
<b>Age lors de la première apparition</b>					
moyenne	22.8	42.0	15.5	21.2	
écart-type	11.2	29.7	5.2	11.6	
1er quartile	18.0	21.0	14.0	15.0	
valeur médiane	19.5	42.0	15.5	16.0	
3e quartile	26.5	63.0	17.0	28.0	
<b>N*</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	
données manquantes	23	5	33	23	
<b>Age lors du début de l'apparition régulière</b>					
moyenne	26.4	42.5	19.3	21.3	
écart-type	6.3	29.0	8.3	10.4	
1er quartile	21.0	22.0	15.0	14.0	
valeur médiane	26.0	42.5	16.0	18.5	
3e quartile	30.0	63.0	20.0	25.0	
<b>N*</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	
données manquantes	26	5	38	22	
<b>Age lors du début de l'apparition problématique</b>					
moyenne	32.4	42.5	20.4	23.7	
écart-type	15.3	29.0	8.6	12.4	
1er quartile	23.0	22.0	16.0	15.0	
valeur médiane	27.0	42.5	17.0	20.0	
3e quartile	46.0	63.0	23.5	28.0	
<b>N*</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	
données manquantes	20	5	29	17	
<b>Période de latence (en années)**</b>					
moyenne	18.0	2.1	6.8	6.4	
écart-type	21.7	2.7	9.3	6.2	
1er quartile	6.0	0.2	1.0	1.7	
valeur médiane	8.9	2.1	3.4	3.8	
3e quartile	29.9	4.0	8.4	10.2	
<b>N*</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	
données manquantes	14	0	17	11	

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

## T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2019), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal					
<i>Hommes et femmes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
<b>Age lors de la première apparition</b>					
moyenne	22.2	23.6	14.8	16.8	
écart-type	7.0	16.9	5.5	10.1	
1er quartile	18.0	14.0	14.0	12.0	
valeur médiane	20.0	15.0	15.0	14.0	
3e quartile	25.0	30.0	17.0	18.0	
<b>N*</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	
<i>données manquantes</i>	92	51	37	79	
<b>Age lors du début de l'apparition régulière</b>					
moyenne	27.1	22.0	18.8	18.1	
écart-type	8.3	15.9	7.9	9.9	
1er quartile	21.0	15.0	15.0	13.0	
valeur médiane	25.0	15.0	16.0	15.0	
3e quartile	32.0	22.0	20.0	20.0	
<b>N*</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	
<i>données manquantes</i>	122	61	42	80	
<b>Age lors du début de l'apparition problématique</b>					
moyenne	28.6	24.5	19.8	20.7	
écart-type	9.8	15.7	8.4	11.4	
1er quartile	21.0	15.0	15.0	14.0	
valeur médiane	27.0	17.0	17.0	15.5	
3e quartile	33.0	33.0	23.0	23.0	
<b>N*</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>86</b>	
<i>données manquantes</i>	78	46	33	63	
<b>Période de latence (en années)**</b>					
moyenne	11.9	5.2	6.4	6.3	
écart-type	10.8	4.2	8.8	7.3	
1er quartile	3.9	2.4	1.0	1.9	
valeur médiane	8.5	4.0	3.4	3.3	
3e quartile	17.6	6.7	7.5	8.2	
<b>N*</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	
<i>données manquantes</i>	46	24	19	40	

\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

\*\* Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

**T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2019)**

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Mode d'administration*</b>															
injection	13.1	7.7	11.5	3.4	9.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	57.4	53.8	56.3	11.0	7.0	10.5	16.7	18.2	17.2	98.3	97.3	98.1	3.4	4.3	3.8
ingestion (manger/boire)	4.9	11.5	6.9	1.9	2.3	2.0	33.3	27.3	31.0	0.9	1.1	1.0	96.6	91.3	94.2
sniff	24.6	26.9	25.3	82.5	81.4	82.4	50.0	36.4	44.8	0.5	0.5	0.5	0.0	4.3	1.9
autre	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	18.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>263</b>	<b>43</b>	<b>306</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>759</b>	<b>186</b>	<b>945</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>52</b>
<i>données manquantes</i>	51	22	73	85	10	95	10	4	14	168	44	212	4	6	10

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

**T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)**

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Injections au cours de la vie*</b>																
oui	3.6	3.6	3.6	30.4	23.7	28.5	6.7	19.5	8.7	1.0	1.7	1.1	4.0	3.8	3.9	154
non	94.8	95.0	94.9	63.0	63.2	63.1	91.5	78.0	89.4	96.3	96.1	96.3	94.1	94.0	94.0	3 696
ne veut pas répondre	1.6	1.5	1.5	6.5	13.2	8.5	1.8	2.4	1.9	2.7	2.2	2.6	1.9	2.3	2.0	80
<b>N**</b>	<b>1 394</b>	<b>616</b>	<b>2 010</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>130</b>	<b>224</b>	<b>41</b>	<b>265</b>	<b>736</b>	<b>178</b>	<b>914</b>	<b>2 822</b>	<b>1 108</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>
données manquantes	537	241	778	49	21	70	140	15	155	191	52	243	1 041	399	1 440	1 440
<b>Injections au cours des 12 derniers mois*</b>																
oui	2.1	2.1	2.1	16.1	26.3	18.7	11.8	45.5	17.7	0.0	0.0	0.0	3.9	6.2	4.5	33
non	97.9	97.9	97.9	83.9	73.7	81.3	88.2	54.5	82.3	100.0	100.0	100.0	96.1	93.8	95.5	707
<b>N**</b>	<b>234</b>	<b>96</b>	<b>330</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>119</b>	<b>37</b>	<b>156</b>	<b>545</b>	<b>195</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
données manquantes	1 697	761	2 458	85	40	125	313	45	358	808	193	1 001	3 318	1 312	4 630	4 630
<b>Injections au cours des 30 derniers jours*</b>																
oui	1.4	2.1	1.6	12.5	21.1	14.9	8.3	22.2	10.5	0.0	0.0	0.0	2.5	4.2	3.0	21
non	98.6	97.9	98.4	87.5	78.9	85.1	91.7	77.8	89.5	100.0	100.0	100.0	97.5	95.8	97.0	688
<b>N**</b>	<b>220</b>	<b>95</b>	<b>315</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>152</b>	<b>518</b>	<b>191</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
données manquantes	1 711	762	2 473	93	40	133	316	47	363	811	194	1 005	3 345	1 316	4 661	4 661
<b>Echange de matériel d'injection au cours de la vie***</b>																
oui	42.9	60.0	47.4	8.3	0.0	6.7	28.6	75.0	45.5	33.3	-	33.3	28.2	50.0	33.3	17
non	57.1	40.0	52.6	83.3	100.0	86.7	71.4	25.0	54.5	66.7	-	66.7	69.2	50.0	64.7	33
ne veut pas répondre	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0	-	0.0	2.6	0.0	2.0	1
<b>N**</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
données manquantes	35	17	52	16	6	22	8	4	12	4	3	7	72	30	102	102
<b>Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****</b>																
oui	0.0	9.1	3.4	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2.9	5.3	3.7	2
non	100.0	90.9	96.6	80.0	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	97.1	94.7	96.3	52
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
données manquantes	31	11	42	23	5	28	11	5	16	5	2	7	76	23	99	99
<b>Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****</b>																
oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>N**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
données manquantes	49	22	71	28	9	37	15	8	23	7	3	10	111	42	153	153

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\*\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible



## T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Age lors de la première injection*</b>																
jusqu'à 14 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	4.0	16.7	0.0	10.0	33.3	0.0	25.0	3.4	4.5	3.7	3
de 15 à 16 ans	3.8	10.0	5.6	22.2	14.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	8.5	13.6	9.9	8
de 17 à 18 ans	34.6	30.0	33.3	27.8	14.3	24.0	33.3	50.0	40.0	33.3	0.0	25.0	30.5	27.3	29.6	24
de 19 à 20 ans	7.7	10.0	8.3	22.2	28.6	24.0	33.3	25.0	30.0	0.0	0.0	0.0	15.3	18.2	16.0	13
de 21 à 25 ans	26.9	30.0	27.8	11.1	14.3	12.0	16.7	25.0	20.0	33.3	0.0	25.0	25.4	22.7	24.7	20
de 26 à 30 ans	15.4	10.0	13.9	5.6	14.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	9.1	8.6	7
de 31 à 39 ans	7.7	10.0	8.3	11.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.5	6.2	5
dès 40 ans	3.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.2	1
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<i>données manquantes</i>	24	12	36	10	2	12	9	4	13	4	2	6	53	20	73	73

\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

## T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), hommes

## Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Autres problèmes*</b>									
alcool	-	26.3	29.3	14.0	30.8	0.0	11.6	12.8	17.6
héroïne	1.0	4.4	3.4	4.0	2.6	0.0	0.3	0.0	5.9
méthadone	0.2	8.0	0.3	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	11.8
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	2.9	0.3	2.0	2.6	0.0	0.4	0.0	5.9
cocaïne en poudre	5.9	27.7	2.0	20.0	15.4	33.3	7.3	0.0	5.9
crack	0.2	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.1	5.1	4.2	6.0	2.6	0.0	3.5	0.0	0.0
méthamphétamines	0.1	2.9	1.4	10.0	2.6	0.0	0.4	0.0	5.9
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.9	3.6	6.2	8.0	0.0	33.3	3.4	1.3	5.9
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
barbituriques	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.1	15.3	3.1	2.0	2.6	0.0	2.0	2.6	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0	1.5	1.3	5.9
kétamine	0.1	0.7	0.6	0.0	2.6	0.0	0.1	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cannabis	7.4	27.0	23.1	18.0	15.4	0.0	-	17.9	5.9
tabac	14.4	16.1	17.7	10.0	15.4	0.0	12.8	-	0.0
autre substance	0.2	1.5	1.1	2.0	5.1	0.0	0.2	1.3	0.0
jeu pathologique	0.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	5.1	5.9
troubles alimentaires	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	78.6	41.6	52.7	66.0	43.6	66.7	78.5	74.4	52.9
<b>N**</b>	<b>1 789</b>	<b>137</b>	<b>355</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>895</b>	<b>78</b>	<b>17</b>
<i>données manquantes</i>	142	4	9	1	2	1	32	3	0

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

**T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), femmes**
**Femmes**

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Autres problèmes*</b>									
alcool	-	16.1	16.7	21.7	20.0	0.0	9.9	12.2	0.0
héroïne	1.1	1.8	5.6	0.0	5.7	0.0	0.4	0.0	25.0
méthadone	0.4	8.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.4	1.8	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.9	21.4	3.7	21.7	14.3	0.0	5.4	0.0	50.0
crack	0.0	3.6	1.9	0.0	2.9	0.0	0.4	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.0	5.4	5.6	0.0	2.9	0.0	6.3	1.4	0.0
méthamphétamines	0.4	3.6	0.0	0.0	2.9	0.0	0.9	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	1.8	3.7	13.0	0.0	0.0	6.3	0.0	25.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.4	10.7	7.4	4.3	0.0	0.0	1.3	2.7	0.0
GHB/GBL	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	1.8	1.9	8.7	0.0	0.0	2.7	0.0	25.0
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	25.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	4.3	0.0	100.0	0.4	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
cannabis	4.0	12.5	24.1	21.7	8.6	0.0	-	9.5	25.0
tabac	10.9	12.5	18.5	13.0	14.3	0.0	12.1	-	25.0
autre substance	0.5	5.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
troubles alimentaires	1.1	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.3	51.8	61.1	65.2	54.3	0.0	79.4	78.4	50.0
<b>N**</b>	<b>795</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>223</b>	<b>74</b>	<b>4</b>
<i>données manquantes</i>	<i>62</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2019), hommes et femmes

## Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Autres problèmes*</b>									
alcool	-	23.3	27.6	16.4	25.7	0.0	11.3	12.5	14.3
héroïne	1.0	3.6	3.7	2.7	4.1	0.0	0.4	0.0	9.5
méthadone	0.2	8.3	0.5	0.0	2.7	0.0	0.1	0.7	9.5
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.2	2.6	0.2	1.4	2.7	0.0	0.4	0.0	4.8
cocaïne en poudre	5.0	25.9	2.2	20.5	14.9	25.0	6.9	0.0	14.3
crack	0.2	2.1	1.5	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	1.1	5.2	4.4	4.1	2.7	0.0	4.0	0.7	0.0
méthamphétamines	0.2	3.1	1.2	6.8	2.7	0.0	0.5	0.0	4.8
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.7	3.1	5.9	9.6	0.0	25.0	3.9	0.7	9.5
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
barbituriques	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.5	14.0	3.7	2.7	1.4	0.0	1.9	2.6	0.0
GHB/GBL	0.0	0.5	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.5	2.4	4.1	0.0	0.0	1.7	0.7	9.5
kétamine	0.1	0.5	0.5	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	4.8
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.2	2.7	0.0	25.0	0.5	0.7	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
cannabis	6.3	22.8	23.2	19.2	12.2	0.0	-	13.8	9.5
tabac	13.4	15.0	17.8	11.0	14.9	0.0	12.7	-	4.8
autre substance	0.3	2.6	1.0	1.4	4.1	0.0	0.2	0.7	0.0
jeu pathologique	0.3	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	4.8
troubles alimentaires	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0
autre comportement de type addictif	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	80.4	44.6	53.8	65.8	48.6	50.0	78.7	76.3	52.4
<b>N**</b>	<b>2 584</b>	<b>193</b>	<b>409</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>1 118</b>	<b>152</b>	<b>21</b>
<i>données manquantes</i>	204	7	11	2	4	1	39	4	0

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), hommes

## Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
<b>Autres problèmes*</b>				
alcool	3.5	3.2	10.0	1.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.6	0.0	0.0	1.9
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.8	4.8	10.0	0.0
tabac	3.5	4.8	0.0	1.0
autre substance	0.0	1.6	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	5.3	-	10.0	6.7
troubles alimentaires	0.0	1.6	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	1.6	0.0	-
aucun autre problème addictif	87.7	87.1	90.0	91.3
<b>N**</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>104</b>
données manquantes	4	1	1	5

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), femmes

## Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeux pathologiques	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
<b>Autres problèmes*</b>				
alcool	10.7	14.3	4.9	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	2.4	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.6	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	1.2	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	2.4	0.0
tabac	3.6	14.3	0.0	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	2.8
jeu pathologique	-	0.0	0.0	2.8
dépendances aux ordinateurs/Internet	3.6	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	2.8
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	-
aucun autre problème addictif	78.6	85.7	93.9	91.7
<b>N**</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>36</b>
<i>données manquantes</i>	3	0	3	4

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2019), hommes et femmes

## Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
<b>Autres problèmes*</b>				
alcool	4.9	4.3	5.4	0.7
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.1	0.0	2.2	1.4
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.7	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	1.1	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.4	4.3	3.3	0.0
tabac	3.5	5.8	0.0	0.7
autre substance	0.0	1.4	0.0	0.7
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.7
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.9	-	1.1	5.0
troubles alimentaires	0.0	1.4	-	0.7
autre comportement de type addictif	0.0	1.4	0.0	-
aucun autre problème addictif	85.9	87.0	93.5	91.4
<b>N**</b>	<b>142</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>140</b>
données manquantes	7	1	4	9

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Alcool*</b>	<b>Opioides</b>			<b>Cocaïne et dérivés</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotiques/sédatifs</b>			<b>comportement addictif</b>						
chaque jour	22.7	66.7	32.1	22.2	14.3	21.6	11.0	10.5	10.9	0.0	25.0	8.3	0.0	20.0	8.3	15.6	25.0	17.4	48
4 à 6 jours par semaine	13.6	0.0	10.7	21.0	14.3	20.5	6.6	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	16.7	13.4	1.9	11.2	31
2 à 3 jours par semaine	27.3	16.7	25.0	24.7	57.1	27.3	27.5	15.8	25.5	25.0	0.0	16.7	28.6	40.0	33.3	26.8	21.2	25.7	71
1 jour par semaine ou moins	18.2	0.0	14.3	19.8	0.0	18.2	30.8	52.6	34.5	25.0	50.0	33.3	28.6	40.0	33.3	25.9	34.6	27.5	76
aucune consomm.	18.2	16.7	17.9	12.3	14.3	12.5	24.2	21.1	23.6	50.0	25.0	41.7	14.3	0.0	8.3	18.3	17.3	18.1	50
<b>N**</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>224</b>	<b>52</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
données manquantes	119	53	172	283	49	332	836	211	1 047	33	33	66	294	158	452	3 896	2 280	6 176	6 176
<b>Opioides*</b>	<b>Alcool</b>			<b>Cocaïne et dérivés</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotiques/sédatifs</b>			<b>comportement addictif</b>						
chaque jour	23.1	12.5	19.0	33.3	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	26.9	8.3	21.1	8
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	25.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	100.0	100.0	-	-	-	0.0	25.0	7.9	3
1 jour par semaine ou moins	7.7	0.0	4.8	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	7.7	0.0	5.3	2
aucune consomm.	69.2	62.5	66.7	55.6	100.0	63.6	100.0	100.0	100.0	-	0.0	0.0	-	-	-	65.4	66.7	65.8	25
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
données manquantes	1 918	849	2 767	355	54	409	925	229	1 154	41	36	77	301	163	464	4 094	2 320	6 414	6 414
<b>Cocaïne et dérivés*</b>	<b>Alcool</b>			<b>Opioides</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotiques/sédatifs</b>			<b>comportement addictif</b>						
chaque jour	8.4	0.0	7.0	16.7	0.0	12.5	1.9	8.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	2.4	5.8	13
4 à 6 jours par semaine	2.4	0.0	2.0	4.2	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.2	5
2 à 3 jours par semaine	9.6	23.5	12.0	20.8	25.0	21.9	5.6	0.0	4.5	40.0	0.0	33.3	60.0	0.0	42.9	13.8	14.3	13.9	31
1 jour par semaine ou moins	31.3	11.8	28.0	33.3	50.0	37.5	27.8	50.0	31.8	20.0	0.0	16.7	40.0	50.0	42.9	30.9	33.3	31.4	70
aucune consomm.	48.2	64.7	51.0	25.0	12.5	21.9	64.8	41.7	60.6	20.0	100.0	33.3	0.0	50.0	14.3	46.4	47.6	46.6	104
<b>N**</b>	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>181</b>	<b>42</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
données manquantes	1 848	840	2 688	117	51	168	873	218	1 091	36	36	72	296	161	457	3 939	2 290	6 229	6 229
<b>Cannabis*</b>	<b>Alcool</b>			<b>Opioides</b>			<b>Cocaïne et dérivés</b>			<b>Hypnotiques/sédatifs</b>			<b>comportement addictif</b>						
chaque jour	36.7	29.0	35.1	53.6	80.0	57.6	43.9	70.0	47.4	60.0	33.3	50.0	50.0	0.0	33.3	41.6	41.9	41.7	128
4 à 6 jours par semaine	4.2	12.9	6.0	10.7	0.0	9.1	10.6	0.0	9.2	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	6.9	6.5	6.8	21
2 à 3 jours par semaine	18.3	16.1	17.9	10.7	20.0	12.1	9.1	20.0	10.5	0.0	33.3	12.5	0.0	50.0	16.7	13.5	17.7	14.3	44
1 jour par semaine ou moins	8.3	16.1	9.9	3.6	0.0	3.0	16.7	10.0	15.8	0.0	33.3	12.5	25.0	50.0	33.3	10.2	19.4	12.1	37
aucune consomm.	32.5	25.8	31.1	21.4	0.0	18.2	19.7	0.0	17.1	20.0	0.0	12.5	25.0	0.0	16.7	27.8	14.5	25.1	77
<b>N**</b>	<b>120</b>	<b>31</b>	<b>151</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>245</b>	<b>62</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
données manquantes	1 811	826	2 637	113	54	167	298	46	344	36	34	70	297	161	458	3 875	2 270	6 145	6 145

\* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu



## T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Autres stimulants*</b>																			
chaque jour	5.6	0.0	3.8	16.7	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.3	7.1	9.3	-	-	-	7.5	3.8	6.5	6
4 à 6 jours par semaine	5.6	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	-	-	-	3.0	0.0	2.2	2
2 à 3 jours par semaine	11.1	0.0	7.7	0.0	33.3	11.1	15.4	100.0	21.4	3.4	0.0	2.3	-	-	-	9.0	7.7	8.6	8
1 jour par semaine ou moins	27.8	12.5	23.1	50.0	0.0	33.3	23.1	0.0	21.4	13.8	21.4	16.3	-	-	-	22.4	15.4	20.4	19
aucune consomm.	50.0	87.5	61.5	33.3	66.7	44.4	61.5	0.0	57.1	69.0	71.4	69.8	-	-	-	58.2	73.1	62.4	58
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
données manquantes	1 913	849	2 762	135	56	191	351	55	406	898	216	1 114	301	163	464	4 053	2 306	6 359	6 359
<b>Hypnotiques/sédatifs*</b>																			
chaque jour	100.0	-	100.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	25.0	0.0	20.0	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	100.0	20.0	1
2 à 3 jours par semaine	0.0	-	0.0	66.7	-	66.7	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	50.0	0.0	40.0	2
1 jour par semaine ou moins	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	0.0	-	0.0	33.3	-	33.3	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	25.0	0.0	20.0	1
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
données manquantes	1 930	857	2 787	138	59	197	364	55	419	927	230	1 157	301	163	464	4 116	2 331	6 447	6 447
<b>Hallucinogènes*</b>																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.9	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.7	0.0	2.6	1
1 jour par semaine ou moins	16.7	0.0	12.5	-	0.0	0.0	25.0	100.0	33.3	9.1	33.3	17.6	-	-	-	14.8	25.0	17.9	7
aucune consomm.	83.3	100.0	87.5	-	100.0	100.0	50.0	0.0	44.4	81.8	66.7	76.5	-	-	-	74.1	75.0	74.4	29
<b>N**</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
données manquantes	1 925	855	2 780	141	58	199	356	55	411	916	224	1 140	301	163	464	4 093	2 320	6 413	6 413
<b>Autres substances*</b>																			
chaque jour	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	33.3	0.0	25.0	-	-	-	25.0	50.0	33.3	2
4 à 6 jours par semaine	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	33.3	100.0	50.0	-	-	-	25.0	50.0	33.3	2
1 jour par semaine ou moins	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	33.3	0.0	25.0	-	-	-	50.0	0.0	33.3	2
aucune consomm.	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
données manquantes	1 930	857	2 787	141	59	200	364	56	420	924	229	1 153	301	163	464	4 116	2 330	6 446	6 446

\* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fréquence de la consommation d'alcool*</b>																
jamais	8.7	7.8	8.4	11.3	17.6	12.9	15.0	13.6	14.8	13.1	29.4	16.2	13.7	15.0	14.1	370
1 fois par mois ou moins	3.1	6.0	4.0	15.1	29.4	18.6	11.0	13.6	11.4	27.9	28.4	28.0	10.9	12.9	11.5	302
2 à 4 fois par mois	6.3	6.0	6.2	30.2	11.8	25.7	22.8	22.7	22.8	41.2	29.4	39.0	17.7	12.5	16.2	427
2 à 3 fois par semaine	16.2	17.3	16.5	18.9	29.4	21.4	24.4	36.4	26.2	13.1	5.9	11.8	16.1	16.1	16.1	423
4 fois ou plus par semaine	65.7	63.0	64.9	24.5	11.8	21.4	26.8	13.6	24.8	4.6	6.9	5.0	41.6	43.5	42.1	1 108
<b>N**</b>	<b>1 056</b>	<b>486</b>	<b>1 542</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>149</b>	<b>434</b>	<b>102</b>	<b>536</b>	<b>1 878</b>	<b>752</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>
<i>données manquantes</i>	875	371	1 246	88	42	130	237	34	271	493	128	621	1 985	755	2 740	2 740
<b>Nbre de boissons standards par jour***</b>																
1 ou 2	5.5	8.6	6.5	46.7	30.8	43.1	39.6	44.4	40.3	45.3	54.5	46.8	21.3	22.0	21.5	459
3 ou 4	18.0	20.6	18.8	28.9	38.5	31.0	24.8	50.0	28.6	36.3	28.8	35.0	23.6	23.4	23.5	501
5 ou 6	24.3	25.8	24.8	6.7	15.4	8.6	14.9	0.0	12.6	10.8	12.1	11.0	19.6	20.9	20.0	426
7 à 9	21.1	24.1	22.1	4.4	0.0	3.4	12.9	5.6	11.8	4.4	4.5	4.4	14.8	18.3	15.8	337
10 ou plus	31.1	20.9	27.8	13.3	15.4	13.8	7.9	0.0	6.7	3.2	0.0	2.7	20.7	15.5	19.2	409
<b>N**</b>	<b>913</b>	<b>431</b>	<b>1 344</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>18</b>	<b>119</b>	<b>342</b>	<b>66</b>	<b>408</b>	<b>1 524</b>	<b>608</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>
<i>données manquantes</i>	1 018	426	1 444	96	46	142	263	38	301	585	164	749	2 339	899	3 238	3 238
<b>Fréquence de fortes consom. d'alcool***</b>																
jamais	11.3	13.3	11.9	43.5	46.7	44.3	32.4	42.1	33.8	50.3	67.0	53.6	27.8	31.1	28.7	677
moins d'une fois par mois	8.4	12.2	9.6	23.9	26.7	24.6	20.7	21.1	20.8	32.3	23.9	30.7	16.0	15.5	15.8	373
1 fois par mois	12.5	16.5	13.8	8.7	6.7	8.2	14.4	5.3	13.1	11.0	4.5	9.8	11.8	12.2	11.9	280
1 fois par semaine	28.8	21.7	26.6	13.0	20.0	14.8	22.5	31.6	23.8	5.0	2.3	4.4	20.2	17.1	19.3	455
presque chaque jour	39.0	36.2	38.1	10.9	0.0	8.2	9.9	0.0	8.5	1.4	2.3	1.6	24.2	24.2	24.2	570
<b>N**</b>	<b>966</b>	<b>442</b>	<b>1 408</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>130</b>	<b>362</b>	<b>88</b>	<b>450</b>	<b>1 676</b>	<b>679</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>
<i>données manquantes</i>	965	415	1 380	95	44	139	253	37	290	565	142	707	2 187	828	3 015	3 015

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2019)**

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fréquence de la consommation de tabac*</b>																
jamais	36.9	46.4	39.9	22.2	15.8	20.3	18.2	22.7	18.9	24.1	26.7	24.6	33.1	42.0	35.7	840
1 jour par semaine ou moins	0.9	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	4.9	8.6	5.7	1.9	3.0	2.3	53
2 à 3 jours par semaine	1.2	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	4.9	9.5	5.9	2.2	1.9	2.1	49
4 à 6 jours par semaine	0.7	0.5	0.7	0.0	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	3.0	1.6	0.9	1.4	33
1 fois par jour	1.7	1.6	1.7	2.2	5.3	3.1	1.7	0.0	1.4	4.2	3.4	4.1	2.4	1.7	2.2	52
plusieurs fois par jour	58.6	49.3	55.7	75.6	73.7	75.0	78.5	77.3	78.3	58.3	50.9	56.7	58.7	50.6	56.3	1 323
<b>N**</b>	<b>818</b>	<b>375</b>	<b>1 193</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>121</b>	<b>22</b>	<b>143</b>	<b>448</b>	<b>116</b>	<b>564</b>	<b>1 652</b>	<b>698</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
<i>données manquantes</i>	1 113	482	1 595	96	40	136	243	34	277	479	114	593	2 211	809	3 020	3 020
<b>Nombre de cigarettes par jour***</b>																
0 à 10	16.6	20.8	17.7	22.9	37.5	27.5	25.0	7.1	22.5	66.4	66.7	66.5	34.6	35.1	34.8	480
11 à 20	48.2	53.9	49.8	57.1	43.8	52.9	50.0	64.3	52.0	26.1	23.1	25.5	40.9	42.5	41.3	571
21 à 30	24.8	16.3	22.5	14.3	12.5	13.7	21.6	21.4	21.6	6.5	10.3	7.3	17.8	15.0	17.0	235
31 ou plus	10.4	9.0	10.0	5.7	6.3	5.9	3.4	7.1	3.9	1.0	0.0	0.8	6.7	7.4	6.9	95
<b>N**</b>	<b>471</b>	<b>178</b>	<b>649</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>88</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>307</b>	<b>78</b>	<b>385</b>	<b>1 014</b>	<b>367</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>
<i>données manquantes</i>	45	23	68	0	0	0	11	3	14	33	7	40	91	38	129	129

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

## T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), hommes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Objectif de consommation*</b>									
abstinence définitive	28.6	82.5	72.2	37.5	80.0	0.0	39.8	50.0	70.0
abstinence limitée dans le temps	23.2	0.0	6.2	0.0	10.0	100.0	13.8	5.6	0.0
consommation contrôlée	34.9	5.0	10.3	25.0	0.0	0.0	19.5	22.2	0.0
aucune limitation envisagée	1.0	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.6	10.0
pas déterminé pour l'instant	11.2	7.5	10.3	37.5	10.0	0.0	20.3	16.7	10.0
autre	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	10.0
<b>N**</b>	<b>573</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
données manquantes	1 358	101	267	43	31	3	804	63	7

## T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), femmes

<b>Objectif de consommation*</b>									
abstinence définitive	33.3	58.3	90.9	50.0	33.3	-	51.9	54.5	100.0
abstinence limitée dans le temps	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.4	9.1	0.0
consommation contrôlée	37.4	33.3	0.0	0.0	33.3	-	25.9	27.3	0.0
aucune limitation envisagée	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	3.7	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	7.8	8.3	9.1	50.0	33.3	-	11.1	0.0	0.0
autre	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	9.1	0.0
<b>N**</b>	<b>243</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
données manquantes	614	47	45	22	31	1	203	64	3

## T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2019), hommes et femmes

<b>Objectif de consommation*</b>									
abstinence définitive	30.0	76.9	74.1	40.0	62.5	0.0	42.0	51.7	72.7
abstinence limitée dans le temps	21.9	0.0	5.6	0.0	6.3	100.0	12.7	6.9	0.0
consommation contrôlée	35.7	11.5	9.3	20.0	12.5	0.0	20.7	24.1	0.0
aucune limitation envisagée	1.2	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.3	3.4	9.1
pas déterminé pour l'instant	10.2	7.7	10.2	40.0	18.8	0.0	18.7	10.3	9.1
autres	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	9.1
<b>N**</b>	<b>816</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>29</b>	<b>11</b>
données manquantes	1 972	148	312	65	62	4	1 007	127	10

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), hommes

## Hommes

	Patients: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problèmes psychiques*</b>									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	25.2	22.0	39.7	12.5	27.3	0.0	18.4	27.8	16.7
états anxieux/tension nerv. importants	22.9	29.3	28.8	12.5	54.5	50.0	20.2	16.7	33.3
diffic. compréhension/mémoire	8.3	14.6	11.0	0.0	9.1	0.0	9.6	5.6	16.7
altération de l'attention ou hyperactivité	8.5	17.1	17.8	12.5	9.1	0.0	12.3	11.1	16.7
pensées obsessionnelles/actions compulsives	0.5	14.6	5.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	9.2	7.3	6.8	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	8.3
hallucinations	1.7	7.3	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	8.3
diffic. à contrôler comportement violent	8.3	7.3	16.4	0.0	36.4	0.0	6.1	16.7	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	22.4	24.4	19.2	25.0	45.5	0.0	14.0	27.8	33.3
pensées suicidaires sérieuses	8.5	9.8	9.6	25.0	27.3	0.0	7.0	16.7	8.3
tentatives de suicide	2.1	7.3	5.5	0.0	9.1	0.0	2.6	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.0	4.9	5.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
aucun	43.2	51.2	39.7	37.5	9.1	50.0	57.9	44.4	25.0
<b>N**</b>	<b>424</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
<i>données manquantes</i>	<i>1 507</i>	<i>100</i>	<i>291</i>	<i>43</i>	<i>30</i>	<i>2</i>	<i>813</i>	<i>63</i>	<i>5</i>

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), femmes

## Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problèmes psychiques*</b>									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	44.6	38.5	81.8	100.0	50.0	-	29.6	50.0	33.3
états anxieux/tension nerv. importants	29.9	46.2	45.5	50.0	83.3	-	25.9	50.0	66.7
diffic. compréhension/mémoire	13.6	7.7	9.1	50.0	16.7	-	7.4	20.0	33.3
altération de l'attention ou hyperactivité	12.5	7.7	18.2	50.0	16.7	-	11.1	20.0	33.3
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.6	7.7	0.0	0.0	16.7	-	11.1	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	8.2	7.7	0.0	0.0	0.0	-	7.4	10.0	0.0
hallucinations	3.3	15.4	9.1	0.0	0.0	-	3.7	20.0	33.3
diffic. à contrôler comportement violent	10.9	15.4	9.1	0.0	16.7	-	7.4	0.0	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	37.0	46.2	36.4	50.0	33.3	-	25.9	70.0	33.3
pensées suicidaires sérieuses	10.9	7.7	0.0	0.0	33.3	-	7.4	40.0	0.0
tentatives de suicide	3.8	7.7	9.1	0.0	33.3	-	3.7	10.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	5.4	7.7	0.0	0.0	0.0	-	3.7	0.0	0.0
aucun	26.6	38.5	9.1	0.0	16.7	-	40.7	10.0	33.3
<b>N**</b>	<b>184</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
données manquantes	673	46	45	22	31	1	203	65	1

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2019), hommes et femmes

## Hommes &amp; femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problèmes psychiques*</b>									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	31.1	25.9	45.2	30.0	35.3	0.0	20.6	35.7	20.0
états anxieux/tension nerv. importants	25.0	33.3	31.0	20.0	64.7	50.0	21.3	28.6	40.0
diffic. compréhension/mémoire	9.9	13.0	10.7	10.0	11.8	0.0	9.2	10.7	20.0
altération de l'attention ou hyperactivité	9.7	14.8	17.9	20.0	11.8	0.0	12.1	14.3	20.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	0.8	13.0	4.8	0.0	5.9	0.0	2.8	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	8.9	7.4	6.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.6	6.7
hallucinations	2.1	9.3	3.6	0.0	0.0	0.0	2.1	7.1	13.3
diffic. à contrôler comportement violent	9.0	9.3	15.5	0.0	29.4	0.0	6.4	10.7	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	26.8	29.6	21.4	30.0	41.2	0.0	16.3	42.9	33.3
pensées suicidaires sérieuses	9.2	9.3	8.3	20.0	29.4	0.0	7.1	25.0	6.7
tentatives de suicide	2.6	7.4	6.0	0.0	17.6	0.0	2.8	3.6	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.4	5.6	4.8	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
aucun	38.2	48.1	35.7	30.0	11.8	50.0	54.6	32.1	26.7
<b>N**</b>	<b>608</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>141</b>	<b>28</b>	<b>15</b>
<i>données manquantes</i>	<i>2 180</i>	<i>146</i>	<i>336</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	<i>3</i>	<i>1 016</i>	<i>128</i>	<i>6</i>

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

## T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2019)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
<b>Lien avec la tierce personne*</b>				
mère/père	37.9	37.6	37.7	406
filles/fils	14.8	10.7	11.7	126
sœur/frère	6.3	5.0	5.3	57
conjoint-e/partenaire	28.5	39.8	37.1	400
autre proche/parent-e	1.2	2.7	2.3	25
collègue/ami-e	4.7	1.2	2.0	22
employeur/se, enseignant-e	2.3	0.6	1.0	11
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.1	0.1	1
autre	4.3	2.3	2.8	30
<b>N**</b>	<b>256</b>	<b>822</b>	<b>1 078</b>	<b>1 078</b>
<i>données manquantes</i>	1	3	4	4

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)



## T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2019)

Proches		
	Total	
	%	N
<b>Problème principal de la tierce personne*</b>		
alcool	55.1	331
héroïne	1.2	7
méthadone	0.0	0
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.3	2
cocaïne en poudre	9.7	58
crack	0.3	2
autre forme de cocaïne	0.0	0
amphétamines	1.2	7
méthamphétamines	0.2	1
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.7	4
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.2	1
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.2	1
GHB/GBL	0.2	1
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1
LSD	0.2	1
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.2	1
cannabis	20.5	123
tabac	0.3	2
autre substance	1.0	6
jeu pathologique	1.8	11
dépendances aux ordinateurs/Internet	5.2	31
troubles alimentaires	0.2	1
autre comportement de type addictif	1.5	9
<b>N**</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<i>données manquantes</i>	<i>481</i>	<i>481</i>

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sexe*</b>																			
hommes			69.9			74.5			85.2			82.7			24.2			65.4	4 084
femmes			30.1			25.5			14.8			17.3			75.8			34.6	2 160
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>242</b>	<b>758</b>	<b>1 000</b>	<b>4 084</b>	<b>2 160</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>
<b>Age (en années)*</b>																			
jusqu'à 14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.9	3.5	1.7	0.5	0.8	1.2	1.2	1.2	75
15-19	1.1	1.4	1.2	0.7	2.0	1.0	1.6	9.3	2.7	59.2	59.7	59.3	3.0	2.1	2.3	16.3	8.9	13.8	857
20-24	3.5	2.1	3.1	4.7	5.9	5.0	11.3	13.0	11.5	12.5	11.5	12.4	4.2	4.8	4.7	7.1	5.1	6.4	400
25-29	7.5	4.3	6.5	6.7	7.8	7.0	18.7	22.2	19.2	8.7	4.7	8.0	6.3	6.1	6.2	9.2	6.2	8.2	511
30-34	9.6	6.9	8.8	15.4	21.6	17.0	20.3	18.5	20.1	5.9	4.7	5.7	5.9	8.2	7.7	9.8	8.1	9.2	575
35-39	11.3	10.9	11.2	14.8	13.7	14.5	21.9	16.7	21.2	4.9	5.8	5.1	7.2	10.8	9.9	10.4	10.5	10.4	650
40-44	11.0	9.6	10.6	13.4	13.7	13.5	11.9	7.4	11.3	2.4	1.6	2.3	7.6	11.7	10.7	8.8	9.4	9.0	562
45-49	12.9	11.5	12.5	16.8	2.0	13.0	5.5	1.9	4.9	2.0	1.6	1.9	13.9	17.6	16.7	9.4	11.6	10.2	633
50-54	14.7	16.7	15.3	11.4	19.6	13.5	5.8	9.3	6.3	1.0	0.5	0.9	16.9	16.5	16.6	9.9	14.1	11.4	708
55-59	12.3	15.1	13.1	10.7	11.8	11.0	2.3	0.0	1.9	0.2	2.1	0.5	13.9	8.6	9.9	7.7	10.4	8.6	538
60-64	7.7	9.0	8.1	2.7	0.0	2.0	0.3	1.9	0.5	0.3	0.0	0.3	7.6	5.2	5.8	4.7	5.9	5.1	319
65-69	4.4	5.8	4.9	2.0	0.0	1.5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	6.8	3.7	4.4	2.9	4.1	3.3	207
70-74	2.3	4.4	2.9	0.7	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	1.7	1.3	2.7	1.8	113
75 et plus	1.5	2.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.1	2.6	1.1	1.7	1.3	83
<b>N**</b>	<b>1 956</b>	<b>843</b>	<b>2 799</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>237</b>	<b>752</b>	<b>989</b>	<b>4 077</b>	<b>2 154</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	7	6	13	13
<b>Age (valeurs centrales)</b>																			
moyenne	46.7	49.7	47.6	42.8	41.0	42.4	35.3	32.9	34.9	22.5	21.9	22.4	47.4	45.6	46.1	38.8	43.8	40.5	
écart-type	13.2	13.4	13.3	11.5	12.0	11.6	9.3	10.3	9.5	9.0	9.4	9.0	16.3	13.5	14.3	16.0	15.7	16.1	
1er quartile	36.3	39.6	37.5	33.8	31.4	33.4	28.1	25.2	28.0	17.0	16.4	16.9	37.0	36.4	36.6	25.2	32.2	27.6	
valeur médiane	47.5	51.2	48.5	42.6	39.8	41.9	34.4	31.5	34.0	18.2	18.0	18.2	50.0	46.7	47.3	38.0	45.3	40.3	
3e quartile	56.3	58.3	56.9	50.9	51.9	51.1	40.0	37.2	40.0	25.4	22.9	24.9	57.1	53.9	54.8	51.2	55.0	52.9	
<b>N**</b>	<b>1 956</b>	<b>843</b>	<b>2 799</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>754</b>	<b>995</b>	<b>4 081</b>	<b>2 156</b>	<b>6 237</b>	
données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	7	6	13	

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Etat civil*</b>																			
célibataire	42.7	31.3	39.1	67.7	85.0	71.8	67.8	70.8	68.2	93.0	87.0	91.8	25.8	26.4	26.3	60.5	42.4	54.2	1 842
marié-e	34.4	28.5	32.5	15.4	0.0	11.8	17.1	12.5	16.5	4.0	5.3	4.2	45.2	51.3	50.0	23.6	30.3	25.9	881
séparé-e	3.6	4.0	3.8	4.6	5.0	4.7	3.4	4.2	3.5	1.3	2.3	1.5	4.3	3.6	3.7	3.0	3.5	3.2	108
divorcé-e	18.6	28.5	21.7	12.3	10.0	11.8	11.0	12.5	11.2	1.8	4.6	2.3	22.6	14.2	16.0	12.3	19.1	14.7	498
veuf/veuve	0.5	7.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.2	3.9	3.5	0.5	4.2	1.8	60
partenariat enregistré	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	10
<b>N**</b>	<b>1 071</b>	<b>498</b>	<b>1 569</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>146</b>	<b>24</b>	<b>170</b>	<b>556</b>	<b>131</b>	<b>687</b>	<b>93</b>	<b>337</b>	<b>430</b>	<b>2 221</b>	<b>1 178</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399</b>
<i>données manquantes</i>	886	345	1 231	84	31	115	164	30	194	354	60	414	149	421	570	1 863	982	2 845	2 845
<b>Degré d'urbanisation*</b>																			
grands centres urbains	14.3	12.6	13.7	1.5	0.0	1.1	4.6	0.0	3.9	1.0	2.1	1.2	20.3	17.7	18.4	8.8	10.7	9.5	361
périphérie des grands centres	16.5	14.9	16.0	6.2	12.5	7.9	13.8	7.7	12.9	4.8	5.6	5.0	4.9	0.5	1.6	10.9	7.8	9.8	374
villes de moyenne importance	15.9	21.1	17.5	23.1	8.3	19.1	25.0	23.1	24.7	25.8	26.6	25.9	23.6	31.6	29.7	20.7	25.3	22.3	849
petites villes	27.5	27.7	27.6	52.3	41.7	49.4	34.9	30.8	34.3	34.1	30.8	33.5	21.1	23.9	23.2	30.5	28.4	29.8	1 134
campagne	25.8	23.7	25.2	16.9	37.5	22.5	21.7	38.5	24.2	34.3	35.0	34.4	30.1	26.2	27.1	29.0	27.7	28.5	1 086
<b>N**</b>	<b>1 220</b>	<b>549</b>	<b>1 769</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>152</b>	<b>26</b>	<b>178</b>	<b>598</b>	<b>143</b>	<b>741</b>	<b>123</b>	<b>389</b>	<b>512</b>	<b>2 482</b>	<b>1 322</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
<i>données manquantes</i>	737	294	1 031	84	27	111	158	28	186	312	48	360	119	369	488	1 602	838	2 440	2 440

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Type de ménage*</b>																			
seul-e en ménage	38.9	42.5	40.0	40.2	36.7	39.3	34.7	36.7	35.0	11.6	13.6	12.0	12.1	18.0	16.7	29.4	30.8	29.9	1 182
avec famille d'origine	6.1	2.6	5.0	13.4	23.3	16.1	15.0	13.3	14.8	69.0	52.3	66.2	14.3	5.8	7.7	25.8	12.7	21.4	848
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	47.9	49.8	48.5	20.7	33.3	24.1	36.4	46.7	37.9	9.3	13.6	10.0	69.2	72.2	71.5	35.9	48.8	40.1	1 588
avec des amis ou d'autres personnes	2.6	1.9	2.4	4.9	3.3	4.5	4.0	0.0	3.4	1.7	3.0	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	101
en prison	0.1	0.0	0.1	2.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
institution/foyer	2.7	1.9	2.5	7.3	0.0	5.4	5.2	0.0	4.4	3.6	5.3	3.9	1.1	0.6	0.7	3.1	1.8	2.7	105
hôpital/clinique	0.2	0.3	0.2	1.2	0.0	0.9	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	6
autre	1.6	1.0	1.4	9.8	3.3	8.0	4.0	3.3	3.9	4.6	12.1	5.9	1.1	0.9	1.0	3.1	3.1	3.1	121
<b>N**</b>	<b>1 289</b>	<b>588</b>	<b>1 877</b>	<b>82</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>173</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>646</b>	<b>132</b>	<b>778</b>	<b>91</b>	<b>327</b>	<b>418</b>	<b>2 647</b>	<b>1 309</b>	<b>3 956</b>	<b>3 956</b>
données manquantes	668	255	923	67	21	88	137	24	161	264	59	323	151	431	582	1 437	851	2 288	2 288
<b>Situation de domicile*</b>																			
logement stable	94.9	96.9	95.5	77.4	96.8	82.6	90.5	92.9	90.8	93.9	90.4	93.3	97.3	96.3	96.5	93.8	95.7	94.5	3 915
logement instable/SDF	2.9	1.5	2.5	11.9	3.2	9.6	5.0	3.6	4.8	2.7	5.2	3.1	2.7	3.4	3.3	3.3	2.9	3.1	130
en prison	0.1	0.0	0.1	2.4	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
institution/foyer/hôpital/autre	2.0	1.6	1.9	8.3	0.0	6.1	4.5	3.6	4.3	3.1	4.4	3.4	0.0	0.3	0.2	2.6	1.5	2.2	93
<b>N**</b>	<b>1 373</b>	<b>619</b>	<b>1 992</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>115</b>	<b>179</b>	<b>28</b>	<b>207</b>	<b>667</b>	<b>135</b>	<b>802</b>	<b>110</b>	<b>349</b>	<b>459</b>	<b>2 780</b>	<b>1 365</b>	<b>4 145</b>	<b>4 145</b>
données manquantes	584	224	808	65	20	85	131	26	157	243	56	299	132	409	541	1 304	795	2 099	2 099
<b>Type de relation de couple*</b>																			
sans partenaire, seul-e	36.7	44.5	39.2	59.2	52.9	57.6	40.0	23.5	37.8	74.3	57.8	71.2	21.6	21.5	21.5	47.4	38.9	44.3	1 181
relations temporaires	3.6	2.9	3.3	6.1	0.0	4.5	6.4	5.9	6.3	2.9	11.1	4.4	1.4	3.5	3.1	3.4	4.4	3.8	100
partenaire fixe, vivant séparé	10.8	9.1	10.3	4.1	5.9	4.5	20.0	23.5	20.5	13.0	20.0	14.3	9.5	12.7	12.0	11.3	11.9	11.5	307
partenaire fixe, ménage commun	48.9	43.5	47.2	30.6	41.2	33.3	33.6	47.1	35.4	9.9	11.1	10.1	67.6	62.3	63.4	37.9	44.9	40.4	1 075
<b>N**</b>	<b>869</b>	<b>416</b>	<b>1 285</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>127</b>	<b>385</b>	<b>90</b>	<b>475</b>	<b>74</b>	<b>284</b>	<b>358</b>	<b>1 711</b>	<b>952</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>
données manquantes	1 088	427	1 515	100	34	134	200	37	237	525	101	626	168	474	642	2 373	1 208	3 581	3 581

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Source de revenu principale*</b>																			
salaire	60.4	47.7	56.3	39.3	27.8	36.5	54.8	37.5	52.0	24.1	22.8	23.9	71.7	72.1	72.0	48.9	51.2	49.7	1 646
économies, épargne	1.4	1.7	1.5	5.4	0.0	4.1	4.0	4.2	4.1	0.0	0.0	0.0	2.7	0.3	0.8	1.2	0.9	1.1	36
rente (AVS, AI ou autre)	14.7	25.2	18.1	19.6	16.7	18.9	11.3	16.7	12.2	3.2	4.4	3.4	11.5	8.9	9.5	11.5	17.5	13.6	451
aide sociale	15.0	12.4	14.2	28.6	44.4	32.4	16.9	29.2	18.9	10.5	7.9	10.0	0.9	3.3	2.8	12.9	8.7	11.4	378
assurance-chômage	3.3	2.3	3.0	1.8	0.0	1.4	3.2	4.2	3.4	2.2	1.8	2.2	0.9	0.6	0.6	2.8	1.6	2.4	79
soutien du/de la partenaire	1.2	7.4	3.2	1.8	5.6	2.7	2.4	0.0	2.0	1.9	1.8	1.8	0.9	8.6	6.8	1.4	6.6	3.2	107
soutien parents/proches/amis	2.1	1.4	1.9	1.8	5.6	2.7	4.8	8.3	5.4	57.0	61.4	57.8	10.6	5.6	6.8	19.9	12.4	17.2	570
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
prostitution	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
assurance indemnités journalières	0.6	0.2	0.5	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	9
autre	1.3	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.6	0.0	0.5	0.9	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	30
<b>N**</b>	<b>1 021</b>	<b>484</b>	<b>1 505</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>124</b>	<b>24</b>	<b>148</b>	<b>535</b>	<b>114</b>	<b>649</b>	<b>113</b>	<b>359</b>	<b>472</b>	<b>2 133</b>	<b>1 179</b>	<b>3 312</b>	<b>3 312</b>
<i>données manquantes</i>	936	359	1 295	93	33	126	186	30	216	375	77	452	129	399	528	1 951	981	2 932	2 932
<b>Taux d'activité principal*</b>																			
activ. à plein temps (dès 70%)	58.7	34.9	51.3	33.3	25.0	31.5	56.1	47.4	54.9	15.0	9.8	14.0	71.4	51.5	56.1	44.9	36.5	42.0	1 251
activité à temps partiel	5.3	23.4	11.0	3.5	12.5	5.5	3.5	10.5	4.5	0.6	6.3	1.6	7.7	28.6	23.7	3.9	21.4	9.9	295
jobs occasionnels	0.8	0.7	0.7	5.3	0.0	4.1	1.8	0.0	1.5	0.8	0.0	0.6	0.0	0.7	0.5	1.0	0.7	0.9	27.0
en formation	2.4	1.9	2.2	0.0	6.3	1.4	2.6	21.1	5.3	67.9	70.5	68.4	5.5	7.6	7.1	23.1	16.0	20.7	615
sans travail, en quête d'emploi	8.0	3.8	6.7	8.8	0.0	6.8	14.0	10.5	13.5	3.5	4.5	3.7	2.2	0.7	1.0	6.3	2.7	5.0	150
sans travail, sans recherche d'emploi	4.8	4.8	4.8	15.8	31.3	19.2	6.1	5.3	6.0	2.8	0.9	2.4	0.0	1.0	0.8	4.3	3.1	3.9	116
rentier/rentière	8.4	16.0	10.8	5.3	6.3	5.5	1.8	0.0	1.5	0.6	0.0	0.5	11.0	6.6	7.7	5.4	9.8	7.0	207
incapacité de travail	5.7	6.0	5.8	12.3	0.0	9.6	4.4	5.3	4.5	2.4	1.8	2.3	0.0	1.3	1.0	4.5	4.1	4.3	129
femme/homme au foyer	0.1	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	1.1	0.4	13.0
autre	5.8	6.0	5.8	15.8	18.8	16.4	9.6	0.0	8.3	6.5	6.3	6.5	2.2	1.7	1.8	6.5	4.6	5.8	174
<b>N**</b>	<b>916</b>	<b>418</b>	<b>1 334</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>114</b>	<b>19</b>	<b>133</b>	<b>508</b>	<b>112</b>	<b>620</b>	<b>91</b>	<b>301</b>	<b>392</b>	<b>1 948</b>	<b>1 029</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
<i>données manquantes</i>	1 041	425	1 466	92	35	127	196	35	231	402	79	481	151	457	608	2 136	1 131	3 267	3 267

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Statut professionnel*</b>																			
sans activité professionnelle	28.1	32.9	29.5	53.1	36.4	48.8	37.5	57.1	39.4	17.9	24.1	18.9	27.3	18.8	20.9	27.3	30.3	28.1	327
apprenti-e, stagiaire	2.2	1.4	1.9	3.1	0.0	2.3	1.6	0.0	1.4	32.5	27.6	31.7	0.0	0.0	0.0	8.6	3.7	7.2	84
manœuvre, aide	3.0	2.3	2.8	9.4	9.1	9.3	1.6	0.0	1.4	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	3.1	1.9	2.8	32
ouvrier/ère formé-e sur le tas	4.0	5.6	4.5	6.3	9.1	7.0	7.8	14.3	8.5	3.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	4.2	5.0	4.4	51
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.7	6.5	12.3	18.8	9.1	16.3	12.5	0.0	11.3	7.3	6.9	7.2	9.1	3.1	4.7	13.1	6.8	11.4	132
contremaître-sse	2.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.8	1.3	0.0	1.1	0.0	3.1	2.3	2.0	0.3	1.5	18
employé-e non qualifié-e	18.3	28.2	21.3	3.1	9.1	4.7	18.8	14.3	18.3	11.3	6.9	10.6	0.0	31.3	23.3	15.4	25.4	18.2	211
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.1	10.2	12.3	6.3	18.2	9.3	9.4	14.3	9.9	2.6	3.4	2.8	18.2	21.9	20.9	10.0	11.8	10.5	122
employé-e, cadre supérieur	3.8	1.9	3.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	18.2	6.3	9.3	3.0	1.9	2.7	31
indépendant-e	8.4	9.7	8.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.6	1.3	0.0	1.1	27.3	9.4	14.0	7.0	7.4	7.1	83
écolier/ère, étudiant-e	1.0	0.5	0.8	0.0	9.1	2.3	0.0	0.0	0.0	18.5	31.0	20.6	0.0	6.3	4.7	5.4	4.6	5.2	60
autre statut	0.8	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	11
<b>N**</b>	<b>502</b>	<b>216</b>	<b>718</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>151</b>	<b>29</b>	<b>180</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>839</b>	<b>323</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>
données manquantes	1 455	627	2 082	117	40	157	246	47	293	759	162	921	231	726	957	3 245	1 837	5 082	5 082

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

Raison principale*	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
fin régulière sans transfert	51.1	52.3	51.5	22.8	29.4	24.5	32.7	38.9	33.6	62.5	69.1	63.6	68.6	71.7	71.0	52.5	60.9	55.4	3 453
fin régulière avec transfert	9.5	11.5	10.1	16.8	7.8	14.5	9.4	7.4	9.1	6.4	1.6	5.5	2.5	2.1	2.2	8.3	7.0	7.9	491
changement de domicile	1.6	2.7	1.9	4.7	5.9	5.0	3.2	3.7	3.3	1.3	0.5	1.2	0.0	1.1	0.8	1.6	2.0	1.7	107
hospitalisation	1.1	1.8	1.3	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	50
détention	0.1	0.1	0.1	2.0	0.0	1.5	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
perte de contact	26.9	21.7	25.3	29.5	29.4	29.5	42.4	42.6	42.4	20.1	20.9	20.3	19.8	18.2	18.6	26.3	20.8	24.4	1 521
rupture explicite	7.0	6.8	7.0	11.4	13.7	12.0	6.5	3.7	6.1	7.3	5.2	6.9	3.3	4.4	4.1	7.2	5.5	6.6	411
décès	1.5	1.4	1.5	8.1	7.8	8.0	1.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	0.8	0.1	0.3	1.3	1.0	1.2	73
autre raison	1.2	1.7	1.4	3.4	5.9	4.0	2.6	3.7	2.8	2.1	2.1	2.1	4.5	2.4	2.9	1.8	1.9	1.9	116
<b>N**</b>	<b>1 951</b>	<b>840</b>	<b>2 791</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>309</b>	<b>54</b>	<b>363</b>	<b>909</b>	<b>191</b>	<b>1 100</b>	<b>242</b>	<b>757</b>	<b>999</b>	<b>4 075</b>	<b>2 156</b>	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>
données manquantes	6	3	9	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	9	4	13	13

T32b Destination des transferts, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

Destination des transferts***	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
traitement résidentiel	39.3	42.2	40.3	10.0	0.0	8.3	26.3	0.0	22.7	32.1	0.0	31.0	25.0	0.0	7.1	33.0	32.6	32.9	98	
structure/clinique de jour	0.8	3.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.1	0.5	3.4	1.3	4	
prise en charge ambulatoire	41.8	39.1	40.9	60.0	25.0	54.2	52.6	100.0	59.1	60.7	100.0	62.1	25.0	60.0	50.0	48.8	44.9	47.7	142	
appartement protégé	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1	
autre institution spécialisée	17.2	15.6	16.7	30.0	75.0	37.5	21.1	0.0	18.2	7.1	0.0	6.9	50.0	30.0	35.7	17.2	19.1	17.8	53	
<b>N**</b>	<b>122</b>	<b>64</b>	<b>186</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>209</b>	<b>89</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	
données manquantes	63	33	96	5	0	5	10	1	11	30	2	32	2	6	8	131	62	193	193	

T32c Cause de décès, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

Cause de décès****	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches			Toutes sorties				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicide	15.0	0.0	11.5	0.0	66.7	25.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	10.3	36.4	17.5	7	
accident	0.0	16.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	9.1	2.5	1	
maladie	75.0	83.3	76.9	60.0	33.3	50.0	100.0	-	100.0	0.0	-	0.0	100.0	-	100.0	72.4	54.5	67.5	27	
surdose ou intoxication aiguë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	100.0	-	100.0	0.0	-	0.0	3.4	0.0	2.5	1	
autre cause de décès	10.0	0.0	7.7	40.0	0.0	25.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	13.8	0.0	10.0	4	
<b>N**</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
données manquantes	9	6	15	7	1	8	2	0	2	2	0	2	0	1	1	23	10	33	33	

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal<sup>1</sup> et chez les proches (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
<b>Durée de la prise en charge* (%)</b>																			
1 semaine ou moins	8.5	8.4	8.5	2.7	5.9	3.5	1.3	1.9	1.4	4.7	3.1	4.5	15.4	12.3	13.0	6.7	8.7	7.4	461
> 1 semaine à 1 mois	5.1	4.3	4.9	3.4	0.0	2.5	3.9	1.9	3.6	11.8	12.0	11.8	4.1	4.0	4.0	6.4	4.6	5.8	360
> 1 à 2 mois	3.7	3.8	3.7	4.0	2.0	3.5	6.1	0.0	5.2	9.9	10.5	10.0	5.0	4.2	4.4	5.5	4.6	5.2	322
>2 à 3 mois	3.3	4.2	3.6	2.0	3.9	2.5	6.1	3.7	5.8	7.3	6.3	7.1	6.6	4.4	4.9	4.8	4.5	4.7	293
>3 à 6 mois	12.7	10.3	12.0	6.7	11.8	8.0	17.1	14.8	16.8	15.1	14.7	15.0	14.5	19.6	18.3	14.0	13.8	13.9	867
>6 mois à 1 an	24.2	26.0	24.7	16.8	21.6	18.0	33.2	38.9	34.1	28.2	27.7	28.2	36.5	33.4	34.2	27.7	30.0	28.5	1 775
>1 à 2 ans	21.7	21.8	21.8	15.4	21.6	17.0	20.3	20.4	20.3	14.8	17.3	15.3	11.6	14.0	13.4	18.9	19.0	18.9	1 179
>2 à 3 ans	8.4	8.7	8.5	6.0	3.9	5.5	5.8	5.6	5.8	4.5	4.7	4.5	2.9	5.2	4.6	6.4	6.4	6.4	400
>3 à 5 ans	7.7	8.1	7.8	25.5	13.7	22.5	3.5	7.4	4.1	3.1	3.7	3.2	0.8	2.4	2.0	6.0	5.4	5.8	360
>5 à 10 ans	3.4	3.3	3.4	10.7	11.8	11.0	1.9	5.6	2.5	0.5	0.0	0.5	2.1	0.7	1.0	2.6	2.2	2.5	154
plus de 10 ans	1.4	1.2	1.3	6.7	3.9	6.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	1.0	0.7	0.9	56
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>757</b>	<b>998</b>	<b>4 075</b>	<b>2 152</b>	<b>6 227</b>	<b>6 227</b>
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	8	17	17
<b>Durée (en semaines)</b>																			
moyenne	75.2	75.5	75.3	171.9	131.3	161.5	58.1	74.7	60.6	40.1	39.2	39.9	39.7	40.7	40.4	64.1	59.7	62.5	
écart-type	105.0	106.6	105.5	236.2	182.6	224.0	98.5	81.0	96.2	54.5	42.4	52.6	66.7	55.0	58.0	100.5	88.7	96.6	
1er quartile	16.9	17.9	17.0	27.4	27.7	27.6	16.9	26.6	17.9	7.7	7.3	7.7	8.4	12.3	11.3	13.4	14.1	13.7	
valeur médiane	43.0	42.7	43.0	98.3	60.6	86.8	37.2	45.9	38.6	25.0	28.0	26.0	25.7	27.4	26.8	34.7	34.5	34.6	
3e quartile	90.4	90.0	90.2	210.5	180.4	201.0	62.0	87.6	64.0	48.3	56.6	49.0	45.0	47.9	46.7	72.6	68.7	71.4	
<b>N**</b>	<b>1 957</b>	<b>843</b>	<b>2 800</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>54</b>	<b>364</b>	<b>910</b>	<b>191</b>	<b>1 101</b>	<b>241</b>	<b>757</b>	<b>998</b>	<b>4 075</b>	<b>2 152</b>	<b>6 227</b>	
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	8	17	

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu



T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitution pendant la prise en charge*</b>																
non	98.7	99.2	98.9	58.1	68.4	60.5	95.4	100.0	96.0	99.6	100.0	99.7	97.5	98.5	97.8	2 862
oui	1.3	0.8	1.1	41.9	31.6	39.5	4.6	0.0	4.0	0.4	0.0	0.3	2.5	1.5	2.2	64
<b>N**</b>	<b>1 087</b>	<b>488</b>	<b>1 575</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>130</b>	<b>21</b>	<b>151</b>	<b>533</b>	<b>121</b>	<b>654</b>	<b>2 103</b>	<b>823</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>
<i>données manquantes</i>	870	355	1 225	87	32	119	180	33	213	377	70	447	1 737	574	2 311	2 311
<b>Type de substitution***</b>																
héroïne	0.0	0.0	0.0	4.0	16.7	6.5	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.0	9.1	3.3	2
méthadone	61.5	100.0	70.6	72.0	50.0	67.7	100.0	-	100.0	50.0	-	50.0	72.0	72.7	72.1	44
autres opioïdes	38.5	0.0	29.4	24.0	33.3	25.8	0.0	-	0.0	50.0	-	50.0	24.0	18.2	23.0	14
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.0	0.0	1.6	1
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<i>données manquantes</i>	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>Substitution après la prise en charge*</b>																
non	99.2	99.4	99.3	69.1	77.8	71.2	96.6	100.0	97.1	100.0	100.0	100.0	98.4	99.1	98.6	2 744
oui	0.8	0.6	0.7	30.9	22.2	28.8	3.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.4	39
<b>N**</b>	<b>1 049</b>	<b>464</b>	<b>1 513</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>73</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>139</b>	<b>519</b>	<b>114</b>	<b>633</b>	<b>2 005</b>	<b>778</b>	<b>2 783</b>	<b>2 783</b>
<i>données manquantes</i>	908	379	1 287	94	33	127	192	33	225	391	77	468	1 835	619	2 454	2 454
<b>Type de substitution***</b>																
prescription d'héroïne	12.5	0.0	9.1	5.9	25.0	9.5	25.0	0.0	25.0	-	-	-	9.4	14.3	10.3	4
traitement de substitution	87.5	100.0	90.9	94.1	75.0	90.5	75.0	0.0	75.0	-	-	-	90.6	85.7	89.7	35
<b>N**</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Postcure prévue et mise en place*</b>																
non	91.7	85.6	90.0	90.7	85.7	89.5	89.7	85.7	89.3	95.6	100.0	96.4	92.5	88.8	91.6	1 259
oui	8.3	14.4	10.0	9.3	14.3	10.5	10.3	14.3	10.7	4.4	0.0	3.6	7.5	11.2	8.4	116
<b>N**</b>	<b>637</b>	<b>243</b>	<b>880</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>182</b>	<b>40</b>	<b>222</b>	<b>1 035</b>	<b>340</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>
<i>données manquantes</i>	1 320	600	1 920	106	37	143	242	47	289	728	151	879	2 805	1 057	3 862	3 862
<b>Type de la postcure prévue***</b>																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	2.1	3.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.4	2.9	1.9	2
appartement protégé extérieur	6.3	0.0	3.8	25.0	0.0	16.7	14.3	0.0	12.5	0.0	-	0.0	7.1	0.0	4.8	5
service de postcure extérieur	14.6	21.9	17.5	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	25.0	16.7	-	16.7	14.3	20.0	16.2	17
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	10.4	15.6	12.5	0.0	0.0	0.0	28.6	100.0	37.5	0.0	-	0.0	11.4	17.1	13.3	14
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	4.2	0.0	2.5	75.0	100.0	83.3	28.6	100.0	37.5	0.0	-	0.0	11.4	8.6	10.5	11
autre centre de consultation	12.5	21.9	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	-	50.0	14.3	20.0	16.2	17
groupe d'entraide	8.3	6.3	7.5	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	12.5	0.0	-	0.0	8.6	5.7	7.6	8
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	43.8	31.3	38.8	25.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	37.1	28.6	34.3	36
<b>N**</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<i>données manquantes</i>	5	3	8	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	3	11	11

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Problèmes addictifs à la sortie*</b>																
alcool	71.5	75.6	72.8	22.7	13.3	20.0	24.3	30.0	25.0	11.8	6.6	11.0	43.1	50.1	45.0	1 570
héroïne	0.6	0.5	0.6	48.0	63.3	52.4	2.5	3.3	2.6	0.2	0.0	0.1	2.1	2.6	2.3	79
méthadone	0.3	0.0	0.2	9.3	3.3	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	15
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.2	0.0	0.2	4.0	13.3	6.7	2.0	0.0	1.7	0.0	0.8	0.1	0.4	0.6	0.5	17
cocaïne en poudre	4.8	1.0	3.6	20.0	16.7	19.0	66.3	50.0	64.2	3.9	1.7	3.6	9.8	3.2	8.0	278
crack	0.3	0.0	0.2	1.3	3.3	1.9	3.5	0.0	3.0	0.2	0.0	0.1	0.5	0.1	0.4	14
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	1.0	1.0	3.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	5
amphétamines	1.0	0.2	0.7	2.7	0.0	1.9	3.5	6.7	3.9	1.4	0.8	1.3	1.5	0.7	1.3	45
méthamphétamines	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	8
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.5	0.3	0.4	2.7	0.0	1.9	0.5	0.0	0.4	0.6	1.7	0.8	0.7	0.6	0.7	23
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1	2
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	7
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1
benzodiazépines	1.1	2.6	1.5	14.7	3.3	11.4	2.0	3.3	2.2	0.3	0.0	0.3	1.7	2.6	2.0	68
GHB/GBL	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.5	0.3	1.3	6.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	14
LSD	0.2	0.0	0.2	2.7	0.0	1.9	1.0	0.0	0.9	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	0.3	10
kétamine	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	3
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.2	0.1	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	5
cannabis	6.2	3.1	5.2	20.0	16.7	19.0	13.4	16.7	13.8	64.0	52.9	62.2	21.8	10.7	18.8	654
tabac	10.9	10.4	10.7	18.7	16.7	18.1	9.9	6.7	9.5	11.9	9.9	11.6	12.1	12.5	12.2	425
autre substance	0.2	0.2	0.2	1.3	0.0	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	13
jeu pathologique	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	2.0	69
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.8	0.5	1.3	0.5	1.1	38
troubles alimentaires	0.1	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	5.2	1.6	56
autre comportement de type addictif	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.9	2.2	2.0	68
aucun	26.1	22.3	24.9	22.7	13.3	20.0	21.8	23.3	22.0	32.2	45.5	34.3	27.5	25.3	26.9	939
<b>N**</b>	<b>1 286</b>	<b>587</b>	<b>1 873</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>202</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>636</b>	<b>121</b>	<b>757</b>	<b>2 528</b>	<b>959</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>
<i>données manquantes</i>	671	256	927	74	21	95	108	24	132	274	70	344	1 312	438	1 750	1 750

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Fréquence des rechutes*</b>																
aucune	52.3	38.4	48.3	25.9	28.6	26.5	36.4	33.3	36.1	67.4	62.5	66.7	52.3	41.2	49.5	384
une fois	7.5	11.3	8.6	14.8	0.0	11.8	18.2	66.7	22.2	5.3	6.3	5.4	8.5	11.1	9.1	71
deux fois	6.7	8.8	7.3	7.4	14.3	8.8	15.2	0.0	13.9	4.2	12.5	5.4	6.6	9.0	7.2	56
trois ou quatre fois	10.6	16.4	12.2	18.5	0.0	14.7	12.1	0.0	11.1	8.4	6.3	8.1	10.7	15.1	11.9	92
cinq fois ou plus	22.9	25.2	23.6	33.3	57.1	38.2	18.2	0.0	16.7	14.7	12.5	14.4	21.8	23.6	22.3	173
<b>N**</b>	<b>388</b>	<b>159</b>	<b>547</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>577</b>	<b>199</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
données manquantes	1 569	684	2 253	122	44	166	277	51	328	815	175	990	3 263	1 198	4 461	4 461
<b>Substance/comportement addictif lors des rechutes***</b>																
alcool	97.8	97.8	97.8	44.4	20.0	39.1	40.0	0.0	36.4	43.3	16.7	38.9	80.7	85.7	82.2	309
opioïdes	2.8	1.1	2.2	61.1	80.0	65.2	10.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.6	4.5	6.6	25
cocaïne et dérivés	2.8	1.1	2.2	50.0	20.0	43.5	95.0	50.0	90.9	6.7	33.3	11.1	14.0	4.5	11.2	42
autres stimulants	0.0	1.1	0.4	5.6	0.0	4.3	5.0	50.0	9.1	3.3	0.0	2.8	1.5	2.7	1.9	7
somnifères/tranquillisants	1.7	2.2	1.8	11.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	2.1	8
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
cannabis	10.6	3.2	8.1	22.2	0.0	17.4	15.0	0.0	13.6	83.3	100.0	86.1	20.5	8.0	16.8	63
tabac	4.4	5.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	4.2	5.4	4.5	17
autres substances	0.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.6	3.0	0.9	2.4	9
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.6	2.3	0.9	1.9	7
troubles alimentaires	0.0	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	1.1	4
autre comportement de type addictif	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
<b>N**</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>273</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>264</b>	<b>112</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
données manquantes	5	5	10	2	0	2	1	0	1	1	0	1	11	5	16	16

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)

	Patient-e-s: problème principal <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fréquence de la consommation de tabac*</b>																
jamais	41.5	53.2	45.2	30.0	40.0	32.0	12.5	0.0	12.1	18.1	26.7	19.4	35.6	48.7	39.2	280
1 jour par semaine ou moins	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.1	8
2 à 3 jours par semaine	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.1	1.0	0.0	0.7	5
4 à 6 jours par semaine	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	1.7	0.5	1.4	10
une fois par jour	1.5	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	3.6	6.7	4.1	2.3	1.0	2.0	14
plusieurs fois par jour	53.5	44.9	50.8	70.0	60.0	68.0	81.3	100.0	81.8	72.3	66.7	71.4	58.0	49.2	55.6	397
<b>N**</b>	<b>342</b>	<b>158</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>98</b>	<b>519</b>	<b>195</b>	<b>714</b>	<b>714</b>
<i>données manquantes</i>	1 615	685	2 300	129	46	175	278	53	331	827	176	1 003	3 321	1 202	4 523	4 523
<b>Nombre de cigarettes par jour***</b>																
0 à 10 cigarettes par jour	26.0	33.9	28.0	8.3	0.0	6.7	16.7	100.0	20.0	50.9	60.0	52.2	30.3	36.6	31.7	117
11 à 20 cigarettes par jour	46.2	50.8	47.4	83.3	100.0	86.7	50.0	0.0	48.0	38.6	40.0	38.8	45.3	51.2	46.6	172
21 à 30 cigarettes par jour	22.0	11.9	19.4	8.3	0.0	6.7	20.8	0.0	20.0	7.0	0.0	6.0	18.5	9.8	16.5	61
31 cigarettes par jour ou plus	5.8	3.4	5.2	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.0	3.5	0.0	3.0	5.9	2.4	5.1	19
<b>N**</b>	<b>173</b>	<b>59</b>	<b>232</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>287</b>	<b>82</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<i>données manquantes</i>	27	15	42	2	0	2	4	0	4	11	1	12	47	18	65	65

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

\*\*\* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème<sup>1</sup> (seulement patient-e-s) (2019)


	Patient-e-s: principale substance posant problème <sup>1</sup>												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Objectif de consommation*</b>																
abstinence définitive	33.8	34.9	34.1	78.3	66.7	75.9	62.8	100.0	65.2	49.5	61.1	51.2	39.4	41.2	39.9	358
abstinence limitée dans le temps	11.6	8.1	10.5	4.3	0.0	3.4	9.3	0.0	8.7	6.3	0.0	5.4	9.8	6.4	8.9	80
consommation contrôlée	34.0	43.5	36.8	8.7	0.0	6.9	7.0	0.0	6.5	23.4	22.2	23.3	30.4	38.2	32.4	291
aucune limitation envisagée	6.8	2.7	5.6	0.0	16.7	3.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.9	5.6	2.6	4.8	43
pas déterminé pour l'instant	12.9	9.7	12.0	8.7	16.7	10.3	20.9	0.0	19.6	16.2	16.7	16.3	13.7	10.3	12.8	115
autre	0.9	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	11
<b>N**</b>	<b>441</b>	<b>186</b>	<b>627</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>111</b>	<b>18</b>	<b>129</b>	<b>665</b>	<b>233</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
<i>données manquantes</i>	1 516	657	2 173	126	45	171	267	51	318	799	173	972	3 175	1 164	4 339	4 339
<b>Pronostic*</b>																
très bon pronostic	17.6	13.7	16.5	18.5	8.3	15.4	17.8	20.0	18.0	18.3	21.7	18.9	18.0	14.5	17.1	154
bon pronostic	45.1	46.3	45.4	44.4	41.7	43.6	46.7	80.0	50.0	56.7	47.8	55.1	46.9	48.3	47.3	426
plutôt mauvais pronostic	25.0	29.1	26.2	25.9	25.0	25.6	26.7	0.0	24.0	20.2	30.4	22.0	24.6	26.5	25.1	226
mauvais pronostic	12.3	10.9	11.9	11.1	25.0	15.4	8.9	0.0	8.0	4.8	0.0	3.9	10.5	10.7	10.5	95
<b>N**</b>	<b>448</b>	<b>175</b>	<b>623</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>23</b>	<b>127</b>	<b>667</b>	<b>234</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
<i>données manquantes</i>	1 509	668	2 177	122	39	161	265	49	314	806	168	974	3 173	1 163	4 336	4 336

<sup>1</sup> Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.




\* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

\*\* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu


## G1 Problème principal à l'admission alcool: évolution 2013-2019






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



## G2 Problème principal à l'admission opioïdes: évolution 2013-2019




Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante









## G3 Problème principal à l'admission cocaïne ou dérivés: évolution 2013-2019






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




## G4 Problème principal à l'admission autres stimulants: évolution 2013-2019






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




## G5 Problème principal à l'admission cannabis: évolution 2013-2019






Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante




## G6 Problème principal à l'admission hypnotiques/sédatifs: évolution 2013-2019



Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante



## G7 Problème principal à l'admission jeu de hasard: évolution 2013-2019



Nombre de cas enregistrés par les institutions avec une participation constante

